


Bulletin 6/16

Bundesamt für Gesundheit



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Herausgeber

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

Redaktion

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Druck

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 82 82

Abonnemente, Adressänderungen

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

Inhalt	
Übertragbare Krankheiten Meldungen Infektionskrankheiten	104
Sentinella-Statistik	106
Kranken- und Unfallversicherung Spezialitätenliste	109
Kommunikationskampagnen SmokeFree	115

Übertragbare Krankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 4. Woche (02.02.2016)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in *kursiver* Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.

^c Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

^e Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

	Woche 04			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	2 <i>1.30</i>	6 <i>3.80</i>	1 <i>0.60</i>	12 <i>1.90</i>	14 <i>2.20</i>	7 <i>1.10</i>	103 <i>1.20</i>	107 <i>1.30</i>	81 <i>1.00</i>	12 <i>1.90</i>	14 <i>2.20</i>	7 <i>1.10</i>
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen ^b	114 <i>71.60</i>	286 <i>179.70</i>	41 <i>25.80</i>	334 <i>52.50</i>	582 <i>91.40</i>	192 <i>30.20</i>	5138 <i>62.10</i>	1969 <i>23.80</i>	2453 <i>29.60</i>	334 <i>52.50</i>	582 <i>91.40</i>	192 <i>30.20</i>
Legionellose	7 <i>4.40</i>	7 <i>4.40</i>		27 <i>4.20</i>	22 <i>3.50</i>	14 <i>2.20</i>	388 <i>4.70</i>	302 <i>3.60</i>	279 <i>3.40</i>	27 <i>4.20</i>	22 <i>3.50</i>	14 <i>2.20</i>
Masern	1 <i>0.60</i>			2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	35 <i>0.40</i>	22 <i>0.30</i>	175 <i>2.10</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>
Meningokokken: invasive Erkrankung	1 <i>0.60</i>		1 <i>0.60</i>	9 <i>1.40</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	44 <i>0.50</i>	37 <i>0.40</i>	50 <i>0.60</i>	9 <i>1.40</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>
Pneumokokken: invasive Erkrankung	18 <i>11.30</i>	17 <i>10.70</i>	14 <i>8.80</i>	95 <i>14.90</i>	97 <i>15.20</i>	91 <i>14.30</i>	869 <i>10.50</i>	798 <i>9.60</i>	885 <i>10.70</i>	95 <i>14.90</i>	97 <i>15.20</i>	91 <i>14.30</i>
Röteln ^c		1 <i>0.60</i>			2 <i>0.30</i>		2 <i>0.02</i>	5 <i>0.06</i>	6 <i>0.07</i>		2 <i>0.30</i>	
Röteln, materno-foetal ^d												
Tuberkulose	1 <i>0.60</i>	12 <i>7.50</i>	6 <i>3.80</i>	16 <i>2.50</i>	46 <i>7.20</i>	29 <i>4.60</i>	515 <i>6.20</i>	490 <i>5.90</i>	525 <i>6.30</i>	16 <i>2.50</i>	46 <i>7.20</i>	29 <i>4.60</i>
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	130 <i>81.70</i>	95 <i>59.70</i>	176 <i>110.60</i>	899 <i>141.20</i>	664 <i>104.30</i>	855 <i>134.30</i>	7100 <i>85.80</i>	7456 <i>90.10</i>	7433 <i>89.80</i>	899 <i>141.20</i>	664 <i>104.30</i>	855 <i>134.30</i>
Enterohämorrhagische E. coli-Infektion	9 <i>5.70</i>	4 <i>2.50</i>	2 <i>1.30</i>	32 <i>5.00</i>	7 <i>1.10</i>	7 <i>1.10</i>	321 <i>3.90</i>	125 <i>1.50</i>	83 <i>1.00</i>	32 <i>5.00</i>	7 <i>1.10</i>	7 <i>1.10</i>
Hepatitis A	2 <i>1.30</i>			7 <i>1.10</i>			48 <i>0.60</i>	57 <i>0.70</i>	55 <i>0.70</i>	7 <i>1.10</i>		
Listeriose	2 <i>1.30</i>	5 <i>3.10</i>		7 <i>1.10</i>	10 <i>1.60</i>	16 <i>2.50</i>	50 <i>0.60</i>	94 <i>1.10</i>	74 <i>0.90</i>	7 <i>1.10</i>	10 <i>1.60</i>	16 <i>2.50</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi					1 <i>0.20</i>		16 <i>0.20</i>	24 <i>0.30</i>	21 <i>0.20</i>		1 <i>0.20</i>	
Salmonellose, übrige	16 <i>10.00</i>	19 <i>11.90</i>	25 <i>15.70</i>	79 <i>12.40</i>	66 <i>10.40</i>	81 <i>12.70</i>	1381 <i>16.70</i>	1221 <i>14.80</i>	1274 <i>15.40</i>	79 <i>12.40</i>	66 <i>10.40</i>	81 <i>12.70</i>
Shigellose	8 <i>5.00</i>	2 <i>1.30</i>	5 <i>3.10</i>	30 <i>4.70</i>	8 <i>1.30</i>	11 <i>1.70</i>	205 <i>2.50</i>	141 <i>1.70</i>	145 <i>1.80</i>	30 <i>4.70</i>	8 <i>1.30</i>	11 <i>1.70</i>

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

Übertragbare Krankheiten

	Woche 04			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids		2 1.30		2 0.30	3 0.50		81 1.00	92 1.10	125 1.50	2 0.30	3 0.50	
Chlamydiose	293 184.10	196 123.20	261 164.00	911 143.10	669 105.10	665 104.50	10340 125.00	9697 117.20	8719 105.40	911 143.10	669 105.10	665 104.50
Gonorrhoe	36 22.60	37 23.20	36 22.60	202 31.70	152 23.90	124 19.50	1992 24.10	1615 19.50	1668 20.20	202 31.70	152 23.90	124 19.50
Hepatitis B, akut		1 0.60	2 1.30		3 0.50	5 0.80	29 0.40	46 0.60	66 0.80		3 0.50	5 0.80
Hepatitis B, total Meldungen		21	25	85	73	83	1381	1384	1453	85	73	83
Hepatitis C, akut		1 0.60	2 1.30		2 0.30	3 0.50	44 0.50	53 0.60	48 0.60		2 0.30	3 0.50
Hepatitis C, total Meldungen		35	38	81	97	84	1413	1676	1735	81	97	84
HIV-Infektion		9 5.70	26 16.30	38 6.00	47 7.40	62 9.70	547 6.60	513 6.20	592 7.20	38 6.00	47 7.40	62 9.70
Syphilis	19 11.90	19 11.90	19 11.90	98 15.40	76 11.90	67 10.50	1089 13.20	1071 12.90	1118 13.50	98 15.40	76 11.90	67 10.50
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose							1 0.01	3 0.04	4 0.05			
Chikungunya-Fieber	2 1.30			3 0.50	3 0.50	2 0.30	41 0.50	87 1.00	5 0.06	3 0.50	3 0.50	2 0.30
Dengue-Fieber	14 8.80	3 1.90	2 1.30	35 5.50	7 1.10	13 2.00	225 2.70	122 1.50	180 2.20	35 5.50	7 1.10	13 2.00
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							1 0.01	1 0.01				
Malaria	1 0.60	4 2.50	6 3.80	23 3.60	20 3.10	15 2.40	426 5.20	308 3.70	158 1.90	23 3.60	20 3.10	15 2.40
Q-Fieber				2 0.30	1 0.20	1 0.20	39 0.50	40 0.50	27 0.30	2 0.30	1 0.20	1 0.20
Trichinellose							3 0.04		1 0.01			
Tularämie					2 0.30	1 0.20	47 0.60	39 0.50	29 0.40		2 0.30	1 0.20
West-Nil-Fieber									1 0.01			
Zeckenzephalitis			1 0.60	1 0.20		1 0.20	122 1.50	112 1.40	202 2.40	1 0.20		1 0.20
Andere Meldungen												
Botulismus							2 0.02	1 0.01	1 0.01			
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		1 0.60			3 0.50		14 0.20	19 0.20	20 0.20		3 0.50	
Diphtherie ^a							10 0.10	1 0.01	1 0.01			
Tetanus							1 0.01					

Übertragbare Krankheiten

Sentinella-Statistik

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 29.1.2016 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)


Woche	1		2		3		4		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Influenzaverdacht	124	10.5	157	11.1	196	14.6	283	26.3	190	15.6
Mumps	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0.3	0
Pneumonie	29	2.4	27	1.9	19	1.4	14	1.3	22.3	1.8
Pertussis	4	0.3	9	0.6	6	0.4	5	0.5	6	0.4
Zeckenstiche	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0.3	0
Lyme Borreliose	0	0	1	0.1	2	0.1	0	0	0.8	0.1
Herpes Zoster	14	1.2	8	0.6	9	0.7	7	0.6	9.5	0.8
Post-Zoster-Neuralgie	2	0.2	5	0.4	2	0.1	4	0.4	3.3	0.3
Meldende Ärzte	146		151		148		122		141.8	

Provisorische Daten

Meldungen von Influenzaverdacht im Sentinella-Meldesystem

Saisonale Grippe

Anzahl wöchentliche Konsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner



Meldungen von Influenza- verdacht (Stand am 02.02.2016)

Aktivität und Virologie in der Schweiz während der Woche 4/2016

In der Woche 4 meldeten in der Schweiz 122 Ärztinnen und Ärzte des Sentinella-Meldesystems 26,3 Grippeverdachtsfälle auf 1000 Konsultationen. Hochgerechnet ent-

sprech diese Rate einer Inzidenz von 222 Konsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen pro 100 000 Einwohner. Die Inzidenz hat im Vergleich zur Vorwoche (127 Grippeverdachtsfälle pro 100 000 Einwohner) zugenommen und liegt seit Woche 2 über dem nationalen epidemischen Schwellenwert¹. Die Inzidenz war in der Altersklasse der 0-4-Jährigen am höchsten (Tabelle 1). Gegenüber

der Vorwoche stieg sie insbesondere bei den 0-14-Jährigen.

Vier der sechs Sentinella-Regionen registrierten eine weit verbreitete

¹ Der nationale epidemische Schwellenwert wurde aufgrund der Meldungen der letzten 10 Grippesaisons (ohne Pandemie 2009/10) in der Schweiz berechnet und liegt für die Saison 2015/16 bei 68 Grippeverdachtsfällen pro 100 000 Einwohner.

te Grippeaktivität mit steigender Tendenz. Die zwei Sentinella-Regionen der Westschweiz verzeichneten eine verbreitete Grippeaktivität, ebenfalls mit steigendem Trend (Tabelle 1, Kasten).

In der Woche 4 wurden am Nationalen Referenzzentrum für Influenza im Rahmen der Sentinella-Überwachung in 57 % der 56 untersuchten Abstriche Influenzaviren nachgewiesen, damit deutlich häufiger als in der Vorwoche (30 %). 50 % der nachgewiesenen Viren waren Influenza B und 50 % Influenza A, wobei diese mehrheitlich dem Subtyp A(H1N1)pdm09 angehörten (Tabelle 2). 68 % der 28 seit Woche 40/2015 genetisch untersuchten Influenzaviren werden durch den saisonalen Grippeimpfstoff [1] abgedeckt - bei den nicht abgedeckten handelt es sich um Influenza B Viren der Victoria-Linie.

Aktivität und Virologie in Europa und weltweit während der Woche 3/2016

Gemäss dem WHO Regionalbüro für Europa und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) [2,3] stuften in der vorhergehenden Woche 26 der 45 meldenden Länder (darunter Italien und Österreich) die Intensität der Grippeaktivität als niedrig, 13 Länder (darunter Deutschland) als mittelhoch und 6 Länder als hoch ein. Von diesen verzeichneten 29 Länder einen steigenden Trend der Intensität gegenüber der Vorwoche. Zur geografischen Verbreitung der Grippeaktivität berichteten 3 der 45 meldenden Länder keine, 12 Länder eine sporadische, 9 Länder eine lokale, 6 Länder (darunter Deutschland und Italien) eine regionale und 15 Länder eine weit verbreitete Grippeaktivität.

In Europa konnten in 40 % der 2205 getesteten Sentinel-Proben Influenzaviren nachgewiesen werden, damit etwas häufiger als in der vorherigen Woche (38 %). Der Anteil influenza-positiver Proben betrug je nach Land zwischen 0 % und 63 % (in Ländern mit mindestens 20 Proben). 18 % der nachgewiesenen Viren waren Influenza B und 82 % Influenza A, wobei diese hauptsächlich dem Subtyp A(H1N1)pdm09 angehörten (Tabelle 2). In 22 der 32 meldenden Länder dominierten Influenza A(H1N1)pdm09 und in einem

Tabelle 1
Altersspezifische und regionale Inzidenzen grippebedingter Konsultationen
pro 100 000 Einwohner in der Kalenderwoche 4/2016

Inzidenz	Grippebedingte Konsultationen pro 100 000 Einwohner	Grippeaktivität Klassierung, (Trend)
Inzidenz nach Altersklasse		
0 – 4 Jahre	614	(steigend)
5 – 14 Jahre	467	(steigend)
15 – 29 Jahre	246	(steigend)
30 – 64 Jahre	159	(steigend)
≥ 65 Jahre	73	(steigend)
Inzidenz nach Sentinella-Region		
Region 1 (GE, NE, VD, VS)	120	verbreitet, (steigend)
Region 2 (BE, FR, JU)	177	verbreitet, (steigend)
Region 3 (AG, BL, BS, SO)	225	weit verbreitet, (steigend)
Region 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	297	weit verbreitet, (steigend)
Region 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)	206	weit verbreitet, (steigend)
Region 6 (GR, TI)	423	weit verbreitet, (steigend)
Schweiz	222	weit verbreitet, (steigend)

Tabelle 2
Zirkulierende Influenzaviren in der Schweiz und in Europa
Häufigkeit der isolierten Influenzotypen und -subtypen in der aktuellen Woche und kumulativ ab Woche 40/2015

	Aktuelle Woche	Kumulativ
Schweiz in Woche 4/2016		
Anteil Influenza-positiver Proben (Anzahl untersuchte Proben)	57 % (56)	25 % (331)
B	50 %	46 %
A(H3N2)	13 %	13 %
A(H1N1)pdm09	28 %	36 %
A nicht subtypisiert	9 %	5 %
Europa in Woche 3/2016		
Anteil Influenza-positiver Proben (Anzahl untersuchte Proben)	40 % (2205)	18 % (16 782)
B	18 %	22 %
A(H3N2)	12 %	14 %
A(H1N1)pdm09	65 %	61 %
A nicht subtypisiert	5 %	3 %

Land Influenza A(H3N2) Viren. In 5 weiteren Ländern dominierten ebenfalls Influenza A (ohne Angabe des Subtyps), in einem Land Influenza B Viren. In den übrigen 3 Ländern co-dominierten Influenza A(H1N1)pdm09 und Influenza B Viren. 89 % bzw. 100 % der 580 seit Woche 40/2015 genetisch charakterisierten Influenzaviren werden durch den diesjährigen trivalenten bzw. durch den quadrivalenten Grippeimpfstoff [1] abgedeckt - bei den nicht abgedeckten handelt es sich um Influenza B Viren der Victoria-Linie. Zwei der 383 getesteten Influenza A(H1N1)pdm09 Viren waren resistent gegen Oseltamivir. Bei den 48 getesteten Influenza A(H3N2) Viren

und den 29 getesteten Influenza B Viren traten keine Resistenzen gegen Neuraminidase-Inhibitoren auf.

Die meisten Staaten der USA [4] verzeichneten in der Woche 3 eine sporadische Grippeaktivität von niedriger Intensität, aber mit leicht steigendem Trend. Die Aktivität lag über dem nationalen Grundniveau. 36 % der nachgewiesenen Viren waren Influenza B und 64 % Influenza A, wobei diese hauptsächlich dem Subtyp A(H1N1)pdm09 angehörten. In den USA werden 92 % bzw. 100 % der 312 seit Woche 40/2015 antigenisch oder genetisch charakterisierten Influenzaviren durch den trivalenten bzw. durch den quadrivalenten Grippeimpfstoff [1] abgedeckt. Einer

DIE SENTINEL-ÜBERWACHUNG DER INFLUENZA IN DER SCHWEIZ

Die epidemiologische Beurteilung der saisonalen Influenzaaktivität beruht (1) auf wöchentlichen Meldungen von Influenzaverdachtsfällen durch Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte, (2) auf Untersuchungen von Nasenrachenabstrichen am Nationalen Referenzzentrum für Influenza (CNRI) in Genf und (3) auf der Meldepflicht von Laborbestätigungen aller Influenzasubtypen. Die Typisierungen durch das CNRI in Zusammenarbeit mit dem Sentinella-Meldesystem erlauben die laufende Überwachung der in der Schweiz zirkulierenden Grippeviren.

KLASSIERUNG DER GRIPPEAKTIVITÄT

Die Klassierung der Grippeaktivität basiert auf (1) dem Anteil der Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte, die Grippeverdachtsfälle gemeldet haben und (2) dem Nachweis von Influenzaviren am CNRI:

- Keine: Unter 30 % der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen und der vorhergehenden Meldewoche keine nachgewiesen.
- Sporadische: Unter 30 % der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen oder der vorhergehenden Meldewoche nachgewiesen.
- Verbreitete: 30–49 % der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen oder der vorhergehenden Meldewoche nachgewiesen.
- Weit verbreitete: 50 % und mehr der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen oder der vorhergehenden Meldewoche nachgewiesen.

Die wertvolle Mitarbeit der Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte macht die Grippeüberwachung in der Schweiz erst möglich. Diese ist von grossem Nutzen für alle diagnostizierenden Ärztinnen und Ärzte, wie auch für die Bevölkerung in der Schweiz. Deshalb möchten wir allen Sentinella-Ärztinnen und -Ärzten unseren Dank aussprechen!

der 143 getesteten Influenza A(H1N1) pdm09 Viren war resistent gegen Oseltamivir und Peramivir, jedoch sensibel gegen Zanamivir. Bei den 192 getesteten Influenza A(H3N2) Viren sowie den 104 Influenza B Viren traten keine Resistenzen gegen Neuraminidase-Inhibitoren auf. ■

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

Referenzen

1. World Health Organisation (WHO). Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2015-16 northern hemisphere influenza season, www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2015_16_north/en/
2. World Health Organisation Regional office for Europe, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Flu News Europe, www.flunewseurope.org/
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza - Latest surveillance data (accessed on 01.02.2016), ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Latest_surveillance_data.aspx
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). FluView, www.cdc.gov/flu/weekly/

Kranken- und Unfallversicherung

Spezialitätenliste

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.spezialitätenliste.ch

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
Gültig ab 1. Februar 2016					
{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis					
I. Neuzugang Präparate					
01.01.30 G†		Buprenorphin Mepha (Buprenorphinum)	Mepha Pharma AG		
	20451	TTS 35 mcg/h 4 Stk Fr. 48.70 {28.12}		65809001	01.02.2016, A
	20451	TTS 35 mcg/h 8 Stk Fr. 78.00 {53.66}		65809002	01.02.2016, A
G†		Buprenorphin Mepha (Buprenorphinum)	Mepha Pharma AG		
	20451	TTS 52.500 mcg/h 4 Stk Fr. 60.55 {38.46}		65809003	01.02.2016, A
	20451	TTS 52.500 mcg/h 8 Stk Fr. 98.30 {71.32}		65809004	01.02.2016, A
G†		Buprenorphin Mepha (Buprenorphinum)	Mepha Pharma AG		
	20451	TTS 70 mcg/h 4 Stk Fr. 74.60 {50.70}		65809005	01.02.2016, A
	20451	TTS 70 mcg/h 8 Stk Fr. 127.10 {96.44}		65809006	01.02.2016, A
01.05.00 G		Aripiprazol Spirig HC (Aripiprazolum)	Spirig HealthCare AG		
	20479	Tabl 5 mg 28 Stk Fr. 88.40 {62.70}		65456001	01.02.2016, B
G		Aripiprazol Spirig HC (Aripiprazolum)	Spirig HealthCare AG		
	20479	Tabl 10 mg 28 Stk Fr. 94.75 {68.27}		65456003	01.02.2016, B
G		Aripiprazol Spirig HC (Aripiprazolum)	Spirig HealthCare AG		
	20479	Tabl 15 mg 28 Stk Fr. 103.50 {75.88}		65456005	01.02.2016, B
G		Aripiprazol Spirig HC (Aripiprazolum)	Spirig HealthCare AG		
	20479	Tabl 30 mg 28 Stk Fr. 173.20 {136.58}		65456007	01.02.2016, B
02.03.00 G		Metoprolol Axapharm (Metoprololi succinas (2:1))	Axapharm AG		
	20473	Ret Tabl 25 mg 30 Stk Fr. 6.85 {2.40}		65958001	01.02.2016, B
	20473	Ret Tabl 25 mg 100 Stk Fr. 16.20 {6.98}		65958003	01.02.2016, B
G		Metoprolol Axapharm (Metoprololi succinas (2:1))	Axapharm AG		
	20473	Ret Tabl 50 mg 30 Stk Fr. 8.80 {4.11}		65958004	01.02.2016, B
	20473	Ret Tabl 50 mg 100 Stk Fr. 25.95 {11.90}		65958006	01.02.2016, B
G		Metoprolol Axapharm (Metoprololi succinas (2:1))	Axapharm AG		
	20473	Ret Tabl 100 mg 30 Stk Fr. 15.55 {6.41}		65958007	01.02.2016, B
	20473	Ret Tabl 100 mg 100 Stk Fr. 37.65 {18.50}		65958009	01.02.2016, B
G		Metoprolol Axapharm (Metoprololi succinas (2:1))	Axapharm AG		
	20473	Ret Tabl 200 mg 30 Stk Fr. 16.65 {7.36}		65958010	01.02.2016, B
	20473	Ret Tabl 200 mg 100 Stk Fr. 43.15 {23.30}		65958012	01.02.2016, B
02.07.20 G		Telmisartan-HCT Mepha (Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20423	Tabl 80/12.5 mg 28 Stk Fr. 36.00 {17.06}		65314001	01.02.2016, B
	20423	Tabl 80/12.5 mg 98 Stk Fr. 84.35 {59.21}		65314002	01.02.2016, B
G		Telmisartan-HCT Mepha (Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20423	Tabl 80/25 mg 28 Stk Fr. 36.35 {17.39}		65314003	01.02.2016, B
	20423	Tabl 80/25 mg 98 Stk Fr. 85.70 {60.38}		65314004	01.02.2016, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
04.99.00 G		Omeprax Drossapharm (Omeprazolium)	Drossapharm AG		
	20474	Kaps 10 mg 14 Stk Fr. 14.60 {5.58}		65979001	01.02.2016, B
	20474	Kaps 10 mg 28 Stk Fr. 18.45 {8.92}		65979002	01.02.2016, B
	20474	Kaps 10 mg 56 Stk Fr. 36.80 {17.78}		65979003	01.02.2016, B
	20474	Kaps 10 mg 98 Stk Fr. 52.10 {31.09}		65979004	01.02.2016, B
G		Omeprax Drossapharm (Omeprazolium)	Drossapharm AG		
	20474	Kaps 20 mg 7 Stk Fr. 14.60 {5.56}		65979005	01.02.2016, B
	20474	Kaps 20 mg 14 Stk Fr. 17.95 {8.51}		65979006	01.02.2016, B
	20474	Kaps 20 mg 28 Stk Fr. 37.20 {18.13}		65979007	01.02.2016, B
	20474	Kaps 20 mg 56 Stk Fr. 58.00 {36.25}		65979008	01.02.2016, B
	20474	Kaps 20 mg 98 Stk Fr. 85.65 {60.33}		65979009	01.02.2016, B
G		Omeprax Drossapharm (Omeprazolium)	Drossapharm AG		
	20474	Kaps 40 mg 7 Stk Fr. 16.55 {7.27}		65979010	01.02.2016, B
	20474	Kaps 40 mg 14 Stk Fr. 29.00 {14.54}		65979011	01.02.2016, B
	20474	Kaps 40 mg 28 Stk Fr. 48.45 {27.93}		65979012	01.02.2016, B
	20474	Kaps 40 mg 56 Stk Fr. 68.55 {45.43}		65979013	01.02.2016, B
	20474	Kaps 40 mg 98 Stk Fr. 101.85 {74.43}		65979014	01.02.2016, B
06.01.10 (L)		Voncento 1000 I.E./2400 I.E. (Factor VIII coagulationis humanus, von Willebrand factor)	CSL Behring AG		
Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von Fr. 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine.					
Von Willebrand Syndrom Therapie von Blutungen oder Prophylaxe und Therapie von Blutungen während Operationen bei Patienten mit von Willebrand Syndrom, für den Fall, dass die Behandlung mit Desmopressin (DDAVP) alleine nicht wirksam oder kontraindiziert ist. Hämophilie A (angeborener FVIII-Mangel) Prophylaxe und Behandlung von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit Hämophilie A.					
	20426	Trockensub c Solv 10 ml Durchstf 1 Stk Fr. 1'056.70 {990.93}		65477004	01.02.2016, B
(L)		Voncento 250 I.E./600 I.E. (Factor VIII coagulationis humanus, von Willebrand factor)	CSL Behring AG		
	20426	Trockensub c Solv 5 ml Durchstf 1 Stk Fr. 330.80 {282.73}		65477001	01.02.2016, B
(L)		Voncento 500 I.E./1200 I.E. (Factor VIII coagulationis humanus, von Willebrand factor)	CSL Behring AG		
	20426	Trockensub c Solv 5 ml Durchstf 1 Stk Fr. 548.85 {495.46}		65477003	01.02.2016, B
(L)		Voncento 500 I.E./1200 I.E. (Factor VIII coagulationis humanus, von Willebrand factor)	CSL Behring AG		
	20426	Trockensub c Solv 10 ml Durchstf 1 Stk Fr. 548.85 {495.46}		65477002	01.02.2016, B
06.03.20 G		Clopidogrel Axapharm (Clopidogrelum)	Axapharm AG		
	20471	Filmtabl 75 mg 28 Stk Fr. 45.25 {25.13}		65957001	01.02.2016, B
	20471	Filmtabl 75 mg 84 Stk Fr. 95.90 {69.24}		65957002	01.02.2016, B
07.09.00 (L)		MisoOne (Misoprostolum)	Nordic Pharma GmbH		
Medikamentöser Abbruch einer frühen intrauterinen Schwangerschaft bis zu einer Amenorrhöedauer von 49 Tagen bei Erwachsenen, nach Gabe von Mifepriston.					
	20373	Tabl 400 mcg 1 Stk Fr. 25.10 {11.14}		65378001	01.02.2016, A
07.16.10 G		Epirubicin Sandoz (Epirubicini hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20472	Inj Lös 10 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 43.00 {23.16}		56243009	01.02.2016, A
G		Epirubicin Sandoz (Epirubicini hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20472	Inj Lös 50 mg/25ml Durchstf 25 ml Fr. 115.60 {86.42}		56243010	01.02.2016, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
G	20472	Epirubicin Sandoz (Epirubicini hydrochloridum) Inj Lös 100 mg/50ml Durchstf 50 ml Fr. 186.05 {147.76}	Sandoz Pharmaceuticals AG	56243011	01.02.2016, A
G	20472	Epirubicin Sandoz (Epirubicini hydrochloridum) Inj Lös 200 mg/100ml Durchstf 100 ml Fr. 297.40 {244.76}	Sandoz Pharmaceuticals AG	56243012	01.02.2016, A
08.01.50 G	20478 20478	Doxycyclin Mepha (Doxycyclinum) Tabl 100 mg 10 Stk Fr. 9.55 {4.76} Tabl 100 mg 20 Stk Fr. 17.80 {8.36}	Mepha Pharma AG	65952002 65952001	01.02.2016, A 01.02.2016, A
G	20478	Doxycyclin Mepha (Doxycyclinum) Tabl 200 mg 10 Stk Fr. 17.20 {7.84}	Mepha Pharma AG	65952003	01.02.2016, A
08.01.80 G	20480 20480 20480	Moxifloxacin Spirig HC (Moxifloxacinum) Filmtabl 400 mg 5 Stk Fr. 37.00 {17.95} Filmtabl 400 mg 7 Stk Fr. 45.05 {24.97} Filmtabl 400 mg 10 Stk Fr. 52.70 {31.61}	Spirig HealthCare AG	65383001 65383002 65383003	01.02.2016, A 01.02.2016, A 01.02.2016, A
08.06.00 G	20477	Voriconazol Sandoz (Voriconazolom) Trockensub 200 mg Durchstf 1 Stk Fr. 169.00 {132.94}	Sandoz Pharmaceuticals AG	65064001	01.02.2016, A
G	20476	Voriconazol Sandoz (Voriconazolom) Filmtabl 50 mg 56 Stk Fr. 689.25 {586.10}	Sandoz Pharmaceuticals AG	63118001	01.02.2016, A
G	20476	Voriconazol Sandoz (Voriconazolom) Filmtabl 200 mg 28 Stk Fr. 1'375.60 {1'198.17}	Sandoz Pharmaceuticals AG	63118002	01.02.2016, A

{ }Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

II. Andere Packungen und Dosierungen

07.07.22	12865	Spiricort 20 (Prednisolonum) Filmtabl 20 mg 100 Stk Fr. 37.80 {18.65}	Spirig HealthCare AG	38840001	01.02.2016, B
	12865	Spiricort 50 (Prednisolonum) Filmtabl 50 mg 100 Stk Fr. 60.20 {38.15}	Spirig HealthCare AG	38840002	01.02.2016, B
07.15.00 (L)	18538	Humira (Adalimumabum) Inj Lös 40 mg/0.8ml Durchstechflasche 2 Stk Fr. 1'460.35 {1'275.43}	AbbVie AG	62860001	01.02.2016, B

Aktive rheumatoide Arthritis, aktive juvenile chronische Arthritis mit polyartikulärem Verlauf, Psoriasis-Arthritis: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.
Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew): Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.
Aktiver Morbus Crohn: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war. Ausserdem bei erwachsenen Patienten, die nicht mehr auf REMICADE ansprechen oder dieses nicht vertragen. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes sowie erneute Kostengutsprache nach zwei Jahren ununterbrochener Therapie.
Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.
Schwere Plaque-Psoriasis: Behandlung erwachsener Patienten, bei denen UVB und PUVA oder eine der folgenden drei systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 12 Wochen kein therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/ Polikliniken erfolgen.

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	---------	--------------

Gemäss Art. 68 Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) wird eine Streichung von Medikamenten aus der SL erst drei Monate nach Veröffentlichung im BAG-Bulletin wirksam.

{Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

III. Neu gestrichene Präparate/Packungen

01.06.00 G		Flox ex (Fluvoxamini maleas)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17529	Filmtabl 100 mg 30 Stk Fr. 35.90 {16.97}		55435002	01.02.2016, B
	17529	Filmtabl 100 mg 60 Stk Fr. 56.40 {34.86}		55435004	01.02.2016, B
01.08.00		Selegilin Mepha (Selegilini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	17039	Tabl 5 mg 50 Stk Fr. 40.70 {21.20}		53876013	01.02.2016, A
	17039	Tabl 5 mg 100 Stk Fr. 64.60 {42.00}		53876021	01.02.2016, A
02.03.00 G		Metoprolol Teva (Metoprololi tartras (2:1))	Teva Pharma AG		
	19410	Ret Tabl 25 mg 30 Stk Fr. 6.90 {2.45}		61537001	01.02.2016, B
	19410	Ret Tabl 25 mg 100 Stk Fr. 16.25 {7.03}		61537003	01.02.2016, B
G		Metoprolol Teva (Metoprololi tartras (2:1))	Teva Pharma AG		
	19410	Ret Tabl 50 mg 30 Stk Fr. 8.70 {4.01}		61537004	01.02.2016, B
	19410	Ret Tabl 50 mg 100 Stk Fr. 26.25 {12.13}		61537006	01.02.2016, B
G		Metoprolol Teva (Metoprololi tartras (2:1))	Teva Pharma AG		
	19410	Ret Tabl 100 mg 30 Stk Fr. 14.80 {5.74}		61537007	01.02.2016, B
	19410	Ret Tabl 100 mg 100 Stk Fr. 35.25 {16.43}		61537009	01.02.2016, B
G		Metoprolol Teva (Metoprololi tartras (2:1))	Teva Pharma AG		
	19410	Ret Tabl 200 mg 30 Stk Fr. 16.55 {7.27}		61537010	01.02.2016, B
	19410	Ret Tabl 200 mg 100 Stk Fr. 40.35 {20.85}		61537012	01.02.2016, B
06.07.30 (L)		Eprex (Epoetinum alfa ADNr)	Janssen-Cilag AG		
	15497	Inj Lös 8000 E/0.8ml (Protecs) 6 Fertigspr 0.800 ml Fr. 574.90 {486.49}		49078814	01.02.2016, A
07.07.23 G		Methylprednisolon Teva (Methylprednisolonum)	Teva Pharma AG		
	19435	Trockensub 40 mg Durchstf 1 Stk Fr. 9.50 {4.70}		61062001	01.02.2016, B
G		Methylprednisolon Teva (Methylprednisolonum)	Teva Pharma AG		
	19435	Trockensub 125 mg Durchstf 1 Stk Fr. 15.50 {6.34}		61062002	01.02.2016, B
G		Methylprednisolon Teva (Methylprednisolonum)	Teva Pharma AG		
	19435	Trockensub 500 mg Durchstf 1 Stk Fr. 43.75 {23.81}		61062003	01.02.2016, B
G		Methylprednisolon Teva (Methylprednisolonum)	Teva Pharma AG		
	19435	Trockensub 1 g Durchstf 1 Stk Fr. 67.50 {44.51}		61062004	01.02.2016, B
07.99.00 G		Zoledronsäure Onco Opopharma (Acidum zoledronicum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19985	Inf Konz 4 mg/5ml 5 ml Fr. 176.90 {139.80}		62127001	01.02.2016, B
17.01.00		Draximage (Xenonum (133-Xe))	Heider AG		
	18870	Inhal Gas 370 MBq Amp 1 Stk Fr. 118.50 {67.50}		58342001	01.02.2016, A
		Draximage (Xenonum (133-Xe))	Heider AG		
	18870	Inhal Gas Amp 1 Stk Fr. 158.50 {107.50}		58342001	01.02.2016, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
51.04.10		Hypericum Mepha 500 (Hyperici herbae extractum ethanolicum siccum)	Mepha Pharma AG		
	19307	Lactabs 500 mg 30 Stk Fr. 24.80 {13.45}		61367004	01.02.2016, C
	19307	Lactabs 500 mg 60 Stk Fr. 48.05 {26.04}		61367005	01.02.2016, C

IV. Preissenkungen nach Patentablauf

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Emtriva	Gilead Sciences Switzerland Sàrl Kaps 200 mg 30 Stk	080300	18072	286.35	235.15
Vfend	Pfizer AG Plv 40 mg/ml für Susp 70 ml	080600	18119	959.95	821.89
Vfend	Pfizer AG Filmtabl 50 mg 56 Stk	080600	17815	857.45	732.63
Vfend	Pfizer AG Filmtabl 200 mg 28 Stk	080600	17815	1'704.10	1'497.71

IVa. Preissenkungen nach 18 Monaten seit der Aufnahme in die SL

Anoro Ellipta	GlaxoSmithKline AG Inh Plv 55mcg/22mcg 30 Dos Inh Plv 55mcg/22mcg 3 x 30 Dosen	030430	20196 20196	70.65 179.20	47.27 141.81
----------------------	--	--------	----------------	-----------------	-----------------

V. Preissenkungen nach Erweiterung der Limitation/Indikation

Humira	AbbVie AG Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertspr 1 Stk	071500	17903	739.60	629.95
Humira	AbbVie AG Inj Lös 40 mg/0.8ml vorgefüllt Injektor/Pen 1 Stk	071500	18538	739.60	629.95

VI. Limitations-/Indikationsänderungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
071500 (L)		Humira (Adalimumabum)	ABBVIE AG		
	17903	Fertspr Inj Lös 40 mg/0.8 ml 1 Stk Fr. 739.60 {629.95}		56221002	01.07.2003, B
	18538	vorgefüllt Injektor/Pen Inj Lös 40 mg/0.8 ml 1 Stk Fr. 739.60 {629.95}		57862001	01.05.2007, B
	18538	Inj Lös 40 mg/0.8ml Durchstechfl 2 Stk Fr. 1'460.35 {1'275.43}		62860001	01.02.2016, B

Limitatio alt:

Aktive rheumatoide Arthritis und Psoriasis-Arthritis: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew): Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Aktiver Morbus Crohn: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war. Ausserdem bei erwachsenen Patienten, die nicht mehr auf REMICADE ansprechen oder dieses nicht vertragen. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes sowie erneute Kostengutsprache nach zwei Jahren ununterbrochener Therapie.

Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Schwere Plaque-Psoriasis: Behandlung erwachsener Patienten, bei denen UVB und PUVA oder eine der folgenden drei systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 12 Wochen kein

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	---------	---------------

therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/ Polikliniken erfolgen.

Limitatio neu:

Aktive rheumatoide Arthritis, aktive juvenile chronische Arthritis mit polyartikulärem Verlauf, Psoriasis-Arthritis: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew): Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Aktiver Morbus Crohn: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war. Ausserdem bei erwachsenen Patienten, die nicht mehr auf REMICADE ansprechen oder dieses nicht vertragen. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes sowie erneute Kostengutsprache nach zwei Jahren ununterbrochener Therapie.

Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Schwere Plaque-Psoriasis: Behandlung erwachsener Patienten, bei denen UVB und PUVA oder eine der folgenden drei systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 12 Wochen kein therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/ Polikliniken erfolgen.

VII. Namensänderung

Tacrolimus Sandoz heisst neu CRILOMUS

SmokeFree

Nationale Präventionsprogramme



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eine Partnerkampagne von BAG, Kantonen und NGOs,
finanziert durch den Tabakpräventionsfonds.

**SOPHIE HÖRT AUF.
DAS SCHAFFST AUCH DU.**
Tipps zum Rauchstopp gibt's beim
Arzt- oder Apothekenbesuch.



Ich bin stärker.

**S M O K E
FREE**

smokefree.ch

P.P. A
CH-3003 Bern
Post CH AG

Adressberechtigungen:
BAG Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

Bulletin 6/16