


# Bulletin 7/15

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP



**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

**Impression**

ea Druck AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 50  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles <b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	96
<b>Statistique Sentinella</b>	98
Stupéfiants <b>Vol d'ordonnances</b>	101
Assurance maladie et accidents <b>Liste des spécialités</b>	102

# Maladies transmissibles

## Déclarations des maladies infectieuses

### Situation à la fin de la 5<sup>ème</sup> semaine (03.02.2015)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.

On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu'à deux mois. Le nombre de cas confirmés et probables est de 9 en 2012 et de 9 en 2013.

	Semaine 5			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
<b>Transmission respiratoire</b>												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	12 <i>1.90</i>	4 <i>0.60</i>	6 <i>1.00</i>	104 <i>1.30</i>	80 <i>1.00</i>	77 <i>0.90</i>	14 <i>1.80</i>	8 <i>1.00</i>	10 <i>1.30</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers <sup>b</sup>	485 <i>308.40</i>	57 <i>36.20</i>	143 <i>90.90</i>	1016 <i>161.50</i>	213 <i>33.90</i>	660 <i>104.90</i>	2398 <i>29.30</i>	2367 <i>29.00</i>	1719 <i>21.00</i>	1067 <i>135.70</i>	249 <i>31.70</i>	725 <i>92.20</i>
Légionellose	14 <i>8.90</i>	4 <i>2.50</i>	4 <i>2.50</i>	30 <i>4.80</i>	13 <i>2.10</i>	16 <i>2.50</i>	313 <i>3.80</i>	279 <i>3.40</i>	280 <i>3.40</i>	36 <i>4.60</i>	18 <i>2.30</i>	26 <i>3.30</i>
Méningocoques: maladie invasive	1 <i>0.60</i>		1 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	4 <i>0.60</i>	38 <i>0.50</i>	49 <i>0.60</i>	42 <i>0.50</i>	4 <i>0.50</i>	3 <i>0.40</i>	5 <i>0.60</i>
Pneumocoques: maladie invasive	27 <i>17.20</i>	34 <i>21.60</i>	18 <i>11.40</i>	101 <i>16.10</i>	99 <i>15.70</i>	108 <i>17.20</i>	794 <i>9.70</i>	900 <i>11.00</i>	892 <i>10.90</i>	126 <i>16.00</i>	125 <i>15.90</i>	148 <i>18.80</i>
Rougeole		2 <i>1.30</i>		4 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	3 <i>0.50</i>	23 <i>0.30</i>	177 <i>2.20</i>	66 <i>0.80</i>	5 <i>0.60</i>	5 <i>0.60</i>	4 <i>0.50</i>
Rubéole <sup>c</sup>				2 <i>0.30</i>			5 <i>0.06</i>	6 <i>0.07</i>	3 <i>0.04</i>	2 <i>0.20</i>		
Rubéole, materno-fœtale <sup>d</sup>												
Tuberculose	8 <i>5.10</i>	12 <i>7.60</i>	6 <i>3.80</i>	45 <i>7.20</i>	37 <i>5.90</i>	39 <i>6.20</i>	485 <i>5.90</i>	531 <i>6.50</i>	456 <i>5.60</i>	51 <i>6.50</i>	41 <i>5.20</i>	40 <i>5.10</i>
<b>Transmission féco-orale</b>												
Campylobactériose	90 <i>57.20</i>	111 <i>70.60</i>	71 <i>45.20</i>	597 <i>94.90</i>	748 <i>118.90</i>	798 <i>126.90</i>	7450 <i>91.10</i>	7475 <i>91.40</i>	8409 <i>102.80</i>	753 <i>95.80</i>	968 <i>123.10</i>	1003 <i>127.60</i>
Hépatite A		1 <i>0.60</i>		2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	58 <i>0.70</i>	56 <i>0.70</i>	54 <i>0.70</i>	2 <i>0.20</i>	1 <i>0.10</i>	2 <i>0.20</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	2 <i>1.30</i>			8 <i>1.30</i>	5 <i>0.80</i>	4 <i>0.60</i>	128 <i>1.60</i>	83 <i>1.00</i>	61 <i>0.80</i>	9 <i>1.10</i>	7 <i>0.90</i>	6 <i>0.80</i>
Listériose		3 <i>1.90</i>	1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	15 <i>2.40</i>	4 <i>0.60</i>	91 <i>1.10</i>	76 <i>0.90</i>	42 <i>0.50</i>	10 <i>1.30</i>	19 <i>2.40</i>	6 <i>0.80</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi		1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	23 <i>0.30</i>	22 <i>0.30</i>	25 <i>0.30</i>	1 <i>0.10</i>	1 <i>0.10</i>	2 <i>0.20</i>
Salmonellose, autres	8 <i>5.10</i>	21 <i>13.40</i>	7 <i>4.40</i>	66 <i>10.50</i>	90 <i>14.30</i>	73 <i>11.60</i>	1208 <i>14.80</i>	1290 <i>15.80</i>	1233 <i>15.10</i>	74 <i>9.40</i>	102 <i>13.00</i>	88 <i>11.20</i>
Shigellose	1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>	3 <i>1.90</i>	9 <i>1.40</i>	11 <i>1.80</i>	17 <i>2.70</i>	140 <i>1.70</i>	145 <i>1.80</i>	165 <i>2.00</i>	10 <i>1.30</i>	14 <i>1.80</i>	18 <i>2.30</i>

▶▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 5			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	202 <i>128.50</i>	203 <i>129.10</i>	165 <i>104.90</i>	774 <i>123.10</i>	810 <i>128.80</i>	684 <i>108.80</i>	9706 <i>118.70</i>	8762 <i>107.20</i>	8120 <i>99.30</i>	872 <i>110.90</i>	867 <i>110.30</i>	769 <i>97.80</i>
Gonorrhée	36 <i>22.90</i>	38 <i>24.20</i>	27 <i>17.20</i>	168 <i>26.70</i>	144 <i>22.90</i>	176 <i>28.00</i>	1611 <i>19.70</i>	1680 <i>20.60</i>	1580 <i>19.30</i>	189 <i>24.00</i>	162 <i>20.60</i>	176 <i>22.40</i>
Hépatite B, aiguë			1 <i>0.60</i>		5 <i>0.80</i>	5 <i>0.80</i>	41 <i>0.50</i>	64 <i>0.80</i>	70 <i>0.90</i>		5 <i>0.60</i>	6 <i>0.80</i>
Hépatite B, total déclarations	10	25	22	85	105	80	1383	1456	1384	93	108	91
Hépatite C, aiguë					3 <i>0.50</i>	4 <i>0.60</i>	48 <i>0.60</i>	48 <i>0.60</i>	60 <i>0.70</i>		3 <i>0.40</i>	5 <i>0.60</i>
Hépatite C, total déclarations	16	28	24	113	108	95	1683	1743	1709	120	112	107
Infection à VIH		12 <i>7.60</i>		23 <i>3.70</i>	74 <i>11.80</i>	61 <i>9.70</i>	507 <i>6.20</i>	605 <i>7.40</i>	590 <i>7.20</i>	49 <i>6.20</i>	74 <i>9.40</i>	61 <i>7.80</i>
Sida				1 <i>0.20</i>			90 <i>1.10</i>	124 <i>1.50</i>	81 <i>1.00</i>	1 <i>0.10</i>		1 <i>0.10</i>
Syphilis	20 <i>12.70</i>	16 <i>10.20</i>	14 <i>8.90</i>	86 <i>13.70</i>	76 <i>12.10</i>	68 <i>10.80</i>	1072 <i>13.10</i>	1121 <i>13.70</i>	1009 <i>12.30</i>	95 <i>12.10</i>	82 <i>10.40</i>	75 <i>9.50</i>
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose							3 <i>0.04</i>	4 <i>0.05</i>	3 <i>0.04</i>			
Chikungunya	2 <i>1.30</i>			5 <i>0.80</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	91 <i>1.10</i>	5 <i>0.06</i>	3 <i>0.04</i>	7 <i>0.90</i>	2 <i>0.20</i>	2 <i>0.20</i>
Dengue	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	8 <i>1.30</i>	14 <i>2.20</i>	8 <i>1.30</i>	122 <i>1.50</i>	180 <i>2.20</i>	100 <i>1.20</i>	8 <i>1.00</i>	15 <i>1.90</i>	9 <i>1.10</i>
Encéphalite à tiques				2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	115 <i>1.40</i>	202 <i>2.50</i>	95 <i>1.20</i>	2 <i>0.20</i>	1 <i>0.10</i>	2 <i>0.20</i>
Fièvre du Nil occidental								1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>			
Fièvre jaune												
Fièvre Q	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>0.30</i>	2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	38 <i>0.50</i>	27 <i>0.30</i>	7 <i>0.09</i>	2 <i>0.20</i>	2 <i>0.20</i>	1 <i>0.10</i>
Infection à Hantavirus	1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>			2 <i>0.02</i>		7 <i>0.09</i>	1 <i>0.10</i>		
Paludisme	6 <i>3.80</i>	8 <i>5.10</i>	5 <i>3.20</i>	26 <i>4.10</i>	22 <i>3.50</i>	20 <i>3.20</i>	308 <i>3.80</i>	161 <i>2.00</i>	154 <i>1.90</i>	27 <i>3.40</i>	23 <i>2.90</i>	22 <i>2.80</i>
Trichinellose								1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>			
Tularémie		1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>		30 <i>0.40</i>	30 <i>0.40</i>	40 <i>0.50</i>		2 <i>0.20</i>	
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Maladie de Creutzfeldt-Jakob <sup>e</sup>												
Tétanos												

**Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 30.01.2015 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)**


Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	2		3		4		5		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Thème										
Suspicion d'influenza	183	12.9	270	18.4	461	32.1	569	44.7	370.8	27.0
Oreillons	0	0	2	0.1	2	0.1	0	0	1	0.1
Otite moyenne	77	5.4	80	5.5	104	7.2	97	7.6	89.5	6.4
Pneumonie	38	2.7	35	2.4	40	2.8	29	2.3	35.5	2.5
Coqueluche	4	0.3	9	0.6	5	0.3	4	0.3	5.5	0.4
Médecins déclarants	153		154		153		136		149	

Données provisoires

Déclarations de suspicion d'influenza dans le système Sentinella  
**Grippe saisonnière**

**Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants**



**Déclarations de suspicion d'influenza (état au 03.02.2015)**

**Activité et virologie en Suisse durant la semaine 5/2015**

Durant la semaine 5, 136 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 44,7 cas de suspicion d'influenza pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à

une incidence de 358 consultations dues à une affection grippale pour 100000 habitants. L'incidence a fortement augmenté par rapport à celle de la semaine précédente (272 cas pour 100000 habitants). Depuis 4 semaines, elle se situe au-dessus du seuil épidémique national.<sup>1</sup>

L'incidence était la plus élevée dans la classe d'âge des 5 à 14 ans, environ trois fois plus élevée que dans la

classe d'âge des 64 ans et plus (Tableau 1).

Toutes les régions Sentinella ont enregistré une activité grippale largement répandue, avec une tendance à

<sup>1</sup> Le seuil épidémique national a été calculé à l'aide des déclarations des 10 dernières saisons (sans pandémie 2009/10) en Suisse et se situe à 70 cas de suspicion d'influenza pour 100000 habitants pour la saison 2014/15.

la hausse (Tableau 1, Encadré). L'épidémie de grippe touche encore toutes les régions de Suisse.

Durant la semaine 5, le Centre National de Référence de l'Influenza a mis en évidence des virus Influenza dans 61% des 70 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella. Les virus détectés étaient dans 7% des échantillons positifs des Influenza B et dans 93% des Influenza A, qui appartenaient majoritairement au sous-type A(H3N2) (Tableau 2).

### Activité et virologie en Europe et dans le monde durant la semaine 4/2015

Selon le bureau régional de l'OMS pour l'Europe et selon le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) [1,2], 19 des 39 pays qui ont fourni des données ont enregistré une intensité de l'activité grippale basse, 16 pays une activité moyenne et quatre pays une activité haute. Par rapport à la semaine précédente, 29 de ces pays ont enregistré une tendance à la hausse et les autres pays une tendance constante ou à la baisse. Quant à la répartition géographique, 13 des 38 pays qui ont fourni des données ont observé une activité grippale sporadique, trois pays une activité locale, cinq pays une activité régionale et 17 pays (dont la France, l'Allemagne et l'Italie) une activité largement répandue.

En Europe, des virus Influenza ont été mis en évidence dans 48% des 2090 échantillons sentinelles testés, soit plus fréquemment que durant la semaine précédente (40%). 13% des virus détectés étaient des Influenza B et 87% des Influenza A, qui appartenaient majoritairement au sous-type A(H3N2) (Tableau 2). Dans 19 des 25 pays qui ont fourni des données (dont l'Allemagne), dominait la souche Influenza A(H3N2), dans deux pays (dont l'Italie) Influenza A(H1N1)pdm09 et dans trois pays également Influenza A, toutefois sans indication du sous-type. Des virus Influenza B ont été majoritairement mis en évidence seulement au Portugal. L'ensemble des 64 virus Influenza A(H1N1)pdm09 et 9% des 124 virus Influenza B caractérisés antigéniquement ou génétiquement depuis la semaine 40/2014 sont couverts

Tableau 1  
**Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l'âge et de la région** pour 100 000 habitants durant la semaine 5/2015

Incidence	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Activité grippale Classification, (tendance)
<b>Incidence par âge</b>		
0-4 ans	398	(constante)
5-14 ans	530	(ascendante)
15-29 ans	396	(ascendante)
30-64 ans	348	(ascendante)
≥ 65 ans	171	(ascendante)
<b>Incidence par région Sentinella</b>		
Région 1 (GE, NE, VD, VS)	317	largement répandue, (ascendante)
Région 2 (BE, FR, JU)	404	largement répandue, (ascendante)
Région 3 (AG, BL, BS, SO)	269	largement répandue, (ascendante)
Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	413	largement répandue, (ascendante)
Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)	329	largement répandue, (ascendante)
Région 6 (GR, TI)	500	largement répandue, (ascendante)
Suisse	358	largement répandue, (ascendante)

Tableau 2  
**Virus Influenza circulant en Suisse et en Europe**  
Fréquence des types et sous-types d'Influenza isolés durant la semaine actuelle et les semaines cumulées depuis la semaine 40/2014

	Semaine actuelle	Semaines cumulées
<b>Suisse durant la semaine 5/2015</b>		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	61% (70)	38% (446)
B	7%	11%
A(H3N2)	49%	63%
A(H1N1)pdm09	16%	19%
A non sous-typé	28%	7%
<b>Europe durant la semaine 4/2015</b>		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	48% (2090)	21% (15869)
B	13%	17%
A(H3N2)	58%	61%
A(H1N1)pdm09	17%	15%
A non sous-typé	12%	7%

par le vaccin contre la grippe saisonnière 2014 [3]. 63% des 455 virus Influenza A(H3N2) ont évolué génétiquement et antigéniquement, et ne sont que partiellement couverts par le vaccin. Aucun des 376 virus Influenza A(H3N2), des 34 virus Influenza A(H1N1)pdm09 et des 17 virus Influenza B testés ne présentait de résistance à l'Oseltamivir ou au Zanamivir.

Durant la semaine 4 aux Etats-Unis [4], la plupart des Etats ont enregistré une activité grippale largement répandue et d'une intensité haute. L'activité se situait au-dessus du niveau de référence national. 7%

des virus grippaux détectés étaient des Influenza B et 93% des Influenza A, qui appartenaient majoritairement au sous-type A(H3N2). Aux Etats-Unis, 41% des 602 virus Influenza antigéniquement caractérisés depuis la semaine 40/2014 sont couverts par le vaccin trivalent contre la grippe et 48% par le vaccin quadrivalent [3]. Aucun des 948 virus Influenza A(H3N2) et des 139 virus Influenza B testés ne présentait de résistance à l'Oseltamivir ou au Zanamivir. 6% des 16 virus Influenza A(H1N1)pdm09 testés étaient résistants à l'Oseltamivir, mais sensibles au Zanamivir. ■

## LA SURVEILLANCE SENTINELLA DE LA GRIPPE EN SUISSE

*L'évaluation épidémiologique de l'activité grippale saisonnière est basée (1) sur les déclarations hebdomadaires de suspicion d'influenza transmises par les médecins Sentinella, (2) sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève et (3) sur tous les sous-types d'Influenza confirmés par les laboratoires soumis à la déclaration obligatoire.*

*Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.*

## CLASSIFICATION DE L'ACTIVITÉ GRIPPALE

*La classification de l'activité grippale se base (1) sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et (2) sur la mise en évidence des virus Influenza au CNRI :*

- Pas d'activité : moins de 30% des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Aucun virus Influenza n'a été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle et précédente.*
- Sporadique : moins de 30% des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*
- Répandue : 30 à 49% des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*
- Largement répandue : 50% et plus des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*

*Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Cette dernière est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella!*

### Contact

Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone 058 463 87 06

### Références

1. World Health Organisation Regional office for Europe, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Flu News Europe, [www.flunewseurope.org/](http://www.flunewseurope.org/)
2. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza – Latest surveillance data (accessed on 02.02.2015), [www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal\\_influenza/epidemiological\\_data/Pages/Latest\\_surveillance\\_data.aspx](http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Latest_surveillance_data.aspx)
3. World Health Organisation (WHO). Recommended viruses for influenza vaccines for use in the 2014–15 northern hemisphere influenza season, [www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2014\\_15\\_north/en/](http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2014_15_north/en/)
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). FluView, [www.cdc.gov/flu/weekly](http://www.cdc.gov/flu/weekly)



---

Stupéfiants

# Vol d'ordonnances

---

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

---

Canton	N <sup>os</sup> de bloc	Ordonnances n <sup>os</sup>
Genève	88830F 89517F	2220702–2220726 2237901–2237925

---

Swissmedic  
Division stupéfiants

# Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.listedesspecialites.ch](http://www.listedesspecialites.ch)

## Valable à partir du 1<sup>er</sup> février 2015

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.09.00 (L)G		<b>Ondansetron Labatec</b> (Ondansetronum)	Labatec Pharma SA		
	20323	Traitement des vomissements aigus du à une chimiothérapie avec effet hautement émétisant, durant trois jours maximum. Filmtabl 4 mg 10 Stk Fr. 55.45 {34.00}		65145001	01.02.2015, B
(L)G		<b>Ondansetron Labatec</b> (Ondansetronum)	Labatec Pharma SA		
	20323	Filmtabl 8 mg 6 Stk Fr. 55.45 {34.00}		65145002	01.02.2015, B
(L)G		<b>Ondansetron ODT Labatec</b> (Ondansetronum)	Labatec Pharma SA		
	20306	Traitement des vomissements aigus du à une chimiothérapie avec effet hautement émétisant, durant trois jours maximum. Schmelztabl 4 mg 10 Stk Fr. 59.30 {37.38}	63263002	01.02.2015, B	
(L)G		<b>Ondansetron ODT Labatec</b> (Ondansetronum)	Labatec Pharma SA		
	20306	Schmelztabl 8 mg 6 Stk Fr. 59.45 {37.52}		63263003	01.02.2015, B
07.99.00 (L)G		<b>Alendron D3-Mepha Wochentabl</b> (Acidum alendronicum, Cholecalciferolum (Vitamin D3))	Mepha Pharma AG		
	20324	Ostéoporose documentée (diminution de plus de 2,5 déviations-standard à l'ostéodensitométrie ou fracture). Tabl 70/2800 4 Stk Fr. 42.05 {22.33}		65131001	01.02.2015, B
	20324	Tabl 70/2800 12 Stk Fr. 90.20 {64.27}		65131002	01.02.2015, B
(L)G		<b>Alendron D3-Mepha Wochentabl</b> (Acidum alendronicum, Cholecalciferolum (Vitamin D3))	Mepha Pharma AG		
	20324	Tabl 70/5600 4 Stk Fr. 42.05 {22.33}		65131003	01.02.2015, B
	20324	Tabl 70/5600 12 Stk Fr. 90.20 {64.27}		65131004	01.02.2015, B
(L)G		<b>Orlistat Spirig HC</b> (Orlistatum)	Spirig HealthCare AG		

#### Au moins BMI 28

Uniquement pour le traitement de patients obèses souffrant de diabète de type 2 et recevant à ce titre un ou plusieurs antidiabétiques oraux. Le traitement doit être arrêté au bout de six mois si la perte de poids n'est pas d'au moins 5 kg par rapport au poids corporel mesuré au début de la médication et/ou si le taux d'HbA1c n'a pas baissé d'au moins 0,5%. Si l'objectif est atteint, le traitement est poursuivi pour une durée maximale de deux ans.

Prise en charge des coûts après accord préalable du médecin-conseil de l'assureur.

#### Au moins BMI 35

Uniquement pour le traitement de patients obèses. Le traitement doit être arrêté au bout de six mois si la perte de poids n'est pas d'au moins 10% par rapport au poids corporel mesuré au début de la médication. Si cet objectif est atteint, le traitement sera poursuivi pour une durée maximale de deux ans.

Prise en charge des coûts après accord préalable du médecin-conseil de l'assureur.

	20322	Kaps 120 mg 42 Stk Fr. 47.65 {27.20}		65219001	01.02.2015, B
	20322	Kaps 120 mg 84 Stk Fr. 77.35 {53.10}		65219002	01.02.2015, B
G		<b>Zoledronat Zentiva Onco</b> (Acidum zoledronicum)	Helvepharm AG		
	20326	Inf Lös 4 mg/100ml 1 Stk Fr. 204.50 {163.85}		65068001	01.02.2015, B
08.03.00 G		<b>Efavirenz Mepha</b> (Efavirenzum)	Mepha Pharma AG		
	20328	Lactabs 600 mg 30 Stk Fr. 291.40 {239.54}		63083001	01.02.2015, A
(L)		<b>Exviera</b> (Dasabuvirum)	AbbVie AG		

En association avec Viekirax ou avec Viekirax et la ribavirine dans le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 qui remplissent l'un des critères suivants :

- fibrose hépatique de degré 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de >9.5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.
- patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.

La durée maximale de remboursement sera limitée comme suit :

- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1b, sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1a, sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1, avec cirrhose : 12 semaines

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
<p>– Patients infectés par le VHC de génotype 1a, avec cirrhose, déjà traités précédemment et n'ayant pas atteint de réponse sous interféron et ribavirine (répondeurs nuls): 24 semaines.</p> <p>La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante: <a href="http://www.bag.admin.ch/lis-ref">www.bag.admin.ch/lis-ref</a>.</p>					
	20303	Filmtabl 250 mg 56 Stk Fr. 1'793.30 {1'579.02}		65302001	01.02.2015, A
(L)		<b>Harvoni</b> (Sofosbuvirum, Ledipasvirum)	Gilead Sciences Switzerland Sàrl		
<p>Harvoni est indiqué pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 chez les adultes qui répondent aux critères suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fibrose hépatique de degré 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de &gt;9.5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.</li> <li>– patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.</li> <li>– patients avec cirrhose décompensée et/ou patients avant ou après une transplantation du foie.</li> </ul> <p>La durée maximale de remboursement est à limiter comme ceci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– patients naïfs de tout traitement sans cirrhose: 8 à 12 semaines</li> <li>– patients naïfs de tout traitement avec cirrhose: 12 semaines</li> <li>– patients pré-traités sans cirrhose: 12 semaines</li> <li>– patients pré-traités avec cirrhose: 24 semaines.</li> </ul> <p>La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante: <a href="http://www.bag.admin.ch/lis-ref">www.bag.admin.ch/lis-ref</a>.</p> <p>Les thérapies combinées avec d'autres médicaments contre l'hépatite C ne sont pas remboursées.</p>					
	20308	Filmtabl 90/400 mg 28 Stk Fr. 20'787.75 {20'040.72}		65331001	01.02.2015, A
(L)		<b>Viekirax</b> (Ombitasvirum, Paritaprevirum, Ritonavirum)	AbbVie AG		
<p>En association avec Exviera ou avec Exviera et la ribavirine dans le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 qui remplissent l'un des critères suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fibrose hépatique de degré 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de &gt; 9.5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.</li> <li>– patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.</li> </ul> <p>La durée maximale de remboursement sera limitée comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Patients avec une infection par le VHC de génotype 1b, sans cirrhose: 12 semaines</li> <li>– Patients avec une infection par le VHC de génotype 1a, sans cirrhose: 12 semaines</li> <li>– Patients avec une infection par le VHC de génotype 1, avec cirrhose: 12 semaines</li> <li>– Patients infectés par le VHC de génotype 1a, avec cirrhose, déjà traités précédemment et n'ayant pas atteint de réponse sous interféron et ribavirine (répondeurs nuls): 24 semaines.</li> </ul> <p>La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante: <a href="http://www.bag.admin.ch/lis-ref">www.bag.admin.ch/lis-ref</a>.</p>					
	20307	Filmtabl 12.5/75/50 mg 56 Stk Fr. 18'858.70 {18'158.75}		65301001	01.02.2015, A
10.09.41 G		<b>Amorolfine Mepha Nagellack</b> (Amorolfinum)	Mepha Pharma AG		
	20325	Lös 5 % 5 ml Fr. 47.00 {26.65}		65132001	01.02.2015, B
11.09.00		<b>Simbrinza</b> (Brinzolamidum, Brimonidini tartras)	Alcon Switzerland SA		
	20286	Susp Ophth 5 ml Fr. 41.85 {22.15}		65186001	01.02.2015, B
	20286	Susp Ophth 3 Fl 5 ml Fr. 88.85 {63.13}		65186002	01.02.2015, B

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### II. Autres emballages et dosages

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.02.50		<b>Calcimagon D3</b> (Cholecalciferolum (Vitamin D3), Calcii carbonas)	Takeda Pharma AG		
	16787	Kautabl 500/800 Zitronen Ds 30 Stk Fr. 22.00 {11.92}		53929003	01.02.2015, D
	16787	Kautabl 500/800 Zitronen Ds 90 Stk Fr. 56.45 {30.60}		53929005	01.02.2015, D
07.16.10 G		<b>Irinotecan Actavis</b> (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)	Actavis Switzerland AG		
	19020	Inf Konz 500 mg/25ml Durchstf 25 ml Fr. 533.00 {450.00}		59217003	01.02.2015, A

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
02.04.40		<b>Regitin</b> (Phentolamini mesilas)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	7523	Inj Lös 10 mg/ml i.m./i.v. 5 Amp 1 ml Fr. 8.55 {3.90}		16576018	01.02.2015, B
02.07.10 G		<b>Enalapril Teva Medika</b> (Enalapriili maleas)	Teva Pharma AG		
	19383	Tabl 5 mg 30 Stk Fr. 7.15 {2.66}		61635001	01.02.2015, B
G		<b>Enalapril Teva Medika</b> (Enalapriili maleas)	Teva Pharma AG		
	19383	Tabl 10 mg 30 Stk Fr. 9.80 {4.98}		61635002	01.02.2015, B
	19383	Tabl 10 mg 100 Stk Fr. 35.05 {16.23}		61635003	01.02.2015, B
G		<b>Enalapril Teva Medika</b> (Enalapriili maleas)	Teva Pharma AG		
	19383	Tabl 20 mg 30 Stk Fr. 17.95 {8.48}		61635004	01.02.2015, B
	19383	Tabl 20 mg 100 Stk Fr. 47.15 {26.80}		61635005	01.02.2015, B
G		<b>Perindopril Mepha</b> (Perindoprilum-tert-butylaminum)	Mepha Pharma AG		
	19059	Tabl 4 mg 30 Stk Fr. 20.60 {10.80}		57844001	01.02.2015, B
	19059	Tabl 4 mg 90 Stk Fr. 40.30 {20.84}		57844003	01.02.2015, B
G		<b>Perindopril Mepha</b> (Perindoprilum-tert-butylaminum)	Mepha Pharma AG		
	19059	Tabl 8 mg 30 Stk Fr. 27.50 {13.25}		57844007	01.02.2015, B
	19059	Tabl 8 mg 90 Stk Fr. 44.25 {24.28}		57844009	01.02.2015, B
03.02.00 G		<b>Mucoseptal</b> (Carbocisteinum)	Actipharm SA		
	15327	Kaps 30 Stk Fr. 17.35 { }		48180019	01.02.2015, D
06.07.30 (L)		<b>Tevagrastim</b> (Filgrastimum ADNr)	Teva Pharma AG		
	18901	Inj Lös 30 Mio E/0.5ml Fertigspr 1 Stk Fr. 125.35 {94.90}		58663001	01.02.2015, A
(L)		<b>Tevagrastim</b> (Filgrastimum ADNr)	Teva Pharma AG		
	18901	Inj Lös 48 Mio E/0.8ml Fertigspr 1 Stk Fr. 173.40 {136.75}		58663004	01.02.2015, A
07.10.10 G		<b>Mefenamin Teva</b> (Acidum mefenamicum)	Teva Pharma AG		
	17593	Filmtabl 500 mg teilbar 10 Stk Fr. 6.05 {1.72}		55666012	01.02.2015, B
	17593	Filmtabl 500 mg teilbar 30 Stk Fr. 9.00 {4.28}		55666013	01.02.2015, B
	17593	Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk Fr. 25.65 {11.67}		55666014	01.02.2015, B
07.10.40		<b>Voltaren forte</b> (Diclofenacum natricum)	Novartis Consumer Health Schweiz AG		
	20150	Emulgel 50 g Fr. 12.05 {6.41}		61858001	01.02.2015, D
	20150	Emulgel 100 g Fr. 20.80 {11.28}		61858002	01.02.2015, D

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.12.00 G		<b>Pravalotin Mepha 20</b> (Pravastatinum natricum) Tabl 30 Stk Fr. 19.30 {9.69}	Mepha Pharma AG	57243014	01.02.2015, B
	18140	Tabl 100 Stk Fr. 65.70 {42.94}		57243016	01.02.2015, B
G		<b>Pravalotin Mepha 40</b> (Pravastatinum natricum) Tabl 30 Stk Fr. 29.05 {14.61}	Mepha Pharma AG	57243018	01.02.2015, B
	18140	Tabl 100 Stk Fr. 87.95 {62.32}		57243020	01.02.2015, B
08.06.00 G		<b>Fluconazol Teva</b> (Fluconazolium) Kaps 50 mg 7 Stk Fr. 26.35 {12.24}	Teva Pharma AG	56980013	01.02.2015, B
	18145	Kaps 50 mg 28 Stk Fr. 78.25 {53.86}		56980015	01.02.2015, B
G		<b>Fluconazol Teva</b> (Fluconazolium) Kaps 150 mg 1 Stk Fr. 14.40 {5.40}	Teva Pharma AG	56980017	01.02.2015, B
	18145	Kaps 150 mg 4 Stk Fr. 39.60 {20.22}		56980019	01.02.2015, B
G		<b>Fluconazol Teva</b> (Fluconazolium) Kaps 200 mg 2 Stk Fr. 26.20 {12.12}	Teva Pharma AG	56980023	01.02.2015, B
	18145	Kaps 200 mg 7 Stk Fr. 67.75 {44.73}		56980021	01.02.2015, B
10.02.00	13890	<b>Tasmaderm</b> (Motretinidum) Lot 50 ml Fr. 17.40 {9.43}	Gebro Pharma AG	41177012	01.02.2015, C
10.09.42	13255	<b>Daktacort</b> (Miconazoli nitras, Hydrocortisonum) Creme 15 g Fr. 6.30 {1.90}	Janssen-Cilag AG	41599014	01.02.2015, B
52.98.00		<b>Crataegus Mepha</b> (Crataegi folii cum flore extractum ethanolicum siccum) Lactabs 450 mg 50 Stk Fr. 22.20 {12.05}	Mepha Pharma AG	56010001	01.02.2015, D
	19308	Lactabs 450 mg 100 Stk Fr. 39.10 {21.21}		56010002	01.02.2015, D

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Actonel</b> Tabl 5 mg 28 Stk Tabl 5 mg 84 Stk	Actavis Switzerland AG	079900	17646 17646	50.45 112.30	29.64 83.55
<b>Actonel</b> Tabl 30 mg 28 Stk	Actavis Switzerland AG	079900	17646	294.15	241.96
<b>Actonel Wochentablette</b> Tabl 35 mg 4 Stk Tabl 35 mg 12 Stk	Actavis Switzerland AG	079900	17646 17646	50.45 112.30	29.64 83.55
<b>Atovaquon Plus Spirig HC</b> Filmtabl 250/100 12 Stk	Spirig HealthCare AG	080410	20279	52.90	31.81
<b>Gemcitabin Actavis</b> Trockensub 200 mg Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	19018	40.50	21.00
<b>Gemcitabin Actavis</b> Trockensub 1 g Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	19018	114.00	85.00
<b>Gemcitabin Actavis</b> Trockensub 2 g Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	19018	200.10	160.00
<b>Mometasonfuroat Sandoz</b> Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 Dos	Sandoz Pharmaceuticals AG	120230	20171	17.70	8.27
<b>Zomig</b> Filmtabl 2.500 mg 12 Stk	AstraZeneca AG	020510	17044	70.15	46.84

**IVa. Réductions de prix après échéance du brevet**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Nasonex Dossier Nasenspray</b> Nasenspray 50 mcg 140 Dos	MSD Merck Sharp & Dohme AG	120230	17019	20.10	10.35
<b>Remicade</b> Trockensub 100 mg Durchstf 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	17463	830.90	709.48

**V. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Stelara</b> Inj Lös 45 mg/0.5ml Fertigspr 0.500 ml	Janssen-Cilag AG	071500	19301	4'431.20	4'083.11
<b>Stelara</b> Inj Lös 90 mg/ml Fertigspr 1 ml	Janssen-Cilag AG	071500	19301	4'431.20	4'083.11

**VI. Augmentations de prix**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>NaCl Bichsel</b> Inf Lös 0.900 % 100ml Plastikfla m Be Plast FI 100 ml	Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG	050320	12487	7.75	3.20
<b>NaCl Bichsel</b> Inf Lös 0.900 % 250ml Plastikfla m Be Plast FI 250 ml	Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG	050320	12487	8.05	3.45
<b>NaCl Bichsel</b> Inf Lös 0.900 % 500ml Plastikfla m Be Plast FI 500 ml	Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG	050320	12487	8.50	3.85
<b>NaCl Bichsel</b> Inf Lös 0.900 % 1000ml Plastikfla m Be Plast FI 1000 ml	Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG	050320	12487	9.00	4.25

**VII. Modifications de la limitation/de l'indication**

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.15.00 (L)	17463	<b>Remicade</b> (Infliximabum) Durchstf Trockensub 1 Stk 100 mg Fr.	MSD MERCK SHARP & DOHME AG	55184001	01.07.2000, A

**Vieille limitation:**

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active lorsque le traitement antirhumatismal standard précédent par des antirhumatismeux de fond (DMARD) a été insuffisant. Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Traitement de patients atteints de maladie de Crohn active lorsque le traitement conventionnel précédent (p. ex. par l'azathioprine, la 6-mercaptopurine, les stéroïdes) a été insuffisant.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Traitement de la maladie de Bechterew en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Traitement de la colite ulcéreuse sévère, chez les patients non répondeurs ou à mauvaise tolérance à la thérapie avec 5-ASA, corticostéroïdes et immunosuppresseurs. Chez les patients non répondeurs au traitement par REMICADE, celui-ci devra être arrêté après la troisième perfusion. Les patients répondant à la thérapie peuvent poursuivre le traitement jusqu'à une durée maximale d'une année.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur, lorsque le traitement doit être supérieur à trois cycles de thérapie.

Traitement de patients adultes, atteints de psoriasis en plaques sévère chez lesquels 1.) les UVB et la PUVA ou 2.) l'un des trois traitements systémiques suivants (ciclosporine, méthotrexate, acitrétine) et 3.) un anti-TNF alpha (p. ex. étanercept) n'ont pas permis d'obtenir un succès thérapeutique. En l'absence de succès thérapeutique au bout de 14 semaines, il faut arrêter le traitement. La durée maximale du traitement est de 1 an.

Seuls des dermatologues ou des cliniques universitaires/polycliniques dermatologiques peuvent le prescrire.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Traitement de patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active 1.) seulement en association avec le méthotrexate, en cas d'échec d'au moins deux DMARD de fond, dont le méthotrexate et 2.) après échec des associations méthotrexate/ étanercept ou méthotrexate/ adalimumab.

Seuls des rhumatologues/dermatologues ou des cliniques universitaires/polycliniques rhumatologiques/dermatologiques peuvent le prescrire.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

**Nouvelle limitation :**

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active lorsque le traitement antirhumatismal standard précédent par des antirhumatismeux de fond (DMARD) a été insuffisant. Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.  
 Traitement de patients atteints de maladie de Crohn active lorsque le traitement conventionnel précédent (p. ex. par l'azathioprine, la 6-mercaptopurine, les stéroïdes) a été insuffisant.  
 Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.  
 Traitement de la maladie de Bechterew en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel.  
 Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.  
 Colite ulcéreuse modérée à grave chez les patients adultes: traitement par REMICADE lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant ou n'a pas été toléré.  
 Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation du médecin-conseil.  
 Traitement de patients adultes, atteints de psoriasis en plaques sévère chez lesquels 1.) les UVB et la PUVA ou 2.) l'un des trois traitements systémiques suivants (ciclosporine, méthotrexate, acitrétine) et 3.) un anti-TNF alpha (p. ex. étanercept) n'ont pas permis d'obtenir un succès thérapeutique. En l'absence de succès thérapeutique au bout de 14 semaines, il faut arrêter le traitement. La durée maximale du traitement est de 1 an.  
 Seuls des dermatologues ou des cliniques universitaires/polycliniques dermatologiques peuvent le prescrire.  
 Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.  
 Traitement de patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active 1.) seulement en association avec le méthotrexate, en cas d'échec d'au moins deux DMARD de fond, dont le méthotrexate et 2.) après échec des associations méthotrexate/ étanercept ou méthotrexate/ adalimumab.  
 Seuls des rhumatologues/dermatologues ou des cliniques universitaires/polycliniques rhumatologiques/dermatologiques peuvent le prescrire.  
 Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

(L)		<b>Stelara</b> (Ustekinumabum)	JANSSEN-CILAG AG		
	19301	Fertigspr Inj Lös 45 mg/0,5 ml 1 Stk Fr. 4'431.20 {4'083.11}		61267001	01.02.2011, B
	19301	Fertigspr Inj Lös 90 mg/ml 1 Stk Fr. 4'431.20 {4'083.11}		61267002	01.02.2011, B

**Vieille limitation :**

Traitement de patients adultes atteints de formes sévères de psoriasis en plaque, qui n'ont pas répondu à la photothérapie UVB et à PUVA thérapie ou à l'un des trois traitements systémique suivants (ciclosporine, méthotrexate, acitrétine). Si aucun succès thérapeutique ne s'est manifesté avant la troisième injection, le traitement doit être interrompu. La prescription ne peut être rédigée que par des dermatologues ou des hôpitaux universitaires/polycliniques spécialis(e)s en dermatologie.  
 La durée maximale du traitement est de 3 ans. Le dosage de 90 mg est réservé seulement pour les patients qui on un poids de plus de 100 kg.

**Nouvelle limitation :**

Traitement de patients adultes atteints de formes sévères de psoriasis en plaque, qui n'ont pas répondu à la photothérapie UVB et à PUVA thérapie ou à l'un des trois traitements systémique suivants (ciclosporine, méthotrexate, acitrétine). Si aucun succès thérapeutique ne s'est manifesté avant la troisième injection, le traitement doit être interrompu.  
 Traitement de patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active en monothérapie ou en association avec méthotrexate (MTX) lorsque la réponse à un traitement préalable par antirhumatismeux modificateurs de la maladie (DMARD) a été insuffisante.  
 Il ne peut être prescrit que par des médecins spécialistes en dermatologie ou rhumatologie ou des cliniques universitaires/polycliniques dermatologiques.

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements  
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 7/15