



## COVID-19: panoramica delle tipologie di test

	Test PCR nasofaringeo	Test PCR salivare	Test antigenico rapido nasofaringeo	Test antigenico rapido nasale	Test fai da te nasale
<i>Svolgimento dell'analisi</i>	Laboratorio	Laboratorio	Sul posto (p. es. in farmacia)	Sul posto (p. es. in farmacia)	Ovunque
<i>Prelievo di campioni</i>	Specialista	Chiunque	Specialista	Specialista	Chiunque
<i>Disponibilità di test validati</i>	Sì	Sì	Sì	Sì (finora 1 test validato)	No
<i>Affidabilità</i>	Molto elevata	Elevata	Elevata	Buona in caso di sintomi; probabilmente più bassa in assenza di sintomi	Buona in caso di sintomi; probabilmente più bassa in assenza di sintomi
<i>Indicazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persone con sintomi</li> <li>– Persone a rischio</li> <li>– Professionisti della salute</li> <li>– Persone risultate positive al test rapido o al test fai da te</li> </ul>	Test a ripetizione, p. es.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nelle imprese</li> <li>– nelle scuole</li> <li>– del personale delle case per anziani</li> <li>– nelle società sportive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persone con sintomi</li> <li>– Test a ripetizione</li> <li>– In caso di contatto con persone particolarmente a rischio (p. es. visita in una casa per anziani)</li> <li>– Test a richiesta, in farmacia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Test a richiesta, in farmacia</li> <li>– Test a ripetizione se sul mercato sono disponibili test sufficientemente affidabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Test a richiesta, a casa</li> <li>– Test a ripetizione se sul mercato sono disponibili test sufficientemente affidabili</li> </ul>
<i>Procedura in caso di test positivo</i>	Isolamento	Test PCR di conferma; isolamento	Test PCR di conferma; isolamento	Test PCR di conferma; isolamento	Test PCR di conferma; isolamento