



# Neues Coronavirus (COVID-19)

## Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien

Stand: 16.04.2020

### Klinische Kriterien

- Symptome einer **akuten Atemwegserkrankung** (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) und/oder
- **Fieber**  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  und/oder
- Plötzlich auftretende **Anosmie** oder **Ageusie**

### Beprobungskriterien

Eine labordiagnostische Abklärung wird empfohlen bei Personen, welche die **klinischen Kriterien** sowie mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- **Hospitalisierte Personen**, unabhängig von der Schwere der Symptome
- **Besonders gefährdete Personen** (ab 65 Jahre, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislaufkrankung, chronische Atemwegserkrankung, Immunsuppression, Krebs)
- **(Gesundheits-)Personal in direktem Kontakt** (< 2 m während > 15 Minuten) **mit Patienten bzw. Bewohnern in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie anderen sozialmedizinischen Institutionen** (z.B. Institutionen für Menschen mit Behinderung)

Auf Entscheid der Ärztinnen und Ärzte können auch symptomatische Personen, die keines dieser Kriterien erfüllen, getestet werden, wenn dies **zum Schutz von besonders gefährdeten Personen beiträgt**.

### Epidemiologische Kriterien

- Epidemiologischer Link zu einem laborbestätigten Fall: enger Kontakt (< 2 m während > 15 Minuten) oder indirekter Kontakt mit einem laborbestätigten COVID-19-Fall (z.B. während eines Ausbruchs in einem Altersheim)

### Meldekriterien

- **Diagnostizierende Laboratorien** melden:
  - **alle mittels PCR nachgewiesenen positiven Befunde** innerhalb von 24 Stunden an das Kantonsarztamt und das BAG
  - **die mittels PCR nachgewiesenen negativen Befunde** als tägliches Total in aggregierter Form täglich ans BAG
- **Ärztinnen und Ärzte** melden innerhalb von 24 Stunden an das Kantonsarztamt und das BAG:
  - **klinische Befunde von hospitalisierten Personen mit:**
    - **laborbestätigter COVID-19 Diagnose mittels PCR** oder
    - **klinischen Kriterien** und **CT-Scan vereinbar mit COVID-19** und **negativer PCR** ohne andere Ätiologie oder
    - **klinischen und epidemiologischen Kriterien** und **negativer PCR** ohne andere Ätiologie
  - **Klinische Befunde von Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen sowie anderen sozialmedizinischen Institutionen** (z.B. Institutionen für Menschen mit Behinderung) mit:
    - **laborbestätigter COVID-19 Diagnose mittels PCR**
  - **klinische Befunde von verstorbenen Personen mit:**
    - **laborbestätigter COVID-19 Diagnose mittels PCR** oder
    - **klinische Kriterien** und **CT-Scan vereinbar mit COVID-19** oder
    - **klinische und epidemiologische Kriterien**