

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.7%	7.0%	1.0	748	7.7%	6.3%	1.2	723
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	2.2%	1.0%	2.3	45	5.1%	0.6%	8.1	39
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	2.8%	2.5%	1.1	285	4.8%	2.2%	2.1	251
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	8.0%	7.8%	1.0	338	9.5%	7.0%	1.4	369
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	17.5%	22.7%	0.8	80	10.9%	21.4%	0.5	64
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	86.1%	51.5%	*	644	85.2%	52.2%	*	616
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	10.9%	10.4%	1.1	357	13.3%	9.6%	1.4	332
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.6%	4.1%	0.9	302	4.2%	3.2%	1.3	288
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.7%	7.1%	*	13	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.2%	6.6%	0.9	403	9.9%	6.4%	1.6	342
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	6.9%	5.2%	1.3	332	4.8%	4.5%	1.1	372
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	5.3%	8.9%	0.6	377	6.6%	8.2%	0.8	442
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.6%	0.0	45	0.0%	2.6%	0.0	62
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.5%	8.0%	0.8	201	7.8%	7.2%	1.1	230
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	5.6%	12.6%	0.4	126	7.4%	12.3%	0.6	148
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik-/intervention insgesamt	*	*	*	2'067	*	*	*	1'958
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	3.9%	3.6%	1.1	585	5.2%	3.0%	1.7	558
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	8.5%	6.9%	1.2	129	8.5%	9.5%	0.9	142
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.4%	0.5%	0.8	1'234	0.3%	0.5%	0.7	1'155
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	42.7%	38.2%	*	527	40.3%	37.7%	*	465
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	563	*	*	*	579
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	363	*	*	*	359
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	150	*	*	*	124
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	262	*	*	*	321
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	11	*	*	*	25
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	611	*	*	*	684
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	281	*	*	*	327
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	386	*	*	*	413
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	100	*	*	*	151
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	148	*	*	*	188
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	2.6%	2.9%	0.9	116	3.0%	2.6%	1.2	134
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.6%	2.7%	2.0	54	10.6%	6.0%	1.8	47
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.3%	1.3%	1.8	218	2.2%	1.8%	1.3	223
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	0.0%	0.0%	*	12	0.0%	0.0%	*	11
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	43	0.0%	0.6%	0.0	41
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	86	1.1%	1.6%	0.7	87
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	4.5%	2.0%	2.2	66	4.2%	2.8%	1.5	72
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	18.2%	3.6%	5.1	11	8.3%	2.8%	3.0	12
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	8.4%	11.9%	0.7	594	9.0%	11.9%	0.8	647
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	32	8.8%	3.2%	2.8	34
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	8.3%	6.2%	1.3	144	6.1%	6.4%	0.9	148
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	8.4%	12.2%	0.7	333	9.4%	11.6%	0.8	360
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	11.8%	23.4%	0.5	85	11.4%	23.1%	0.5	105
<i>B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)</i>	*	...	12.5%	7.9%	*	81
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	5.1%	7.8%	0.7	468	5.4%	7.9%	0.7	503
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	5.2%	8.1%	0.7	400	5.5%	7.7%	0.7	434
<i>B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse</i>	14.3%	7.8%	*	67	3.4%	7.6%	*	17
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	10.4%	9.8%	1.1	67	0.0%	10.0%	0.0	17
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	21.2%	29.7%	0.7	80	20.8%	27.0%	0.8	101
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	21.4%	14.3%	1.5	42	25.7%	16.7%	1.5	35
<i>B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	106	0.0%	0.1%	0.0	131
<i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>	*	...	*	*	*	<10
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
<i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>	*	*	*	...	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	5.4%	7.0%	0.8	386	3.3%	6.4%	0.5	448
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	30	0.0%	0.7%	0.0	51
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.0%	4.0%	1.0	100	4.9%	3.6%	1.4	102
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	4.8%	7.2%	0.7	166	2.8%	6.8%	0.4	212
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	9.0%	12.3%	0.7	89	4.9%	12.3%	0.4	82
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.2%	5.7%	0.6	311	2.5%	5.2%	0.5	358
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	2.8%	3.7%	0.8	214	3.7%	3.5%	1.1	269
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	9.1%	6.1%	1.5	77
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	1.7%	2.3%	0.7	58
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	47
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	7.7%	1.7%	4.4	13
<i>D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.</i>	*	...	27.5%	33.5%	*	74
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	1.4%	4.5%	0.3	74
D.3 Lungenkrebs								
<i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs</i>	*	*	*	405	*	*	*	495
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	4.5%	2.8%	1.6	201	5.1%	2.6%	2.0	178
<i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>	20.8%	13.6%	*	15	15.9%	9.1%	*	10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	13.3%	12.7%	1.0	15	30.0%	9.2%	3.2	10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	7.0%	2.3%	3.0	57	5.7%	2.5%	2.3	53

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	150	0.7%	0.5%	1.3	148
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	84.7%	92.0%	*	127	86.5%	93.1%	*	128
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.4%	0.2%	2.5	238	0.8%	0.2%	5.1	240
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	27.3%	14.7%	1.9	11
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	61	*	*	*	77
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	0.0%	0.2%	*	0	0.0%	0.3%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	...	*	*	*	142
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	12.6%	5.3%	2.4	159	17.0%	5.9%	2.9	165
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	0.0%	5.0%	0.0	31	10.5%	3.2%	3.3	19
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.8%	3.2%	1.5	21	0.0%	3.5%	0.0	12
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	14	0.0%	0.7%	0.0	22
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	4.2%	8.6%	0.5	24	19.2%	11.0%	1.8	26
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	50.0%	28.2%	1.8	20	50.0%	37.2%	1.3	18
<i>E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose</i>	*	*	*	45	*	*	*	62
<i>E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	122	*	*	*	100
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	13	*	*	*	11
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	16.7%	7.1%	2.4	12
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.5%	5.0%	2.1	19	22.2%	7.5%	3.0	18
F Operationen an Gefässen								
F.1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	50	0.0%	0.5%	0.0	89
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	18	0.0%	1.2%	0.0	14
<i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>	*	*	*	10	*	*	*	12
F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
<i>F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt</i>	*	*	*	45	*	*	*	55
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	9.5%	4.0%	2.4	21	7.7%	3.0%	2.5	26
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	9.1%	4.0%	2.3	11
<i>F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	66.7%	44.3%	1.5	21	50.0%	45.3%	1.1	24
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
<i>F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt</i>	*	*	*	71	*	*	*	99
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	*	*	*	<10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	4.2%	3.5%	1.2	24	0.0%	3.1%	0.0	38
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	2.9%	0.0	15
<i>F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP</i>	*	*	*	<10	*	*	*	16
<i>F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen</i>	*	*	*	31	*	*	*	11

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.9%	2.4%	1.2	70	1.4%	3.5%	0.4	74
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	11.8%	10.0%	1.2	17	17.2%	11.8%	1.5	29
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	1'855	*	*	*	2'077
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	4.7%	2.8%	*	62	5.8%	2.9%	*	87
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	27.8%	29.1%	*	365	32.5%	28.9%	*	490
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	29.2%	32.8%	*	541	27.3%	32.5%	*	567
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	...	*	*	*	37
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	...	*	*	*	12
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	...	*	*	*	13
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	...	*	*	*	157
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	...	*	*	*	2'045
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	137	0.0%	0.2%	0.0	118
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	61.3%	70.7%	*	84	65.3%	73.0%	*	77
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	206	*	*	*	358
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	252	*	*	*	280
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	139	*	*	*	166
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	68.3%	64.7%	*	95	69.3%	67.4%	*	115
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	1.4%	1.1%	1.3	72	1.5%	1.8%	0.9	65
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	69.4%	24.2%	*	50	50.8%	21.2%	*	33
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	13.3%	25.8%	*	10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	10.0%	0.6%	17.5	10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	165	*	*	*	283
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	73.9%	43.0%	*	122	57.2%	43.4%	*	162
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	121	*	*	*	120
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	161	*	*	*	156
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	100	*	*	*	92
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	...	0.0%	4.0%	*	0
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	0.0%	1.9%	0.0	13	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.4%	0.2%	1.8	254	0.0%	0.3%	0.0	170
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	310	*	*	*	313
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	52	0.0%	0.2%	0.0	59

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	157	0.8%	0.3%	2.8	130
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	2.5%	1.5%	1.6	40	0.0%	1.8%	0.0	37
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	118	0.0%	0.1%	0.0	75
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	12	4.5%	0.4%	10.9	22
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	859	*	*	*	875
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	264	0.0%	0.0%	0.0	266
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.9%	5.2%	0.7	129	2.9%	4.6%	0.6	138
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	14	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	0.0%	2.3%	0.0	21	0.0%	2.2%	0.0	29
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	3.8%	4.2%	0.9	26	2.7%	3.5%	0.8	37
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	2.6%	6.5%	0.4	38	8.1%	6.4%	1.3	37
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	12.0%	9.4%	1.3	25	0.0%	8.7%	0.0	22
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	4.9%	3.9%	1.2	143	4.9%	4.4%	1.1	142
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	32.4%	28.6%	1.1	148	34.9%	31.3%	1.1	212
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	10.2%	17.8%	0.6	361	12.7%	17.5%	0.7	479