

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	0.0%	11.3%	0.0	10	4.3%	5.4%	0.8	46
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	1.6%	0.0	14
① A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	*	*	*	<10	8.0%	5.0%	1.6	25
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	*	*	*	<10	78.3%	54.8%	*	36
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	*	*	*	<10	5.4%	8.2%	0.7	37
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	*	*	*	<10	0.0%	4.1%	*	0
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	3.6%	5.7%	0.6	28
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	5.6%	4.8%	1.2	18
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	5.5%	7.7%	0.7	55	10.0%	9.8%	1.0	90
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	5.9%	7.7%	0.8	34	7.5%	8.2%	0.9	53
② A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	8.3%	11.7%	0.7	12	14.3%	12.5%	1.1	35
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	292	*	*	*	416
③ A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	<10	5.6%	3.0%	1.9	36
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.4%	0.6%	0.6	284	0.3%	0.5%	0.6	371
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	12.0%	37.7%	*	34	45.6%	38.1%	*	169
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	48	*	*	*	50
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	<10	*	*	*	20
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP nur an Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	3.2%	13.6%	0.2	31	9.4%	14.8%	0.6	32
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	0.0%	12.5%	0.0	17	6.2%	11.0%	0.6	16
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	*	*	*	<10	16.7%	22.7%	0.7	12
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	7.9%	*	0	0.0%	10.4%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	8.0%	0.0	14
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	8.6%	0.0	13
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	7.6%	*	0	0.0%	9.5%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	54.8%	13.8%	*	17	34.4%	12.0%	*	11
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	5.9%	10.4%	0.6	17	9.1%	19.0%	0.5	11
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
④ B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	14	5.3%	0.3%	17.6	19
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.5%	*	0	0.0%	0.5%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
⑤ D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.3%	6.8%	0.9	79	8.9%	5.6%	1.6	112
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	0.7%	0.0	10
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.4%	0.0	18	0.0%	2.3%	0.0	19
⑥ D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	7.7%	6.7%	1.2	39	15.3%	5.5%	2.8	59
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	12.5%	13.5%	0.9	16	4.2%	10.4%	0.4	24
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.7%	5.5%	1.0	70	5.3%	4.7%	1.1	95
D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	6.2%	4.5%	1.4	48	2.1%	3.0%	0.7	48
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	6.2%	10.2%	0.6	16	0.0%	6.1%	0.0	12
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	45.8%	33.5%	*	22	47.9%	38.4%	*	23
④ D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	4.5%	5.2%	0.9	22	4.3%	2.9%	1.5	23
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	120	*	*	*	160
D.4 Operationen an der Lunge								
⑦ D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	13	4.8%	3.2%	1.5	21
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	2.4%	0.0	13

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.7%	0.2%	3.4	145	1.2%	0.2%	5.6	163
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	95.2%	93.1%	*	138	98.2%	93.6%	*	160
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.1%	2.4	337	0.3%	0.1%	2.9	369
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	34	*	*	*	30
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.3%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	2.3%	4.6%	0.5	131	2.3%	4.1%	0.6	129
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	15.8%	4.9%	3.2	19	0.0%	4.1%	0.0	31
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	0.0%	2.1%	0.0	33	4.0%	2.3%	1.7	25
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	37	0.0%	1.4%	0.0	24
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	*	*	*	<10	7.1%	2.1%	3.5	14
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	32	*	*	*	31
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	0	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	42	*	*	*	77
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	11	*	*	*	<10
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	0.0%	6.2%	0.0	10	6.7%	8.6%	0.8	15
F Operationen an Gefässen								
F.1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	24	0.0%	0.2%	0.0	12
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	17
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	4.6%	0.0	14
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	39	*	*	*	47
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	21	0.0%	0.4%	0.0	12
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	5.6%	0.0	18
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	<10	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
F Operationen an Gefäßen								
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.0%	3.1%	0.0	14	6.7%	3.3%	2.0	15
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	1'024	*	*	*	1'200
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	*	*	*	<10
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.1%	2.9%	*	12	4.2%	3.1%	*	29
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	21.7%	28.9%	*	126	21.2%	27.9%	*	148
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	43.3%	32.5%	*	443	41.9%	32.6%	*	503
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500-749 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750-999 g	*	*	*	0	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000-1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250-1499 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500-2499 g	*	*	*	56	*	*	*	72
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	1'007	*	*	*	1'144
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
⑦ G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	236	0.5%	0.0%	10.9	196
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	76.6%	73.0%	*	180	68.7%	71.8%	*	134
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	300	*	*	*	292
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	211	*	*	*	241
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	149	*	*	*	155
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	67.8%	67.4%	*	101	78.1%	69.2%	*	121
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	13	*	*	*	<10
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	0.0%	21.2%	*	0	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	16.9%	*	0	0.0%	20.5%	*	0
H.2 Nierensteine								
H.2.1.FHD Nierensteine	*	*	*	57	*	*	*	34
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	28.1%	43.4%	*	16	*	*	*	<10
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	74	*	*	*	55
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	56	*	*	*	66
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	45	*	*	*	42
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	0.0%	4.0%	*	0	*	*	*	<10
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
④ H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.6%	0.2%	2.6	168	0.5%	0.1%	3.9	202
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	212	*	*	*	239
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	36	0.0%	0.1%	0.0	42

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
⑦ I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	286	0.4%	0.1%	3.2	259
⑦ I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	39	3.1%	0.4%	8.7	32
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.6%	0.1%	5.6	323	0.3%	0.1%	3.1	326
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	45	0.0%	0.2%	0.0	38
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	775	*	*	*	948
⑦ I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	432	0.4%	0.1%	5.3	510
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.7%	4.3%	0.9	27	0.0%	4.2%	0.0	33
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	0.0%	4.3%	0.0	31	3.1%	5.0%	0.6	32
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
⑨ J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	*	*	*	<10	54.5%	38.8%	1.4	11
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	12.0%	18.3%	0.7	50	11.1%	18.0%	0.6	63

Erklärende Bemerkungen des Lindenhofspitals

- A.1.4.M
① 2 Patienten verstorben, bei 1 Patient Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige
- A.2.5.M
② 5 Patienten verstorben, bei 4 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige
- A.3.2.M
③ 2 Patienten verstorben, bei einem Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige
- B.2.1.M
D.2.6.M
H.4.1.M
④ 1 Patient verstorben, Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige
- D.1.1.M
⑤ 10 Patienten verstorben, bei 6 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige
- D.1.5.M
⑥ 9 Patienten verstorben, bei 5 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige
- D.4.1.M
E.2.1.M
G.3.1.M
I.1.1.M
I.1.2.M
I.2.2.M
⑦ Erfassungsfehler, kein Patient verstorben
- E.1.1.M
⑧ Erfassungsfehler, nur 1 und nicht 2 Patienten verstorben
- J.1.1.M
⑨ 6 Patienten verstorben, bei 4 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige