

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.9%	4.5%	1.1	223	4.9%	4.8%	1.0	246
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	12	0.0%	0.8%	0.0	14
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.0%	2.1%	1.4	100	2.1%	1.6%	1.3	96
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	6.8%	6.1%	1.1	103	5.8%	6.1%	0.9	121
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	*	*	*	<10	20.0%	18.3%	1.1	15
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	93.7%	52.2%	*	209	90.7%	54.8%	*	223
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	6.0%	7.1%	0.8	150	6.0%	7.8%	0.8	151
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.3%	2.4%	1.3	61	3.4%	2.7%	1.3	87
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.3%	5.1%	1.2	143	6.0%	5.1%	1.2	134
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.7%	2.8%	1.0	74	2.9%	3.8%	0.7	105
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	17.8%	7.8%	2.3	129	7.5%	8.5%	0.9	161
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	6.7%	2.2%	3.0	15	12.5%	2.8%	4.5	16
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	13.4%	7.0%	1.9	82	7.8%	7.8%	1.0	103
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	36.7%	12.5%	2.9	30	5.1%	12.8%	0.4	39
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik-/intervention insgesamt	*	*	*	834	*	*	*	817
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	1.9%	2.6%	0.7	209	2.7%	3.1%	0.9	223
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	13.8%	9.3%	1.5	29	21.4%	12.6%	1.7	28
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	1.0%	0.5%	2.0	596	0.2%	0.4%	0.4	565
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	33.4%	37.7%	*	199	33.8%	38.1%	*	191
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	<10
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	130	*	*	*	168
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	108	*	*	*	131
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	16	*	*	*	21
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	10.6%	12.3%	0.9	141	14.6%	11.7%	1.2	158
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	7.1%	0.0	25	3.2%	6.1%	0.5	31
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	12.5%	11.5%	1.1	88	12.9%	10.2%	1.3	93
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	17.4%	22.5%	0.8	23	32.3%	22.6%	1.4	31
<i>B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter &gt;19)</i>	<i>0.0%</i>	<i>7.9%</i>	<i>*</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>10.4%</i>	<i>*</i>	<i>0</i>
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	7.5%	8.0%	0.9	93	8.6%	8.0%	1.1	116
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.1%	7.6%	0.9	85	7.8%	8.5%	0.9	103
<i>B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter &gt;19) mit systemischer Thrombolyse</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>&lt;10</i>	<i>12.1%</i>	<i>9.5%</i>	<i>*</i>	<i>14</i>
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	9.1%	0.0	14
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	24.1%	30.8%	0.8	29	34.3%	26.9%	1.3	35
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	0.0%	12.9%	0.0	15	*	*	*	<10
<i>B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter &gt;19)</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>&lt;10</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>&lt;10</i>
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	37	0.0%	0.2%	0.0	38
<i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.5%</i>	<i>*</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.5%</i>	<i>*</i>	<i>0</i>
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>0</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>0</i>
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	5.7%	3.8%	1.5	298	3.9%	3.4%	1.1	311
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	133	0.0%	0.2%	0.0	131
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	13	0.0%	0.6%	0.0	12
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.4%	3.5%	0.7	41	0.0%	2.6%	0.0	34
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	15.5%	6.8%	2.3	84	7.2%	5.6%	1.3	97
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	11.1%	13.7%	0.8	27	13.5%	10.7%	1.3	37
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	102	0.0%	0.3%	0.0	96
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	9.7%	5.4%	1.8	145	5.8%	4.8%	1.2	155
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	4.1%	3.6%	1.1	73	5.6%	3.7%	1.5	54
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	10.7%	5.1%	2.1	28	12.5%	7.5%	1.7	16
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	0.0%	2.5%	0.0	15	0.0%	1.8%	0.0	13
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	13	*	*	*	<10
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>D.2.6.P Anteil COPD (Alter &gt;19) mit FEV1 n.n.bez.</i>	<i>13.7%</i>	<i>33.5%</i>	<i>*</i>	<i>10</i>	<i>35.2%</i>	<i>38.4%</i>	<i>*</i>	<i>19</i>
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	0.0%	6.8%	0.0	10	5.3%	4.7%	1.1	19
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
<i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>217</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>203</i>
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.9%	2.2%	0.8	53	3.3%	2.2%	1.5	61
<i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>&lt;10</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>&lt;10</i>
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	5.0%	2.4%	2.1	20	0.0%	2.0%	0.0	17

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	153	0.7%	0.3%	2.6	142
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	87.6%	93.1%	*	134	91.5%	93.6%	*	130
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	274	0.4%	0.1%	3.2	265
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	52	*	*	*	63
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle &gt;95 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.3%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	<10	*	*	*	43
<b>E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	7.5%	5.2%	1.4	133	6.3%	4.4%	1.4	126
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	3.1%	4.2%	0.7	32	6.7%	2.8%	2.4	30
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.0%	3.7%	1.1	25	0.0%	2.6%	0.0	23
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	22	0.0%	1.3%	0.0	13
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	12.5%	7.1%	1.8	16	10.0%	5.7%	1.8	10
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose</i>	*	*	*	32	*	*	*	44
<i>E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	49	*	*	*	50
<b>E.5 Operationen am Magen</b>								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	14	*	*	*	<10
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	8.3%	6.5%	1.3	12	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	16	10.0%	8.4%	1.2	10
<b>F Operationen an Gefässen</b>								
<b>F.1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	22	0.0%	0.6%	0.0	24
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
<i>F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt</i>	*	*	*	25	*	*	*	36
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	2.6%	0.0	10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	12	0.0%	0.6%	0.0	16
<i>F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)</i>	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
<i>F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt</i>	*	*	*	38	*	*	*	50
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	14.3%	1.5%	9.4	14	0.0%	0.5%	0.0	18
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	10	16.7%	8.0%	2.1	12
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>F Operationen an Gefässen</b>								
<b>F4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	12	10.5%	3.6%	2.9	19
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	<10	7.7%	14.4%	0.5	13
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	819	*	*	*	847
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	7.3%	2.9%	*	40	5.6%	3.1%	*	31
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	29.2%	28.9%	*	161	29.2%	27.9%	*	163
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	32.7%	32.5%	*	268	34.1%	32.6%	*	289
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	17	*	*	*	25
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	<10	*	*	*	12
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	<10	*	*	*	14
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	73	*	*	*	81
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	884	*	*	*	878
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	107	0.0%	0.1%	0.0	83
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	73.8%	73.0%	*	79	84.3%	71.8%	*	70
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	207	*	*	*	245
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	191	*	*	*	187
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	110	*	*	*	113
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	75.5%	67.4%	*	83	74.3%	69.2%	*	84
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	11	5.9%	1.9%	3.1	17
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	16.9%	*	0	0.0%	20.5%	*	0
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	302	*	*	*	279
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	68.2%	43.4%	*	206	61.3%	44.0%	*	171
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	119	*	*	*	135
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	114	*	*	*	135
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	88	*	*	*	107
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	*	*	<10	35.5%	6.6%	*	38
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	<10	10.0%	1.1%	9.2	10
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	142	1.2%	0.1%	8.4	165
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	230	*	*	*	261
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	132	0.0%	0.1%	0.0	114

# Kantonsspital Graubünden

Krankheitsgruppen	2009				2010			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	137	0.7%	0.1%	6.4	144
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	24	0.0%	0.9%	0.0	22
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	82	0.0%	0.1%	0.0	103
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.0%	*	11	*	*	*	<10
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	310	*	*	*	335
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	147	0.0%	0.1%	0.0	136
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	0.0%	4.4%	0.0	68	3.9%	3.8%	1.0	76
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	1.5%	0.0	13
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.5%	0.0	11	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	2.5%	0.0	12
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	*	*	*	<10	11.1%	3.4%	3.3	18
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	0.0%	6.1%	0.0	17	6.2%	5.3%	1.2	16
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	0.0%	9.0%	0.0	13	*	*	*	<10
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	1.2%	3.7%	0.3	80	3.3%	4.4%	0.8	60
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	33.3%	24.9%	1.3	54	27.7%	28.1%	1.0	83
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	18.5%	15.8%	1.2	65	10.5%	16.0%	0.7	105