

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.8%	6.1%	0.5	249	5.5%	5.2%	1.1	146
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	10	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	88	2.6%	1.8%	1.4	38
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	2.3%	7.0%	0.3	130	6.1%	5.7%	1.1	98
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	19.0%	19.3%	1.0	21	*	*	*	<10
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	91.2%	53.0%	*	227	94.5%	55.7%	*	138
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	3.0%	8.8%	0.3	237	5.8%	7.9%	0.7	139
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	6.0%	5.8%	*	15	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.0%	6.4%	0.3	147	4.8%	7.1%	0.7	63
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	3.5%	4.3%	0.8	86	5.1%	3.1%	1.6	78
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	15.8%	8.6%	1.8	183	11.8%	8.9%	1.3	68
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	6.7%	3.5%	1.9	15	*	*	*	<10
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	13.7%	7.4%	1.8	117	8.5%	7.9%	1.1	47
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	23.5%	12.8%	1.8	51	22.2%	12.7%	1.7	18
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	4'978	*	*	*	1'576
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	2.0%	3.6%	0.6	197	2.9%	3.5%	0.8	102
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	4.4%	9.2%	0.5	45	4.5%	11.4%	0.4	22
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.3%	0.5%	0.7	4'285	0.2%	0.5%	0.4	1'315
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	41.8%	38.0%	*	1'791	47.3%	38.7%	*	622
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	1'077	*	*	*	371
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	515	*	*	*	195
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	68	*	*	*	26
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	667	*	*	*	220
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	29	*	*	*	33
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	1'634	*	*	*	531
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	807	*	*	*	274
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	982	*	*	*	313
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	198	*	*	*	116
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	336	*	*	*	150
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	2.9%	3.0%	1.0	343	0.0%	2.8%	0.0	100
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	...	...	...	...	18.2%	7.6%	2.4	11
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	...	...	...	...	18.2%	7.6%	2.4	11
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	0.0%	3.6%	0.0	30	6.7%	6.8%	1.0	30
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.3%	1.6%	0.8	674	0.0%	1.4%	0.0	174
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	0.0%	0.0%	*	19	*	*	*	<10
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	1.3%	1.0%	1.3	76	0.0%	1.0%	0.0	28
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	1.7%	1.1%	1.6	289	0.0%	0.5%	0.0	62
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	0.4%	1.8%	0.2	244	0.0%	2.4%	0.0	68
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	4.3%	5.8%	0.8	46	0.0%	2.3%	0.0	11
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	4.8%	12.6%	0.4	145	11.9%	10.8%	1.1	67
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	6.3%	0.0	29	0.0%	5.6%	0.0	11
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	4.9%	11.6%	0.4	82	9.3%	9.9%	0.9	43
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	10.3%	23.3%	0.4	29	33.3%	19.5%	1.7	12
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	7.4%	8.3%	0.9	68	5.1%	6.8%	0.8	39
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.6%	8.2%	0.9	66	5.1%	6.8%	0.8	39
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	5.0%	28.1%	0.2	20	*	*	*	<10
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	34.5%	13.7%	*	50	25.4%	10.0%	*	17
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	2.0%	10.7%	0.2	50	17.6%	8.8%	2.0	17
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	58	0.0%	0.3%	0.0	40
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	*	*	*	<10
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.7%	6.5%	1.0	360	5.8%	6.4%	0.9	120
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	5.6%	0.7%	7.6	18	*	*	*	<10
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.4%	3.3%	0.7	82	0.0%	3.5%	0.0	24
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	6.5%	6.7%	1.0	199	6.2%	6.3%	1.0	64
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	13.6%	12.3%	1.1	59	8.7%	12.0%	0.7	23
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.2%	5.2%	1.2	307	5.5%	5.1%	1.1	109

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	9.2%	4.4%	2.1	119	8.2%	3.9%	2.1	61
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	*	*	*	<10	14.3%	8.1%	1.8	21
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	0.0%	2.5%	0.0	14	0.0%	3.1%	0.0	15
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	16.7%	1.3%	13.3	18	*	*	*	<10
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	31.1%	24.4%	*	37	29.5%	36.9%	*	18
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	10.8%	5.3%	2.0	37	5.6%	3.5%	1.6	18
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	315	*	*	*	128
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	5.5%	3.8%	1.5	127	7.1%	3.2%	2.2	56
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	6.9%	3.5%	2.0	72	11.1%	3.2%	3.5	27
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	...	...	*	...	0.0%	8.4%	*	0
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.4%	0.3%	1.4	459	0.0%	0.2%	0.0	161
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	96.9%	92.9%	*	445	95.7%	93.5%	*	154
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.7	1'071	0.0%	0.1%	0.0	445
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	7.1%	5.8%	1.2	14
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	66	*	*	*	34
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.1%	4.1%	1.0	631	3.8%	4.7%	0.8	237
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	3.7%	3.6%	1.0	134	0.0%	2.4%	0.0	38
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	9.1%	8.3%	1.1	11	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.6%	2.1%	2.2	65	0.0%	1.8%	0.0	53
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	1.1%	0.5%	2.2	186	0.0%	0.9%	0.0	69
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	3.3%	4.4%	0.7	61	13.6%	11.2%	1.2	22
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	170	*	*	*	48
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	167	*	*	*	92
<b>E.5 Operationen am Magen</b>								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	43	*	*	*	17
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	12.5%	4.5%	2.8	24	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	5.6%	6.1%	0.9	18	7.1%	5.7%	1.3	14
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	8.9%	6.8%	1.3	56	8.7%	7.8%	1.1	23

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>F Operationen an Gefässen</b>								
<b>F1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	94	0.0%	1.0%	0.0	35
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	31	*	*	*	16
<b>F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	136	*	*	*	54
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	4.3%	0.0	30	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	1.4%	1.7%	0.8	73	0.0%	1.5%	0.0	28
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	26	*	*	*	14
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>F3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	40	*	*	*	41
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	12	0.0%	7.1%	0.0	12
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	11	*	*	*	<10
<b>F4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	14	*	*	*	<10
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	166
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	<10
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	2'926	*	*	*	1'039
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dambris 3. und 4. Grades	2.0%	3.0%	*	27	5.7%	3.1%	*	25
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	36.7%	28.6%	*	488	46.2%	26.4%	*	202
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	54.6%	32.6%	*	1'598	57.9%	33.0%	*	602
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	123	*	*	*	63
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	2'831	*	*	*	995
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	493	0.5%	0.0%	11.0	184
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	62.4%	71.9%	*	294	78.0%	74.3%	*	142
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	1'245	*	*	*	383

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'144	*	*	*	393
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	894	*	*	*	289
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	80.8%	67.2%	*	722	84.8%	71.4%	*	245
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	2.9%	1.6%	1.8	34	0.0%	1.1%	0.0	19
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	50.0%	24.1%	*	34	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	34	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	29.4%	17.9%	*	10	*	*	*	<10
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	355	*	*	*	135
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	76.6%	43.5%	*	272	77.8%	42.9%	*	105
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	266	*	*	*	115
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	285	*	*	*	167
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	196	*	*	*	101
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	0.0%	3.7%	*	0	9.9%	10.4%	*	10
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	9.1%	4.4%	2.1	22	*	*	*	<10
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	440	0.8%	0.2%	4.8	127
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	660	*	*	*	240
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	372	0.0%	0.1%	0.0	126
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.2%	0.1%	1.2	614	0.0%	0.2%	0.0	189
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	90	0.0%	1.0%	0.0	22
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.2%	0.1%	1.9	602	0.0%	0.1%	0.0	220
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	71	0.0%	0.1%	0.0	10
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	1'242	*	*	*	476
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.3%	0.1%	5.0	368	0.0%	0.1%	0.0	81
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	2.1%	3.8%	0.6	95	4.9%	3.6%	1.4	41
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	12	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	6.9%	2.5%	2.7	29	0.0%	2.4%	0.0	12
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	22	*	*	*	<10
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	0.0%	6.1%	0.0	16	*	*	*	<10
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	4.8%	4.1%	1.2	62	6.9%	2.6%	2.7	29
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	50.0%	33.0%	1.5	10	31.0%	32.6%	1.0	58
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	6.1%	19.7%	0.3	66	22.4%	16.6%	1.4	58