

| Krankheitsgruppen | 2008–2010 | | | | 2011 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.1 Herzinfarkt | | | | | | | | |
| A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 6.0% | 6.5% | 0.9 | 1'828 | 4.5% | 6.1% | 0.7 | 686 |
| A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität | 4.3% | 1.0% | 4.5 | 93 | 5.1% | 1.2% | 4.3 | 39 |
| A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität | 2.0% | 2.1% | 1.0 | 694 | 1.6% | 1.7% | 0.9 | 248 |
| A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität | 5.3% | 7.0% | 0.8 | 832 | 4.0% | 6.3% | 0.6 | 299 |
| A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität | 22.5% | 21.3% | 1.1 | 209 | 13.0% | 18.7% | 0.7 | 100 |
| A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen | 86.1% | 53.0% | * | 1'573 | 82.9% | 55.7% | * | 569 |
| A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität | 9.8% | 9.9% | 1.0 | 858 | 8.9% | 8.5% | 1.0 | 327 |
| A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | 3.9% | 3.4% | 1.1 | 648 | 0.9% | 2.9% | 0.3 | 222 |
| A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19) | 2.8% | 5.8% | * | 51 | 2.0% | 3.6% | * | 14 |
| A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 6.4% | 6.6% | 1.0 | 996 | 6.1% | 6.6% | 0.9 | 293 |
| A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität | 4.3% | 4.7% | 0.9 | 773 | 1.6% | 4.4% | 0.4 | 376 |
| A.2 Herzinsuffizienz | | | | | | | | |
| A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität | 6.4% | 8.5% | 0.8 | 1'399 | 7.4% | 8.3% | 0.9 | 551 |
| A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität | 13.6% | 4.0% | 3.4 | 22 | * | * | * | <10 |
| A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität | 5.9% | 3.3% | 1.8 | 202 | 4.1% | 2.6% | 1.6 | 74 |
| A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität | 5.3% | 7.5% | 0.7 | 741 | 4.5% | 7.0% | 0.6 | 267 |
| A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität | 8.3% | 12.9% | 0.6 | 434 | 12.7% | 12.2% | 1.0 | 204 |
| A.3 Linksherzkatheter (LHK) | | | | | | | | |
| A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik/-intervention insgesamt | * | * | * | 4'690 | * | * | * | 1'562 |
| A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität | 2.8% | 3.3% | 0.8 | 1'483 | 1.5% | 3.1% | 0.5 | 538 |
| A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität | 12.0% | 9.0% | 1.3 | 342 | 12.9% | 10.5% | 1.2 | 139 |
| A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität | 0.8% | 0.5% | 1.5 | 2'403 | 0.5% | 0.5% | 1.1 | 734 |
| A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19) | 32.0% | 38.0% | * | 768 | 32.2% | 38.7% | * | 236 |
| A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 142 | * | * | * | 46 |
| A.4 Herzrhythmusstörungen | | | | | | | | |
| A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen | * | * | * | 1'530 | * | * | * | 587 |
| A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator | | | | | | | | |
| A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren) | * | * | * | 704 | * | * | * | 252 |
| A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators | * | * | * | 237 | * | * | * | 96 |
| A.6 Ablative Therapie | | | | | | | | |
| A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie | * | * | * | 568 | * | * | * | 237 |
| A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie | * | * | * | 97 | * | * | * | 57 |
| A.7 Operationen am Herzen | | | | | | | | |
| A.7.1.F OP am Herzen insgesamt | * | * | * | 1'655 | * | * | * | 570 |
| A.7.2.F OP an Herzklappen | * | * | * | 784 | * | * | * | 274 |
| A.7.3.F OP an Koronargefässen | * | * | * | 592 | * | * | * | 221 |
| A.7.4.F Andere OP am Herzen | * | * | * | 630 | * | * | * | 214 |
| A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen | * | * | * | 320 | * | * | * | 122 |
| A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 227 | * | * | * | 77 |
| A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität | 4.2% | 2.8% | 1.5 | 358 | 2.9% | 3.0% | 0.9 | 104 |
| A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 25.0% | 6.9% | 3.6 | 12 |
| A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | <10 |
| A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 20.0% | 12.1% | 1.7 | 10 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2010 | | | | 2011 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.7 Operationen am Herzen | | | | | | | | |
| A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 4.2% | 4.4% | 1.0 | 72 | 0.0% | 6.8% | 0.0 | 26 |
| A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 2.3% | 1.6% | 1.5 | 345 | 3.0% | 1.6% | 1.9 | 134 |
| A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität | 0.0% | 0.0% | * | 21 | 10.0% | 2.8% | 3.5 | 10 |
| A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität | 0.0% | 1.0% | 0.0 | 64 | 0.0% | 0.9% | 0.0 | 26 |
| A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität | 2.5% | 1.2% | 2.0 | 121 | 0.0% | 0.6% | 0.0 | 47 |
| A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität | 2.6% | 1.8% | 1.4 | 115 | 7.9% | 2.6% | 3.0 | 38 |
| A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität | 8.3% | 4.7% | 1.8 | 24 | 0.0% | 2.3% | 0.0 | 13 |
| A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19) | 9.6% | 2.6% | * | 33 | 8.2% | 3.0% | * | 11 |
| B Schlaganfall (Stroke) | | | | | | | | |
| B.1 Schlaganfall | | | | | | | | |
| B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität | 13.4% | 11.2% | 1.2 | 1'743 | 10.8% | 9.6% | 1.1 | 638 |
| B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität | 5.2% | 4.9% | 1.1 | 135 | 9.3% | 3.5% | 2.6 | 43 |
| B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität | 10.7% | 6.2% | 1.7 | 486 | 8.8% | 5.2% | 1.7 | 216 |
| B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität | 12.3% | 11.3% | 1.1 | 853 | 12.0% | 9.7% | 1.2 | 251 |
| B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität | 25.7% | 23.1% | 1.1 | 269 | 12.5% | 18.8% | 0.7 | 128 |
| B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19) | 25.0% | 6.3% | * | 435 | 44.2% | 10.9% | * | 282 |
| B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität | 8.3% | 7.6% | 1.1 | 1'294 | 5.9% | 6.3% | 0.9 | 473 |
| B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität | 8.5% | 7.9% | 1.1 | 1'095 | 6.5% | 6.6% | 1.0 | 382 |
| B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse | 11.7% | 8.4% | * | 152 | 18.6% | 10.8% | * | 88 |
| B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität | 11.8% | 10.7% | 1.1 | 152 | 6.8% | 8.5% | 0.8 | 88 |
| B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität | 30.8% | 26.6% | 1.2 | 289 | 24.3% | 22.8% | 1.1 | 103 |
| B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität | 24.2% | 12.8% | 1.9 | 153 | 27.6% | 15.7% | 1.8 | 58 |
| B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19) | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | | | | | | | |
| B.2.1.M TIA, Mortalität | 0.6% | 0.2% | 3.3 | 325 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 146 |
| B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| C Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| C.1 Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D Erkrankungen der Lunge | | | | | | | | |
| D.1 Lungenentzündung (Pneumonie) | | | | | | | | |
| D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität | 4.0% | 5.3% | 0.7 | 1'880 | 5.5% | 5.4% | 1.0 | 685 |
| D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität | 0.9% | 0.2% | 3.5 | 352 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 123 |
| D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität | 0.6% | 0.8% | 0.8 | 161 | 0.0% | 0.5% | 0.0 | 55 |
| D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität | 2.7% | 3.3% | 0.8 | 294 | 2.2% | 2.9% | 0.8 | 89 |
| D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität | 4.4% | 6.7% | 0.7 | 733 | 6.8% | 6.2% | 1.1 | 280 |
| D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität | 9.1% | 11.7% | 0.8 | 340 | 12.3% | 11.7% | 1.0 | 138 |
| D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 0.7% | 0.3% | 2.8 | 280 | 0.0% | 0.4% | 0.0 | 103 |
| D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 3.6% | 5.3% | 0.7 | 1'236 | 5.4% | 5.3% | 1.0 | 425 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2010 | | | | 2011 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| D Erkrankungen der Lunge | | | | | | | | |
| D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | | | | | | | | |
| D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität | 2.7% | 3.4% | 0.8 | 513 | 2.1% | 3.6% | 0.6 | 189 |
| D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität | 3.3% | 4.1% | 0.8 | 60 | 0.0% | 4.0% | 0.0 | 48 |
| D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität | 0.0% | 2.2% | 0.0 | 50 | 2.5% | 2.4% | 1.0 | 40 |
| D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität | 0.0% | 1.1% | 0.0 | 40 | 3.7% | 1.5% | 2.5 | 27 |
| D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität | 0.0% | 2.3% | 0.0 | 17 | * | * | * | <10 |
| D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez. | 32.6% | 24.4% | * | 167 | 36.0% | 36.9% | * | 68 |
| D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität | 2.4% | 4.4% | 0.5 | 167 | 2.9% | 3.6% | 0.8 | 68 |
| D.3 Lungenkrebs | | | | | | | | |
| D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs | * | * | * | 1'653 | * | * | * | 722 |
| D.4 Operationen an der Lunge | | | | | | | | |
| D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität | 2.8% | 2.6% | 1.1 | 578 | 3.3% | 2.3% | 1.4 | 211 |
| D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom | 8.6% | 11.2% | * | 25 | 15.3% | 9.9% | * | 17 |
| D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität | 4.0% | 4.8% | 0.8 | 25 | 0.0% | 7.0% | 0.0 | 17 |
| D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität | 3.0% | 2.6% | 1.2 | 266 | 1.1% | 2.1% | 0.5 | 94 |
| D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom | ... | ... | * | ... | * | * | * | <10 |
| E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie) | | | | | | | | |
| E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) | | | | | | | | |
| E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität | 0.1% | 0.3% | 0.5 | 681 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 192 |
| E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor | 96.5% | 92.9% | * | 657 | 97.9% | 93.5% | * | 188 |
| E.2 Hernienoperationen | | | | | | | | |
| E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität | 0.5% | 0.2% | 2.2 | 659 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 194 |
| E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität | 0.0% | 9.2% | 0.0 | 30 | 6.7% | 10.6% | 0.6 | 15 |
| E.3 Eingriffe an der Schilddrüse | | | | | | | | |
| E.3.1.F Resektion der Schilddrüse | * | * | * | 253 | * | * | * | 66 |
| E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| E.3.3.F Radiojodtherapie | * | * | * | 129 | * | * | * | 60 |
| E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen) | | | | | | | | |
| E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität | 6.3% | 4.8% | 1.3 | 711 | 7.5% | 5.6% | 1.3 | 214 |
| E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität | 6.4% | 4.0% | 1.6 | 141 | 0.0% | 3.7% | 0.0 | 51 |
| E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität | 7.1% | 15.2% | 0.5 | 28 | * | * | * | <10 |
| E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität | 1.1% | 2.5% | 0.4 | 94 | 0.0% | 2.0% | 0.0 | 45 |
| E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität | 0.0% | 0.5% | 0.0 | 62 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 11 |
| E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität | 1.6% | 7.1% | 0.2 | 61 | 19.0% | 10.1% | 1.9 | 21 |
| E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität | 32.1% | 34.1% | 0.9 | 53 | 50.0% | 43.4% | 1.2 | 14 |
| E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose | * | * | * | 272 | * | * | * | 66 |
| E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom | * | * | * | 34 | * | * | * | 14 |
| E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom | * | * | * | 445 | * | * | * | 145 |
| E.5 Operationen am Magen | | | | | | | | |
| E.5.1.F Magenresektionen insgesamt | * | * | * | 81 | * | * | * | 32 |
| E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität | 0.0% | 4.5% | 0.0 | 28 | * | * | * | <10 |
| E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität | 0.0% | 3.8% | 0.0 | 20 | 6.2% | 4.2% | 1.5 | 16 |
| E.6 Operationen am Ösophagus | | | | | | | | |
| E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität | 3.4% | 5.4% | 0.6 | 89 | 3.1% | 5.1% | 0.6 | 32 |
| E.7 Operationen am Pankreas | | | | | | | | |
| E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität | 6.5% | 6.8% | 1.0 | 138 | 3.7% | 6.2% | 0.6 | 54 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2010 | | | | 2011 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| F Operationen an Gefässen | | | | | | | | |
| F1 Extrakranielle Gefässoperationen | | | | | | | | |
| F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität | 0.0% | 0.4% | 0.0 | 252 | 0.0% | 0.6% | 0.0 | 52 |
| F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität | 7.1% | 3.1% | 2.3 | 14 | * | * | * | <10 |
| F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma) | | | | | | | | |
| F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt | * | * | * | 247 | * | * | * | 126 |
| F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität | 5.5% | 3.8% | 1.4 | 73 | 6.2% | 4.5% | 1.4 | 16 |
| F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität | 3.2% | 1.7% | 1.8 | 95 | 2.9% | 1.7% | 1.7 | 35 |
| F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe) | * | * | * | 35 | * | * | * | 65 |
| F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität | 35.6% | 37.9% | 0.9 | 45 | 33.3% | 38.5% | 0.9 | 24 |
| F3 Operationen an Becken-/Beinarterien | | | | | | | | |
| F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt | * | * | * | 335 | * | * | * | 226 |
| F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität | 0.0% | 0.9% | 0.0 | 50 | 1.3% | 0.3% | 3.8 | 75 |
| F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität | * | * | * | <10 | 0.0% | 0.0% | * | 11 |
| F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität | 10.0% | 5.6% | 1.8 | 10 | 8.3% | 3.9% | 2.1 | 24 |
| F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität | 5.3% | 4.5% | 1.2 | 94 | 2.0% | 6.1% | 0.3 | 51 |
| F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität | 6.2% | 5.9% | 1.1 | 32 | 0.0% | 1.6% | 0.0 | 10 |
| F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität | 5.4% | 2.3% | 2.3 | 37 | 7.7% | 0.9% | 8.7 | 13 |
| F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP | * | * | * | 22 | * | * | * | <10 |
| F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen | * | * | * | 84 | * | * | * | 34 |
| F4 Amputationen | | | | | | | | |
| F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität | 2.4% | 2.3% | 1.1 | 250 | 2.7% | 2.3% | 1.2 | 75 |
| F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität | 5.8% | 11.2% | 0.5 | 103 | 16.7% | 12.5% | 1.3 | 30 |
| F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA) | | | | | | | | |
| F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) | * | * | * | ... | * | * | * | 303 |
| F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien | * | * | * | ... | * | * | * | 58 |
| F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP | * | * | * | ... | * | * | * | 13 |
| G Geburtshilfe und Frauenheilkunde | | | | | | | | |
| G.1 Geburten | | | | | | | | |
| G.1.1.F Stationäre Geburten | * | * | * | 7'449 | * | * | * | 2'539 |
| G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten | 0.0% | 0.0% | * | 0 | 0.0% | 0.0% | * | 0 |
| G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades | 2.3% | 3.0% | * | 117 | 2.6% | 3.1% | * | 44 |
| G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie | 35.1% | 28.6% | * | 1'781 | 25.5% | 26.4% | * | 430 |
| G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio) | 31.8% | 32.6% | * | 2'371 | 33.7% | 33.0% | * | 855 |
| G.2 Neugeborene | | | | | | | | |
| G.2.1.F Neugeborene <1250 g | * | * | * | 264 | * | * | * | 102 |
| G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen | * | * | * | 13 | * | * | * | <10 |
| G.2.3.F Neugeborene <500 g | * | * | * | 30 | * | * | * | 11 |
| G.2.4.F Neugeborene 500–749 g | * | * | * | 73 | * | * | * | 29 |
| G.2.5.F Neugeborene 750–999 g | * | * | * | 69 | * | * | * | 32 |
| G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g | * | * | * | 92 | * | * | * | 30 |
| G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g | * | * | * | 107 | * | * | * | 44 |
| G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g | * | * | * | 1'011 | * | * | * | 371 |
| G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe | * | * | * | 7'434 | * | * | * | 2'497 |
| G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie) | | | | | | | | |
| G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität | 0.2% | 0.0% | 5.1 | 471 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 163 |
| G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik | 70.4% | 71.9% | * | 314 | 70.0% | 74.3% | * | 112 |
| G.4 Brustkrebs | | | | | | | | |
| G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs | * | * | * | 1'256 | * | * | * | 527 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2010 | | | | 2011 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|------|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| G Geburtshilfe und Frauenheilkunde | | | | | | | | |
| G.5 Eingriffe an der Brust | | | | | | | | |
| G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken) | * | * | * | 1'246 | * | * | * | 480 |
| G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs | * | * | * | 635 | * | * | * | 220 |
| G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs | 60.0% | 67.2% | * | 381 | 60.0% | 71.4% | * | 132 |
| H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie) | | | | | | | | |
| H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität | 0.9% | 1.5% | 0.6 | 223 | 0.0% | 0.6% | 0.0 | 84 |
| H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie | 39.0% | 22.6% | * | 87 | 25.0% | 24.8% | * | 21 |
| H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie | 12.9% | 24.1% | * | 33 | * | * | * | <10 |
| H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität | 0.0% | 0.5% | 0.0 | 33 | * | * | * | <10 |
| H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie | * | * | * | <10 | 0.0% | 27.2% | * | 0 |
| H.2 Nierensteine | | | | | | | | |
| H.2.1.F HD Nierensteine | * | * | * | 655 | * | * | * | 247 |
| H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine | 33.0% | 43.5% | * | 216 | 23.1% | 42.9% | * | 57 |
| H.3 Eingriffe an der Harnblase | | | | | | | | |
| H.3.1.F HD Malignom der Blase | * | * | * | 574 | * | * | * | 192 |
| H.3.2.F TUR der Blase insgesamt | * | * | * | 579 | * | * | * | 191 |
| H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom | * | * | * | 428 | * | * | * | 143 |
| H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase | 0.0% | 3.7% | * | 0 | * | * | * | <10 |
| H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität | 3.7% | 3.1% | 1.2 | 54 | 0.0% | 4.0% | 0.0 | 13 |
| H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR) | | | | | | | | |
| H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität | 0.3% | 0.2% | 1.2 | 337 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 129 |
| H.5 Prostatakarzinom | | | | | | | | |
| H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND) | * | * | * | 826 | * | * | * | 284 |
| H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 144 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 44 |
| I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder | | | | | | | | |
| I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP) | | | | | | | | |
| I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 795 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 265 |
| I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität | 1.1% | 0.8% | 1.5 | 174 | 3.7% | 1.1% | 3.4 | 81 |
| I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 667 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 238 |
| I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 92 | 2.2% | 0.2% | 10.4 | 46 |
| I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| I.2 Operationen an der Wirbelsäule | | | | | | | | |
| I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt | * | * | * | 1'718 | * | * | * | 608 |
| I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 642 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 214 |
| I.3 Hüftgelenknahe Frakturen | | | | | | | | |
| I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität | 2.3% | 4.4% | 0.5 | 523 | 3.9% | 3.2% | 1.2 | 207 |
| I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität | 0.0% | 0.5% | 0.0 | 43 | 0.0% | 0.0% | * | 19 |
| I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität | 2.4% | 1.9% | 1.3 | 41 | 0.0% | 0.7% | 0.0 | 25 |
| I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität | 0.0% | 2.2% | 0.0 | 100 | 2.7% | 1.7% | 1.6 | 37 |
| I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität | 2.4% | 3.6% | 0.7 | 125 | 5.1% | 2.8% | 1.8 | 39 |
| I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität | 3.4% | 5.9% | 0.6 | 116 | 5.7% | 5.0% | 1.1 | 53 |
| I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität | 4.1% | 8.8% | 0.5 | 98 | 5.9% | 6.3% | 0.9 | 34 |
| I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität | 3.3% | 4.0% | 0.8 | 541 | 2.0% | 3.4% | 0.6 | 202 |
| J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review) | | | | | | | | |
| J.1 Beatmung | | | | | | | | |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität | 23.2% | 25.9% | 0.9 | 1'032 | 24.2% | 25.6% | 0.9 | 384 |
| J.2 Sepsis | | | | | | | | |
| J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität | 19.2% | 17.6% | 1.1 | 724 | 20.1% | 14.7% | 1.4 | 288 |