

Erklärende Bemerkungen des Spitals Limmattal

A.1.1.M

- ① Analyse der 11 Todesfälle im Jahr 2011 infolge Herzinfarkt:
7 Fälle wurden von Anfang an palliativ behandelt; 2 Fälle wurden unter Reanimationsbedingungen eingewiesen; in einem Fall wünschte der Patient keine Behandlung; im letzten Fall konnte wegen sehr schlechtem Gefässstatus keine Bypass-Operation durchgeführt werden und Patient verstarb nach Rückverlegung.

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	10.9%	6.7%	1.6	331	10.3%	6.2%	1.6	107
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	18	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.6%	2.0%	0.8	127	0.0%	1.5%	0.0	30
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	13.9%	7.4%	1.9	144	12.2%	6.1%	2.0	49
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	33.3%	20.7%	1.6	42	21.1%	16.5%	1.3	19
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	27.5%	53.0%	*	91	31.8%	55.7%	*	34
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	14.9%	10.7%	1.4	242	12.6%	10.1%	1.2	87
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	42	*	*	*	<10
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	4.0%	5.8%	*	13	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	12.1%	7.3%	1.7	182	18.6%	8.2%	2.3	43
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	6.0%	4.5%	1.3	133	1.8%	4.0%	0.4	56
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	7.4%	8.8%	0.8	418	6.6%	8.6%	0.8	121
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.4%	0.0	28	9.1%	2.5%	3.6	11
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.8%	7.6%	0.9	250	6.1%	7.5%	0.8	66
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	10.3%	12.2%	0.8	136	6.8%	11.8%	0.6	44
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronaragnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	183	*	*	*	58
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	5.5%	2.9%	1.9	91	0.0%	2.9%	0.0	34
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	82	0.0%	0.4%	0.0	23
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	14.6%	38.0%	*	12	*	*	*	<10
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	282	*	*	*	91
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	61	*	*	*	28
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	11.1%	12.6%	0.9	324	5.9%	10.0%	0.6	85
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	15	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	1.9%	6.1%	0.3	54	0.0%	5.3%	0.0	17
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	12.7%	11.4%	1.1	189	8.0%	9.7%	0.8	50
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	16.7%	23.4%	0.7	66	7.1%	18.3%	0.4	14
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	10.0%	8.8%	1.1	239	3.2%	6.8%	0.5	63
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	9.8%	8.9%	1.1	215	1.8%	6.8%	0.3	57
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	8.4%	*	0	0.0%	10.8%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	25.7%	27.2%	0.9	35	14.3%	21.5%	0.7	14
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	4.8%	15.1%	0.3	21	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	9.0%	13.7%	*	29	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	6.9%	12.9%	0.5	29	*	*	*	<10
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	105	0.0%	0.4%	0.0	31
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	8.3%	6.3%	1.3	470	3.0%	6.1%	0.5	168
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	46	0.0%	0.6%	0.0	11
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	1.0%	3.2%	0.3	100	0.0%	3.3%	0.0	33
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	11.2%	6.7%	1.7	224	5.6%	6.1%	0.9	90
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	14.1%	11.9%	1.2	92	0.0%	11.6%	0.0	31
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.2%	5.1%	1.2	388	2.1%	5.0%	0.4	143

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	2.5%	3.8%	0.7	237	0.0%	3.7%	0.0	80
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	0.0%	7.5%	0.0	14	0.0%	8.1%	0.0	14
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	0.0%	2.6%	0.0	18	0.0%	3.2%	0.0	14
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	19	0.0%	1.1%	0.0	19
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	47.7%	24.4%	*	113	40.0%	36.9%	*	32
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	2.7%	4.3%	0.6	113	0.0%	3.4%	0.0	32
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	328	*	*	*	109
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	7.8%	3.0%	2.6	77	*	*	*	<10
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	0.0%	9.9%	*	0
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	4.2%	2.8%	1.5	24	*	*	*	<10
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	...	0.0%	8.4%	*	0
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.2%	0.2%	0.9	474	0.6%	0.2%	3.3	173
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	99.6%	92.9%	*	472	98.3%	93.5%	*	170
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.1%	2.4	747	0.4%	0.1%	3.3	243
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	6.2%	6.0%	1.0	16	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	46	*	*	*	16
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	7.8%	4.6%	1.7	383	3.8%	4.6%	0.8	105
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	4.6%	3.9%	1.2	87	5.3%	3.0%	1.8	19
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	18.8%	10.2%	1.8	16	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	6.1%	2.4%	2.5	33	0.0%	2.4%	0.0	16
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.9%	0.8%	1.1	113	0.0%	1.2%	0.0	36
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	20.6%	7.8%	2.6	34	*	*	*	<10
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	93	*	*	*	24
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	118	*	*	*	40
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	88	*	*	*	57
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	8.3%	4.0%	2.1	12	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	7.1%	6.5%	1.1	28	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	33	*	*	*	<10
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	<10	*	*	*	0
F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	34	*	*	*	15
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	3.1%	0.0	10	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	20	0.0%	0.2%	0.0	11
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	59	*	*	*	34
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	4.5%	6.2%	0.7	22	*	*	*	<10
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	12	*	*	*	<10
F4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	4.7%	3.1%	1.5	64	5.9%	3.4%	1.7	17
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	40.0%	16.2%	2.5	10	*	*	*	<10
F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	54
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	11
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	2'243	*	*	*	946
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dambris 3. und 4. Grades	3.5%	3.0%	*	57	5.2%	3.1%	*	35
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	18.0%	28.6%	*	298	14.6%	26.4%	*	99
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	26.4%	32.6%	*	592	28.3%	33.0%	*	268
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	0	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	71	*	*	*	32
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	2'178	*	*	*	917
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.3%	0.0%	5.3	390	0.0%	0.0%	0.0	92
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	98.3%	71.9%	*	356	96.7%	74.3%	*	88
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	258	*	*	*	94

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	230	*	*	*	74
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	117	*	*	*	41
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	81.2%	67.2%	*	95	70.7%	71.4%	*	29
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	33	*	*	*	<10
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	45.5%	22.6%	*	15	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	26.7%	24.1%	*	12	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	12	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	17.9%	*	0	0.0%	27.2%	*	0
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	461	*	*	*	164
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	58.1%	43.5%	*	268	61.6%	42.9%	*	101
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	307	*	*	*	104
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	305	*	*	*	100
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	257	*	*	*	87
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	6.2%	3.7%	*	16	31.0%	10.4%	*	27
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	21	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.3%	0.2%	1.3	382	0.0%	0.2%	0.0	140
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	378	*	*	*	159
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	77	0.0%	0.0%	0.0	18
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	342	0.0%	0.2%	0.0	109
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	53	0.0%	1.6%	0.0	20
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	293	0.0%	0.1%	0.0	101
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	18	0.0%	0.2%	0.0	10
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	6.3%	4.1%	1.6	143	0.0%	2.6%	0.0	46
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	11	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	9.1%	1.6%	5.7	22	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	6.5%	2.1%	3.0	31	*	*	*	<10
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	2.7%	4.0%	0.7	37	0.0%	3.2%	0.0	15
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	10.0%	6.2%	1.6	20	0.0%	4.7%	0.0	12
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	9.1%	8.9%	1.0	22	*	*	*	<10
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.0%	3.7%	1.4	120	5.9%	3.6%	1.6	34
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	42.1%	31.3%	1.3	76	29.0%	33.6%	0.9	31
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	18.7%	18.2%	1.0	219	9.7%	14.8%	0.7	145