

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.2%	6.5%	0.8	612	5.0%	6.3%	0.8	160
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	32	0.0%	1.2%	0.0	13
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	0.4%	2.1%	0.2	229	0.0%	1.9%	0.0	49
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	3.6%	6.9%	0.5	279	5.4%	6.2%	0.9	74
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	29.2%	21.6%	1.3	72	16.7%	18.5%	0.9	24
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	15.5%	53.0%	*	95	56.2%	55.7%	*	90
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	8.1%	11.1%	0.7	370	5.9%	10.2%	0.6	118
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.8%	2.8%	0.6	112	5.6%	2.8%	2.0	18
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.8%	5.8%	*	11	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.0%	6.9%	0.6	303	3.9%	6.4%	0.6	76
A.1.11.M Nichtransmuraler Infarkt/STEMI (Alter >19), Mortalität	5.1%	4.6%	1.1	295	2.5%	4.8%	0.5	81
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	11.8%	9.1%	1.3	603	6.2%	8.4%	0.7	209
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	2.6%	3.1%	0.8	39	4.5%	2.4%	1.9	22
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	11.5%	7.7%	1.5	356	6.0%	7.5%	0.8	116
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	14.1%	12.7%	1.1	205	7.2%	12.1%	0.6	69
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	649	*	*	*	587
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	3.2%	3.5%	0.9	95	2.2%	3.4%	0.7	90
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	5.3%	9.3%	0.6	38	5.3%	9.0%	0.6	19
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.5%	1.3	516	0.2%	0.5%	0.4	477
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	30.8%	38.0%	*	159	39.8%	38.7%	*	190
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	340	*	*	*	100
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	134	*	*	*	38
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	13.9%	13.3%	1.0	389	10.1%	10.2%	1.0	138
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	1.3%	6.3%	0.2	77	3.2%	5.1%	0.6	31
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	13.7%	11.8%	1.2	212	11.8%	9.6%	1.2	76
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	25.8%	23.1%	1.1	93	14.8%	18.6%	0.8	27
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	0.0%	10.9%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	11.6%	8.7%	1.3	189	5.8%	6.5%	0.9	86
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	11.8%	8.6%	1.4	178	4.8%	6.4%	0.7	84
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	8.4%	*	0	0.0%	10.8%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	32.7%	32.1%	1.0	52	28.6%	31.6%	0.9	14
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	15.4%	13.3%	1.2	13	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	34.7%	13.7%	*	135	21.0%	10.0%	*	29
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	9.6%	11.7%	0.8	135	13.8%	7.2%	1.9	29
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	160	0.0%	0.2%	0.0	40
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	9.5%	6.4%	1.5	536	5.4%	5.9%	0.9	202
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	52	0.0%	0.4%	0.0	20
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	5.8%	3.4%	1.7	104	0.0%	2.9%	0.0	44
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	10.0%	6.6%	1.5	270	4.2%	6.3%	0.7	95
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	17.5%	12.0%	1.5	103	16.7%	11.1%	1.5	42
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	7.8%	5.1%	1.5	435	4.1%	4.6%	0.9	169

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	6.0%	4.0%	1.5	317	6.5%	3.3%	2.0	77
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	7.7%	7.2%	1.1	26	*	*	*	<10
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	5.9%	2.0%	2.9	17	0.0%	1.9%	0.0	13
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	13	0.0%	1.6%	0.0	13
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	40.7%	24.4%	*	129	53.2%	36.9%	*	41
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	7.0%	4.5%	1.6	129	7.3%	3.2%	2.3	41
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	562	*	*	*	184
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.5%	3.0%	0.8	81	0.0%	3.0%	0.0	40
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	0.0%	9.9%	*	0
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	4.3%	2.5%	1.7	47	*	*	*	<10
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	...	0.0%	8.4%	*	0
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.2%	0.3%	0.6	576	0.0%	0.2%	0.0	211
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	93.8%	92.9%	*	540	93.8%	93.5%	*	198
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.8	995	0.0%	0.1%	0.0	349
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	3.8%	6.9%	0.6	26	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	193	*	*	*	70
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	*	*	*	<10
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	3.5%	4.9%	0.7	597	4.3%	4.8%	0.9	209
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	2.5%	3.9%	0.6	80	0.0%	2.4%	0.0	32
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	9.1%	14.6%	0.6	11	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.6%	2.8%	0.6	63	0.0%	1.9%	0.0	25
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	1.9%	0.9%	2.2	156	0.0%	0.6%	0.0	42
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	5.0%	9.4%	0.5	60	5.6%	6.0%	0.9	18
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	23.1%	36.3%	0.6	13	*	*	*	<10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	215	*	*	*	80
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	211	*	*	*	97
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	82	*	*	*	41
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	7.1%	0.0	17	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	6.7%	7.1%	0.9	15	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	5.3%	7.6%	0.7	19	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	7.8%	7.2%	1.1	51	13.3%	4.7%	2.9	15

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
F Operationen an Gefäßen								
F.1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	51	*	*	*	<10
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	3.7%	5.0%	0.7	27	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	50.0%	46.9%	1.1	18	*	*	*	<10
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	96	*	*	*	47
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	13	*	*	*	<10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	5.6%	6.6%	0.8	36	5.6%	6.3%	0.9	18
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	15	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	16	*	*	*	<10
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	64	7.1%	3.7%	1.9	28
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	6.5%	11.0%	0.6	31	10.0%	13.0%	0.8	10
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	104
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	12
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	1'566	*	*	*	582
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	5.9%	3.0%	*	65	6.1%	3.1%	*	25
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	37.5%	28.6%	*	415	33.0%	26.4%	*	136
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	29.2%	32.6%	*	458	29.2%	33.0%	*	170
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	67	*	*	*	21
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	1'565	*	*	*	591
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	197	0.0%	0.0%	0.0	79
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	61.2%	71.9%	*	120	59.0%	74.3%	*	46
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	381	*	*	*	182

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	212	*	*	*	80
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	135	*	*	*	57
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	54.1%	67.2%	*	73	52.6%	71.4%	*	30
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	1.2%	1.8%	0.7	80	0.0%	1.0%	0.0	19
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	*	*	*	<10	0.0%	24.8%	*	0
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	23.8%	24.1%	*	25	42.4%	25.6%	*	14
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	25	0.0%	0.6%	0.0	14
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'112	*	*	*	435
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	67.8%	43.5%	*	754	67.8%	42.9%	*	295
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	479	*	*	*	172
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	494	*	*	*	159
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	372	*	*	*	133
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	7.8%	3.7%	*	29	11.3%	10.4%	*	15
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	0.0%	2.6%	0.0	28	0.0%	2.8%	0.0	14
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.2%	0.3%	0.7	580	0.5%	0.2%	2.7	197
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	863	*	*	*	348
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	133	0.0%	0.1%	0.0	57
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.2%	0.2%	1.0	477	0.0%	0.2%	0.0	166
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	46	0.0%	1.4%	0.0	37
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.2%	0.1%	1.8	472	0.8%	0.1%	10.1	119
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	2.4%	0.3%	9.4	42	0.0%	0.2%	0.0	20
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	6.1%	4.1%	1.5	180	7.9%	3.3%	2.4	63
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	16	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	15	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	4.2%	2.5%	1.7	48	0.0%	1.6%	0.0	19
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	2.3%	3.9%	0.6	44	9.1%	2.9%	3.1	11
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	13.5%	6.1%	2.2	37	*	*	*	<10
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	15.0%	9.3%	1.6	20	21.4%	7.9%	2.7	14
I.3.8.M Pertochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	4.8%	4.3%	1.1	165	6.2%	3.2%	1.9	65
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	35.7%	32.0%	1.1	98	25.8%	34.6%	0.7	31
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	15.2%	17.9%	0.8	461	11.5%	14.6%	0.8	156