

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	7.9%	5.8%	1.4	1'485	4.4%	4.9%	0.9	620
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	80	0.0%	1.2%	0.0	31
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	2.7%	2.1%	1.3	600	2.0%	1.8%	1.1	249
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	10.3%	6.9%	1.5	679	5.1%	5.8%	0.9	294
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	24.6%	20.5%	1.2	126	15.2%	18.8%	0.8	46
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	86.7%	53.0%	*	1'287	88.5%	55.7%	*	549
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	11.6%	9.4%	1.2	917	6.6%	7.8%	0.8	408
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	5.3%	2.7%	2.0	209	*	*	*	<10
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	3.8%	5.8%	*	56	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	7.1%	5.7%	1.2	736	5.7%	5.9%	1.0	281
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	6.8%	4.0%	1.7	679	3.0%	3.1%	1.0	332
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	13.1%	8.8%	1.5	657	9.7%	8.2%	1.2	258
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.6%	3.3%	1.4	65	3.6%	2.6%	1.4	28
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	12.7%	7.7%	1.6	387	10.9%	7.1%	1.5	147
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	16.7%	12.7%	1.3	203	9.8%	12.0%	0.8	82
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	3'658	*	*	*	1'471
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	5.0%	3.1%	1.6	1'287	3.1%	3.0%	1.0	549
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	5.7%	9.1%	0.6	141	7.5%	10.6%	0.7	67
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.2%	0.4%	0.5	2'189	0.5%	0.4%	1.1	841
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	36.1%	38.0%	*	790	37.7%	38.7%	*	317
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	575	*	*	*	240
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	454	*	*	*	202
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	81	*	*	*	47
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	16	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	96	*	*	*	27
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	95	*	*	*	26
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	11.4%	11.1%	1.0	1'766	12.4%	9.4%	1.3	580
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	6.4%	4.1%	1.5	110	12.9%	4.6%	2.8	31
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	9.5%	6.3%	1.5	476	6.6%	5.0%	1.3	166
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	10.9%	11.4%	1.0	948	11.8%	9.6%	1.2	289
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	20.3%	22.9%	0.9	232	24.5%	18.3%	1.3	94
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	7.3%	6.3%	*	129	42.4%	10.9%	*	246
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	6.8%	7.6%	0.9	1'225	6.8%	6.0%	1.1	414
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	6.9%	7.6%	0.9	1'114	6.8%	6.1%	1.1	413
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	26.0%	8.4%	*	319	30.2%	10.8%	*	125
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	12.5%	11.9%	1.1	319	12.0%	9.8%	1.2	125
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	23.6%	26.2%	0.9	364	30.9%	25.1%	1.2	110
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	18.7%	13.4%	1.4	171	18.5%	14.6%	1.3	54
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	371	1.0%	0.3%	3.2	104
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	*	*	*	<10
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.9%	4.3%	1.6	960	3.9%	3.9%	1.0	334
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	261	1.1%	0.3%	3.3	95
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	2.9%	0.8%	3.5	70	0.0%	0.4%	0.0	27
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	6.2%	3.3%	1.9	192	1.4%	3.0%	0.5	72
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	9.6%	6.6%	1.5	333	5.8%	6.0%	1.0	103
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	19.2%	11.8%	1.6	104	13.5%	11.5%	1.2	37
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	241	1.1%	0.4%	3.0	87
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	7.3%	4.6%	1.6	536	3.8%	3.8%	1.0	186

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	5.4%	3.7%	1.4	224	4.2%	3.6%	1.2	95
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	10.0%	5.8%	1.7	30	11.1%	6.0%	1.8	27
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	5.6%	2.3%	2.4	36	0.0%	3.9%	0.0	23
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	20	0.0%	1.3%	0.0	23
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	30.4%	24.4%	*	68	20.0%	36.9%	*	19
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	8.8%	4.3%	2.0	68	5.3%	3.2%	1.6	19
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	1'136	*	*	*	453
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.7%	2.7%	0.6	173	2.8%	2.6%	1.1	107
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	18.9%	11.2%	*	17	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	5.9%	8.6%	0.7	17	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.4%	2.2%	0.6	73	2.0%	2.1%	0.9	51
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	...	*	*	*	<10
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.6%	0.3%	2.3	647	0.9%	0.3%	2.9	235
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	92.6%	92.9%	*	599	86.8%	93.5%	*	204
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	1.4	1'169	0.3%	0.1%	2.6	381
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	14.3%	6.5%	2.2	14	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	192	*	*	*	78
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	<10	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	5.0%	4.3%	1.2	639	10.5%	4.4%	2.4	209
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	4.3%	3.7%	1.1	94	7.9%	2.9%	2.7	38
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	12.5%	10.2%	1.2	16	7.7%	8.5%	0.9	13
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	0.9%	3.1%	0.3	114	0.0%	1.6%	0.0	30
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	149	0.0%	0.8%	0.0	28
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	7.7%	6.8%	1.1	52	5.6%	5.4%	1.0	18
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	45.5%	36.6%	1.2	22	53.3%	39.9%	1.3	15
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	192	*	*	*	67
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	17	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	209	*	*	*	81
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	39	*	*	*	28
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	5.6%	5.8%	1.0	18	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.7%	6.8%	1.6	56	14.3%	6.0%	2.4	14

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	124	0.0%	0.5%	0.0	49
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	3.8%	2.8%	1.4	53	12.5%	7.6%	1.7	16
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	138	*	*	*	52
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	5.7%	4.3%	1.3	105	4.9%	3.9%	1.2	41
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	10	*	*	*	<10
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	66.7%	43.8%	1.5	36	61.5%	37.9%	1.6	13
F3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	158	*	*	*	104
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	35	3.2%	0.7%	4.8	31
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	0.0%	*	12
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	0.0%	2.3%	0.0	12	0.0%	4.9%	0.0	17
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	14.3%	6.7%	2.1	21	20.0%	11.0%	1.8	10
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	14.3%	5.9%	2.4	14	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	3.3%	1.7%	1.9	30	0.0%	1.3%	0.0	13
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	36	*	*	*	14
F4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.8%	2.9%	0.9	180	3.4%	2.7%	1.3	59
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	16.9%	13.4%	1.3	59	5.9%	16.7%	0.4	17
F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	277
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	18
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	13
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	3'420	*	*	*	1'308
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	*	*	*	<10	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.7%	3.0%	*	63	2.5%	3.1%	*	22
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	28.2%	28.6%	*	667	20.1%	26.4%	*	179
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	30.9%	32.6%	*	1'058	31.8%	33.0%	*	416
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	136	*	*	*	37
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	11	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	28	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	39	*	*	*	11
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	58	*	*	*	15
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	65	*	*	*	15
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	636	*	*	*	167
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	4'172	*	*	*	1'365
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	558	0.0%	0.0%	0.0	152
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	93.5%	71.9%	*	506	95.7%	74.3%	*	135
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	944	*	*	*	387

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	743	*	*	*	284
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	439	*	*	*	179
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	68.3%	67.2%	*	300	73.7%	71.4%	*	132
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	5.9%	2.0%	2.9	135	1.9%	0.6%	3.1	52
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	11.1%	22.6%	*	15	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	14.0%	24.1%	*	22	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	4.5%	0.3%	13.7	22	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	780	*	*	*	302
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	13.2%	43.5%	*	103	23.2%	42.9%	*	70
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	464	*	*	*	172
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	588	*	*	*	174
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	383	*	*	*	140
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	*	*	<10	18.6%	10.4%	*	26
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	6.5%	3.2%	2.0	46	8.7%	3.2%	2.7	23
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.1%	0.2%	0.6	889	0.0%	0.2%	0.0	233
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	1'087	*	*	*	439
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	437	0.0%	0.1%	0.0	162
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	472	0.7%	0.2%	2.8	148
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.0%	0.8%	1.2	98	0.0%	1.0%	0.0	37
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.3%	0.1%	3.0	372	0.0%	0.1%	0.0	150
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	46	0.0%	0.2%	0.0	15
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	1'859	*	*	*	657
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	592	0.5%	0.1%	5.4	205
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	6.5%	4.3%	1.5	199	3.1%	3.0%	1.0	65
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	23	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	5.9%	1.8%	3.3	17	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	6.8%	2.4%	2.8	44	0.0%	2.0%	0.0	17
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	4.8%	4.1%	1.2	42	7.1%	2.8%	2.6	14
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	4.7%	5.8%	0.8	43	0.0%	4.7%	0.0	12
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	16.7%	9.6%	1.7	30	10.0%	6.0%	1.7	10
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.3%	4.2%	1.3	228	6.0%	3.2%	1.9	84
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	30.6%	28.7%	1.1	513	33.3%	28.7%	1.2	153
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	21.2%	17.0%	1.2	713	20.5%	14.3%	1.4	259