

# Hôpital du Valais – Centre hospitalier du centre du Valais (CHCVs)

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.2%	6.2%	1.0	1'123	7.4%	5.6%	1.3	390
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	2.4%	1.0%	2.5	42	4.0%	1.6%	2.5	25
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.8%	2.1%	1.8	392	3.8%	1.8%	2.2	130
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	5.0%	6.7%	0.8	579	8.9%	6.0%	1.5	191
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	22.7%	20.7%	1.1	110	13.6%	17.7%	0.8	44
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	83.3%	53.0%	*	935	81.3%	55.7%	*	317
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	10.0%	8.7%	1.2	619	9.5%	8.4%	1.1	264
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.1%	3.3%	0.9	260	4.1%	3.0%	1.4	97
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	4.0%	5.8%	*	44	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.8%	6.7%	1.0	628	10.3%	6.1%	1.7	204
A.1.11.M Nichtransmuraler Infarkt/STEMI (Alter >19), Mortalität	3.7%	4.4%	0.8	438	2.8%	4.2%	0.7	180
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	6.5%	8.8%	0.7	1'125	8.3%	8.8%	0.9	409
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.3%	0.0	109	5.6%	3.4%	1.7	36
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.2%	7.6%	0.8	643	4.6%	7.5%	0.6	218
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	9.0%	12.8%	0.7	366	14.6%	12.2%	1.2	151
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	2'647	*	*	*	785
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	2.4%	3.2%	0.7	848	6.3%	3.1%	2.0	300
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	12.0%	9.2%	1.3	183	6.1%	9.5%	0.6	33
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.4%	0.5%	0.7	1'393	0.7%	0.5%	1.5	403
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	42.4%	38.0%	*	591	40.2%	38.7%	*	162
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	761	*	*	*	221
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	295	*	*	*	104
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	53	*	*	*	19
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	15	*	*	*	21
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	728	*	*	*	191
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	332	*	*	*	109
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	429	*	*	*	93
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	110	*	*	*	44
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	134	*	*	*	48
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	3.8%	2.2%	1.7	160	1.7%	3.0%	0.6	59
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.11.M OP nur an Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.3%	3.7%	0.4	75	6.7%	5.9%	1.1	15
A.7.12.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.5%	1.5%	1.7	239	2.0%	1.5%	1.3	49
A.7.13.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	0.0%	0.0%	*	17	*	*	*	<10
A.7.14.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	43	*	*	*	<10
A.7.15.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	3.7%	1.1%	3.3	81	0.0%	0.6%	0.0	17
A.7.16.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	2.4%	1.9%	1.3	85	5.6%	2.6%	2.2	18
A.7.17.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	7.7%	4.1%	1.9	13	*	*	*	<10
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	4.2%	2.6%	*	10	*	*	*	<10
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	13.1%	12.0%	1.1	953	9.7%	10.4%	0.9	423
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	3.2%	3.8%	0.8	31	0.0%	3.4%	0.0	20
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	7.3%	6.1%	1.2	220	0.0%	5.4%	0.0	78
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	12.9%	11.5%	1.1	535	10.7%	9.7%	1.1	233
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	23.4%	23.2%	1.0	167	17.4%	18.1%	1.0	92
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	0.0%	10.9%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	7.7%	7.9%	1.0	676	6.8%	6.9%	1.0	338
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	8.0%	7.7%	1.0	597	6.9%	6.8%	1.0	259
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	16.4%	8.4%	*	111	21.9%	10.8%	*	74
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	6.3%	10.0%	0.6	111	14.9%	9.1%	1.6	74
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	35.4%	29.2%	1.2	158	23.5%	25.4%	0.9	51
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	11.8%	13.1%	0.9	51	8.0%	13.0%	0.6	25
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	7.1%	13.7%	*	68	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	16.2%	13.1%	1.2	68	*	*	*	<10
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	1.2%	0.3%	4.4	338	0.0%	0.4%	0.0	104
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	3.8%	5.9%	0.6	1'388	4.3%	5.9%	0.7	513
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	122	0.0%	0.4%	0.0	39
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.8%	0.7%	2.6	111	0.0%	0.4%	0.0	30
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	1.9%	3.4%	0.5	265	0.0%	3.2%	0.0	91
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.0%	6.7%	0.8	617	5.2%	6.2%	0.8	251
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	5.5%	11.4%	0.5	273	8.8%	11.1%	0.8	102
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	108	0.0%	0.5%	0.0	33
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.4%	5.1%	0.7	1'051	3.2%	4.9%	0.7	342

# Hôpital du Valais – Centre hospitalier du centre du Valais (CHCVs)

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	1.4%	3.2%	0.4	433	3.1%	3.5%	0.9	226
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	2.4%	5.4%	0.4	42	4.0%	4.9%	0.8	50
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	0.0%	1.9%	0.0	33	0.0%	3.5%	0.0	35
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	32	4.1%	1.1%	3.6	49
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	19	0.0%	1.2%	0.0	19
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	17.3%	24.4%	*	75	32.3%	36.9%	*	73
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	2.7%	3.5%	0.8	75	4.1%	3.4%	1.2	73
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	945	*	*	*	454
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	0.7%	2.8%	0.2	151	0.0%	2.4%	0.0	67
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	13.6%	11.2%	*	12	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	8.3%	9.5%	0.9	12	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	76	0.0%	1.7%	0.0	34
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	...	...	*	...	*	*	*	<10
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	712	0.5%	0.4%	1.3	207
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	94.4%	92.9%	*	672	94.7%	93.5%	*	196
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.1%	2.5	929	1.6%	0.1%	16.7	248
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	4.8%	7.9%	0.6	21	*	*	*	<10
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	79	*	*	*	24
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	<10	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	12	*	*	*	17
<b>E.4 Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	6.1%	5.3%	1.2	477	10.4%	5.0%	2.1	154
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	4.3%	3.8%	1.1	138	4.8%	3.3%	1.4	42
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	16.7%	11.1%	1.5	12	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.8%	3.2%	1.5	62	0.0%	2.2%	0.0	16
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	1.9%	0.6%	3.4	53	0.0%	0.5%	0.0	10
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	7.5%	9.3%	0.8	53	8.0%	4.2%	1.9	25
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	33.3%	34.6%	1.0	18	53.8%	51.3%	1.1	13
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	138	*	*	*	44
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	17	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	270	*	*	*	87
<b>E.5 Operationen am Magen</b>								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	65	*	*	*	17
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	9.7%	4.3%	2.2	31	0.0%	5.6%	0.0	10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	3.5%	7.2%	0.5	57	20.0%	6.6%	3.1	15

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>F Operationen an Gefäßen</b>								
<b>F.1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	1.5%	0.5%	2.9	67	0.0%	0.8%	0.0	37
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	82	*	*	*	75
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	1.4%	4.7%	0.3	72	4.9%	3.9%	1.2	41
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	27
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	65.0%	33.7%	1.9	20	*	*	*	<10
<b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	154	*	*	*	129
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	0.6%	0.0	33
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	1.7%	4.4%	0.4	60	5.2%	5.4%	1.0	58
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	9.5%	1.7%	5.7	21	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	11	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	49	*	*	*	12
<b>F.4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.9%	2.7%	0.3	117	2.4%	2.6%	0.9	42
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	14.9%	12.4%	1.2	47	7.7%	14.0%	0.5	13
<b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	76
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	30
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	4'798	*	*	*	1'707
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.1%	3.0%	*	74	1.2%	3.1%	*	15
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	30.9%	28.6%	*	1'112	27.8%	26.4%	*	355
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	25.0%	32.6%	*	1'201	25.3%	33.0%	*	432
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	30	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	13	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	337	*	*	*	141
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	4'612	*	*	*	1'620
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	342	0.0%	0.0%	0.0	139
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	52.8%	71.9%	*	168	57.1%	74.3%	*	76
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	752	*	*	*	381

# Hôpital du Valais – Centre hospitalier du centre du Valais (CHCVs)

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	695	*	*	*	271
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	454	*	*	*	183
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	70.5%	67.2%	*	320	68.3%	71.4%	*	125
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	2.5%	2.0%	1.2	81	0.0%	1.0%	0.0	21
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	*	*	*	<10	0.0%	24.8%	*	0
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	15.6%	24.1%	*	15	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	15	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	17.9%	*	0	0.0%	27.2%	*	0
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	839	*	*	*	223
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	48.7%	43.5%	*	409	36.3%	42.9%	*	81
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	400	*	*	*	144
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	377	*	*	*	144
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	314	*	*	*	109
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	0.0%	3.7%	*	0	13.8%	10.4%	*	15
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	3.4%	3.6%	1.0	29	0.0%	4.1%	0.0	11
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	607	0.0%	0.1%	0.0	235
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	607	*	*	*	289
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	165	0.0%	0.1%	0.0	84
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	470	0.8%	0.3%	3.0	132
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	2.4%	1.1%	2.1	83	2.6%	1.6%	1.6	39
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	253	0.0%	0.1%	0.0	67
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	25	0.0%	0.1%	0.0	10
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	1'222	*	*	*	445
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	684	0.0%	0.1%	0.0	259
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.2%	4.0%	0.8	504	1.5%	2.9%	0.5	195
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	67	0.0%	0.0%	*	17
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	64	0.0%	0.9%	0.0	21
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	4.8%	2.3%	2.1	104	2.3%	1.4%	1.6	44
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	4.1%	4.3%	1.0	97	0.0%	2.9%	0.0	42
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	3.7%	5.6%	0.7	109	2.3%	4.4%	0.5	43
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	4.8%	9.3%	0.5	63	3.6%	6.1%	0.6	28
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	2.1%	3.5%	0.6	373	2.6%	3.0%	0.9	192
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	34.6%	31.9%	1.1	280	44.1%	31.1%	1.4	127
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	18.5%	18.3%	1.0	421	23.7%	15.8%	1.5	177