

**Erklärende Bemerkungen der Klinik Sonnenhof AG**

A.1.10.M

① 3 Patienten verstorben, bei 1 Patient Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige

zA.2.4.M

② 4 Patienten verstorben, bei 2 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige

A.2.5.M

③ 6 Patienten verstorben, bei 4 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige

B.1.4.M

④ 2 Patienten verstorben, bei 1 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige sowie Patientenverfügung bei 1 Patienten

B.1.5.M

⑤ 6 Patienten verstorben, bei allen 6 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige oder Patientenverfügungen

B.1.7.M

B.1.8.M

D.2.4.M

⑥ 1 Patient verstorben, Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige

B.1.12.M

⑦ 2 Patienten verstorben, bei beiden Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige

I.1.3.M

⑧ 1 Patient verstorben. Ausschlaggebend waren die Nebendiagnosen

J.1.1.M

⑨ 8 Patienten verstorben, bei 3 Patienten Limitierung der Therapie auf Wunsch Patient / Angehörige

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.4%	7.9%	0.8	125	3.8%	6.6%	0.6	132
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	40	0.0%	1.7%	0.0	46
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	6.7%	6.4%	1.0	60	5.4%	6.3%	0.8	56
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	18.2%	23.5%	0.8	22	8.0%	17.4%	0.5	25
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	82.4%	53.0%	*	103	78.0%	55.7%	*	103
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	6.5%	10.9%	0.6	123	3.9%	9.7%	0.4	128
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	32.0%	5.8%	*	40	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	12.2%	8.0%	1.5	41	8.3%	7.7%	1.1	36
A.1.11.M Nichtransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.3%	5.1%	0.4	44	1.2%	4.0%	0.3	86
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	7.2%	9.5%	0.8	237	10.9%	9.3%	1.2	92
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.2%	0.0	17	*	*	*	<10
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	5.3%	7.8%	0.7	131	7.5%	7.9%	1.0	53
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	11.4%	13.3%	0.9	88	18.2%	12.9%	1.4	33
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	1'414	*	*	*	525
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	2.9%	3.6%	0.8	103	2.9%	3.1%	0.9	103
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	12.5%	8.1%	1.5	16	0.0%	8.5%	0.0	11
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.5%	1.2	1'277	0.2%	0.4%	0.6	407
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	55.8%	38.0%	*	712	45.7%	38.7%	*	186
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	512	*	*	*	156
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	269	*	*	*	61
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	71	*	*	*	12
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	76	*	*	*	59
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	147	*	*	*	0
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	234	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	16	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	47	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	172	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	8.3%	2.6%	3.2	12	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.3%	1.5%	2.9	46	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	5.3%	1.1%	4.9	19	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	6.2%	1.9%	3.2	16	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	9.1%	15.3%	0.6	121	22.2%	12.8%	1.7	36
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	5.8%	0.0	12	*	*	*	<10
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	5.8%	12.5%	0.5	69	11.8%	10.2%	1.1	17
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	18.4%	24.0%	0.8	38	50.0%	20.5%	2.4	12
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	0.0%	10.9%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	5.0%	11.0%	0.5	60	8.3%	7.0%	1.2	12
⑥ B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	5.1%	11.1%	0.5	59	9.1%	7.0%	1.3	11
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	*	*	*	<10	0.0%	10.8%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	35.7%	37.8%	0.9	14	*	*	*	<10
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	33.1%	13.7%	*	40	30.6%	10.0%	*	11
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	7.5%	13.2%	0.6	40	18.2%	12.8%	1.4	11
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	1.3%	0.3%	4.0	78	0.0%	0.4%	0.0	29
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.0%	6.2%	0.7	298	1.3%	6.0%	0.2	76
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	2.7%	0.8%	3.6	37	*	*	*	<10
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.4%	0.0	64	0.0%	2.9%	0.0	18
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	3.8%	6.6%	0.6	132	3.2%	6.2%	0.5	31
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	9.5%	11.5%	0.8	63	0.0%	11.2%	0.0	18
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.4%	5.0%	0.9	270	0.0%	5.0%	0.0	69

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	8.3%	4.6%	1.8	132	5.3%	4.3%	1.2	38
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	18.5%	8.3%	2.2	27	*	*	*	<10
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	7.1%	3.7%	1.9	14	*	*	*	<10
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	15	10.0%	1.8%	5.4	10
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	13.6%	24.4%	*	18	31.6%	36.9%	*	12
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	5.6%	7.0%	0.8	18	0.0%	3.7%	0.0	12
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	155	*	*	*	52
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	3.4%	2.3%	1.5	29	0.0%	3.1%	0.0	13
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	0.0%	9.9%	*	0
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	...	...	*	...	0.0%	8.4%	*	0
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	209	0.0%	0.4%	0.0	63
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	96.2%	92.9%	*	201	93.7%	93.5%	*	59
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.1%	2.7	351	0.0%	0.1%	0.0	154
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	30	*	*	*	<10
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	8.9%	4.8%	1.9	135	0.0%	4.1%	0.0	24
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	12.5%	4.0%	3.2	24	*	*	*	<10
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	7.1%	4.4%	1.6	14	*	*	*	<10
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	31	*	*	*	<10
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	5.6%	6.1%	0.9	18	*	*	*	<10
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	44	*	*	*	<10
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	21	*	*	*	20
<b>E.5 Operationen am Magen</b>								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.0%	7.7%	1.3	20	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>F Operationen an Gefäßen</b>								
<b>F.1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	38	0.0%	1.3%	0.0	11
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	10.0%	52.9%	0.2	10	*	*	*	0
<b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	51	*	*	*	21
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	13	*	*	*	<10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	25	*	*	*	<10
<b>F.4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	2.8%	0.0	17
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	61
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	0
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	3'031	*	*	*	1'056
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	1.6%	3.0%	*	30	2.9%	3.1%	*	20
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	38.1%	28.6%	*	733	29.5%	26.4%	*	203
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	36.5%	32.6%	*	1'107	34.8%	33.0%	*	367
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	99	*	*	*	34
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	2'947	*	*	*	1'031
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.1%	0.0%	4.2	789	0.0%	0.0%	0.0	304
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	91.6%	71.9%	*	721	88.0%	74.3%	*	265
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	1'030	*	*	*	351

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'014	*	*	*	374
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	551	*	*	*	209
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	63.0%	67.2%	*	347	67.9%	71.4%	*	142
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	16	*	*	*	<10
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	0.0%	22.6%	*	0	0.0%	24.8%	*	0
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	17.9%	*	0	0.0%	27.2%	*	0
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	124	*	*	*	25
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	20.2%	43.5%	*	25	44.0%	42.9%	*	11
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	70	*	*	*	20
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	87	*	*	*	26
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	46	*	*	*	14
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	0.0%	3.7%	*	0	0.0%	10.4%	*	0
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	113	0.0%	0.1%	0.0	48
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	146	*	*	*	39
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	2.3%	0.5%	4.5	43	0.0%	0.0%	0.0	17
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.4%	0.1%	2.4	567	0.0%	0.1%	0.0	493
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.2%	1.0%	1.2	83	0.0%	0.6%	0.0	52
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.3%	0.1%	5.0	327	0.4%	0.1%	4.6	284
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	59	0.0%	0.1%	0.0	34
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	1'338	*	*	*	964
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	350	0.0%	0.1%	0.0	216
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	4.6%	4.8%	1.0	109	2.6%	2.5%	1.0	38
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	12	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	20	0.0%	1.8%	0.0	10
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	11.1%	3.8%	2.9	18	*	*	*	<10
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	4.0%	5.4%	0.7	25	*	*	*	<10
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	7.4%	9.3%	0.8	27	*	*	*	<10
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	2.9%	3.7%	0.8	70	0.0%	3.0%	0.0	46
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	30.0%	33.0%	0.9	10	42.1%	32.4%	1.3	19
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	18.2%	17.6%	1.0	66	4.3%	14.8%	0.3	47