

| Krankheitsgruppen | 2008–2011 | | | | 2012 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.1 Herzinfarkt | | | | | | | | |
| A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 2.2% | 5.1% | 0.4 | 411 | 0.0% | 5.2% | 0.0 | 57 |
| A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität | 0.0% | 1.4% | 0.0 | 12 | * | * | * | <10 |
| A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität | 0.7% | 2.0% | 0.3 | 145 | 0.0% | 2.1% | 0.0 | 13 |
| A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität | 2.9% | 6.2% | 0.5 | 238 | 0.0% | 5.8% | 0.0 | 41 |
| A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität | 6.2% | 19.1% | 0.3 | 16 | * | * | * | <10 |
| A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen | 95.4% | 53.7% | * | 392 | 87.7% | 59.5% | * | 50 |
| A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität | 2.2% | 7.7% | 0.3 | 357 | 0.0% | 7.2% | 0.0 | 54 |
| A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | 4.2% | 3.3% | 1.3 | 24 | * | * | * | <10 |
| A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19) | 51.5% | 5.2% | * | 211 | 42.1% | 2.4% | * | 24 |
| A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 2.5% | 6.2% | 0.4 | 199 | 0.0% | 6.7% | 0.0 | 23 |
| A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | 0.0% | 3.6% | 0.0 | 10 |
| A.2 Herzinsuffizienz | | | | | | | | |
| A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität | 6.0% | 8.5% | 0.7 | 403 | 8.6% | 9.4% | 0.9 | 105 |
| A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität | 0.0% | 3.3% | 0.0 | 42 | * | * | * | <10 |
| A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität | 6.1% | 7.4% | 0.8 | 246 | 1.9% | 7.1% | 0.3 | 52 |
| A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität | 7.8% | 12.8% | 0.6 | 115 | 17.8% | 13.2% | 1.3 | 45 |
| A.3 Linksherzkatheter (LHK) | | | | | | | | |
| A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronaragnostik/-intervention insgesamt | * | * | * | 1'926 | * | * | * | 474 |
| A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität | 2.0% | 3.4% | 0.6 | 304 | 0.0% | 4.0% | 0.0 | 44 |
| A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität | 10.0% | 10.1% | 1.0 | 10 | * | * | * | <10 |
| A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität | 0.3% | 0.5% | 0.5 | 1'598 | 0.0% | 0.8% | 0.0 | 405 |
| A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19) | 34.2% | 38.2% | * | 547 | 39.0% | 37.7% | * | 158 |
| A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.4 Herzrhythmusstörungen | | | | | | | | |
| A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen | * | * | * | 683 | * | * | * | 190 |
| A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator | | | | | | | | |
| A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren) | * | * | * | 272 | * | * | * | 88 |
| A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators | * | * | * | 61 | * | * | * | 15 |
| A.6 Ablative Therapie | | | | | | | | |
| A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie | * | * | * | 20 | * | * | * | 25 |
| A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| A.7 Operationen am Herzen | | | | | | | | |
| A.7.1.F OP am Herzen insgesamt | * | * | * | 258 | * | * | * | 125 |
| A.7.2.F OP an Herzklappen | * | * | * | 154 | * | * | * | 84 |
| A.7.3.F OP an Koronargefässen | * | * | * | 108 | * | * | * | 52 |
| A.7.4.F Andere OP am Herzen | * | * | * | 28 | * | * | * | <10 |
| A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen | * | * | * | 32 | * | * | * | 20 |
| A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität | 3.9% | 2.5% | 1.5 | 77 | 0.0% | 2.9% | 0.0 | 36 |
| A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2011 | | | | 2012 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.7 Operationen am Herzen | | | | | | | | |
| A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 3.5% | 0.0 | 73 | * | * | * | <10 |
| A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | <10 | 3.6% | 1.2% | 3.1 | 28 |
| A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität | * | * | * | <10 | 0.0% | 0.6% | 0.0 | 12 |
| A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität | * | * | * | <10 | 10.0% | 1.4% | 7.2 | 10 |
| A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19) | 0.0% | 2.7% | * | 0 | 0.0% | 3.2% | * | 0 |
| B Schlaganfall (Stroke) | | | | | | | | |
| B.1 Schlaganfall | | | | | | | | |
| B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität | 2.2% | 14.9% | 0.1 | 46 | 10.0% | 12.2% | 0.8 | 10 |
| B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität | 3.8% | 11.3% | 0.3 | 26 | * | * | * | <10 |
| B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität | 0.0% | 21.9% | 0.0 | 17 | * | * | * | <10 |
| B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19) | 0.0% | 7.6% | * | 0 | 0.0% | 17.6% | * | 0 |
| B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität | 0.0% | 9.4% | 0.0 | 11 | * | * | * | <10 |
| B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität | 0.0% | 9.5% | 0.0 | 11 | * | * | * | <10 |
| B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse | 0.0% | 9.1% | * | 0 | 0.0% | 10.6% | * | 0 |
| B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | 0 |
| B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19) | 73.9% | 12.7% | * | 34 | * | * | * | <10 |
| B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität | 2.9% | 13.2% | 0.2 | 34 | * | * | * | <10 |
| B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | | | | | | | |
| B.2.1.M TIA, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung | * | * | * | 0 | 0.0% | 8.8% | * | 0 |
| C Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| C.1 Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D Erkrankungen der Lunge | | | | | | | | |
| D.1 Lungenentzündung (Pneumonie) | | | | | | | | |
| D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität | 0.5% | 6.2% | 0.1 | 188 | 0.9% | 5.8% | 0.2 | 106 |
| D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität | 0.0% | 0.8% | 0.0 | 11 | * | * | * | <10 |
| D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität | 0.0% | 3.2% | 0.0 | 43 | 0.0% | 4.0% | 0.0 | 16 |
| D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität | 1.0% | 6.5% | 0.2 | 98 | 1.7% | 5.3% | 0.3 | 58 |
| D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität | 0.0% | 11.6% | 0.0 | 33 | 0.0% | 10.1% | 0.0 | 24 |
| D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 0.6% | 5.0% | 0.1 | 178 | 0.0% | 4.9% | 0.0 | 92 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2011 | | | | 2012 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| D Erkrankungen der Lunge | | | | | | | | |
| D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | | | | | | | | |
| D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität | 1.5% | 4.3% | 0.4 | 653 | 5.3% | 5.7% | 0.9 | 57 |
| D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität | * | * | * | 0 | 8.3% | 10.9% | 0.8 | 12 |
| D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez. | 39.1% | 27.7% | * | 255 | 70.2% | 29.2% | * | 40 |
| D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität | 2.4% | 4.6% | 0.5 | 255 | 5.0% | 5.5% | 0.9 | 40 |
| D.3 Lungenkrebs | | | | | | | | |
| D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs | * | * | * | 147 | * | * | * | 102 |
| D.4 Operationen an der Lunge | | | | | | | | |
| D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität | 0.0% | 3.1% | 0.0 | 35 | 0.0% | 2.1% | 0.0 | 24 |
| D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität | 0.0% | 3.0% | 0.0 | 25 | 0.0% | 1.5% | 0.0 | 19 |
| D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom | 0.0% | 2.3% | * | 0 | 0.0% | 6.5% | * | 0 |
| E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie) | | | | | | | | |
| E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) | | | | | | | | |
| E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 394 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 116 |
| E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor | 98.7% | 93.0% | * | 389 | 96.6% | 94.5% | * | 112 |
| E.2 Hernienoperationen | | | | | | | | |
| E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 692 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 203 |
| E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| E.3 Eingriffe an der Schilddrüse | | | | | | | | |
| E.3.1.F Resektion der Schilddrüse | * | * | * | 38 | * | * | * | <10 |
| E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse | 0.0% | 0.3% | * | 0 | 0.0% | 0.3% | * | 0 |
| E.3.3.F Radiojodtherapie | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen) | | | | | | | | |
| E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität | 1.8% | 4.1% | 0.4 | 340 | 2.2% | 4.8% | 0.5 | 90 |
| E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität | 5.0% | 3.6% | 1.4 | 60 | 5.9% | 2.8% | 2.1 | 17 |
| E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität | 6.7% | 1.7% | 3.9 | 15 | * | * | * | <10 |
| E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 74 | 0.0% | 0.5% | 0.0 | 25 |
| E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität | 0.0% | 2.2% | 0.0 | 13 | 0.0% | 3.0% | 0.0 | 16 |
| E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose | * | * | * | 174 | * | * | * | 20 |
| E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom | * | * | * | 67 | * | * | * | <10 |
| E.5 Operationen am Magen | | | | | | | | |
| E.5.1.F Magenresektionen insgesamt | * | * | * | 63 | * | * | * | <10 |
| E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität | 0.0% | 2.6% | 0.0 | 15 | * | * | * | <10 |
| E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | 0 |
| E.6 Operationen am Ösophagus | | | | | | | | |
| E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| E.7 Operationen am Pankreas | | | | | | | | |
| E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität | 0.0% | 6.9% | 0.0 | 26 | * | * | * | <10 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2011 | | | | 2012 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| F Operationen an Gefässen | | | | | | | | |
| F1 Extrakranielle Gefässoperationen | | | | | | | | |
| F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma) | | | | | | | | |
| F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt | * | * | * | 15 | * | * | * | 19 |
| F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe) | * | * | * | <10 | * | * | * | 10 |
| F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F3 Operationen an Becken-/Beinarterien | | | | | | | | |
| F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt | * | * | * | 73 | * | * | * | 34 |
| F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität | 5.0% | 4.6% | 1.1 | 20 | 0.0% | 3.4% | 0.0 | 12 |
| F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität | 0.0% | 1.1% | 0.0 | 32 | * | * | * | <10 |
| F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP | * | * | * | <10 | * | * | * | 0 |
| F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen | * | * | * | 20 | * | * | * | <10 |
| F4 Amputationen | | | | | | | | |
| F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA) | | | | | | | | |
| F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien | * | * | * | 0 | * | * | * | <10 |
| F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP | * | * | * | 32 | * | * | * | <10 |
| G Geburtshilfe und Frauenheilkunde | | | | | | | | |
| G.1 Geburten | | | | | | | | |
| G.1.1.F Stationäre Geburten | * | * | * | 2'202 | * | * | * | 640 |
| G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten | 0.0% | 0.0% | * | 0 | 0.0% | 0.0% | * | 0 |
| G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades | 2.2% | 3.0% | * | 31 | 3.7% | 3.1% | * | 16 |
| G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie | 24.4% | 28.1% | * | 344 | 29.7% | 24.6% | * | 130 |
| G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio) | 36.1% | 32.7% | * | 794 | 31.6% | 33.1% | * | 202 |
| G.2 Neugeborene | | | | | | | | |
| G.2.1.F Neugeborene <1250 g | * | * | * | <10 | * | * | * | 0 |
| G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.2.3.F Neugeborene <500 g | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.2.4.F Neugeborene 500–749 g | * | * | * | <10 | * | * | * | 0 |
| G.2.5.F Neugeborene 750–999 g | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g | * | * | * | 125 | * | * | * | 32 |
| G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe | * | * | * | 2'162 | * | * | * | 628 |
| G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie) | | | | | | | | |
| G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 200 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 41 |
| G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik | 93.9% | 72.5% | * | 185 | 85.4% | 74.5% | * | 35 |
| G.4 Brustkrebs | | | | | | | | |
| G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs | * | * | * | 133 | * | * | * | 101 |

| Krankheitsgruppen | 2008–2011 | | | | 2012 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| G Geburtshilfe und Frauenheilkunde | | | | | | | | |
| G.5 Eingriffe an der Brust | | | | | | | | |
| G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken) | * | * | * | 420 | * | * | * | 91 |
| G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs | * | * | * | 60 | * | * | * | 22 |
| G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs | 26.7% | 68.3% | * | 16 | 68.2% | 72.0% | * | 15 |
| H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie) | | | | | | | | |
| H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie | 86.7% | 24.5% | * | 39 | * | * | * | <10 |
| H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität | 0.0% | 0.4% | 0.0 | 39 | * | * | * | <10 |
| H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie | * | * | * | <10 | 0.0% | 34.4% | * | 0 |
| H.2 Nierensteine | | | | | | | | |
| H.2.1.F HD Nierensteine | * | * | * | 103 | * | * | * | 31 |
| H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| H.3 Eingriffe an der Harnblase | | | | | | | | |
| H.3.1.F HD Malignom der Blase | * | * | * | 282 | * | * | * | 54 |
| H.3.2.F TUR der Blase insgesamt | * | * | * | 196 | * | * | * | 49 |
| H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom | * | * | * | 160 | * | * | * | 35 |
| H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase | 0.0% | 5.5% | * | 0 | 0.0% | 12.4% | * | 0 |
| H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität | 5.0% | 5.9% | 0.8 | 20 | * | * | * | <10 |
| H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR) | | | | | | | | |
| H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität | 0.4% | 0.2% | 1.8 | 254 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 63 |
| H.5 Prostatakarzinom | | | | | | | | |
| H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND) | * | * | * | 76 | * | * | * | 88 |
| H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 65 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 28 |
| I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder | | | | | | | | |
| I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP) | | | | | | | | |
| I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität | 0.5% | 0.2% | 2.3 | 221 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 90 |
| I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität | 0.0% | 1.2% | 0.0 | 17 | 0.0% | 1.9% | 0.0 | 13 |
| I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 251 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 79 |
| I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 17 | * | * | * | <10 |
| I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2 Operationen an der Wirbelsäule | | | | | | | | |
| I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt | * | * | * | 740 | * | * | * | 184 |
| I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 175 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 30 |
| I.3 Hüftgelenknahe Frakturen | | | | | | | | |
| I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität | 3.3% | 4.2% | 0.8 | 122 | 2.0% | 4.8% | 0.4 | 49 |
| I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität | * | * | * | <10 | * | * | * | <10 |
| I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität | 0.0% | 1.7% | 0.0 | 12 | * | * | * | 0 |
| I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität | 2.9% | 2.4% | 1.2 | 35 | 7.1% | 3.0% | 2.4 | 14 |
| I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität | 7.7% | 3.6% | 2.1 | 26 | * | * | * | <10 |
| I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität | 3.1% | 6.0% | 0.5 | 32 | 0.0% | 6.5% | 0.0 | 12 |
| I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität | 0.0% | 7.9% | 0.0 | 15 | 0.0% | 8.8% | 0.0 | 10 |
| I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 3.3% | 0.0 | 18 | * | * | * | <10 |
| J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review) | | | | | | | | |
| J.1 Beatmung | | | | | | | | |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität | * | * | * | 0 | 41.7% | 37.6% | 1.1 | 12 |
| J.2 Sepsis | | | | | | | | |
| J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität | 40.0% | 16.2% | 2.5 | 20 | 35.3% | 16.6% | 2.1 | 17 |