

**Erklärende Bemerkungen der Spital Thun-Simmental-Saanenland AG**

B.2.1.M  
D.2.4.M  
D.4.1.M  
H.4.1.M

① 1 Patient mit reduziertem Allgemeinzustand und reduzierten Behandlungs- und Therapiemassnahmen

D.2.1.M  
② 1 Multimorbider Patient mit akuter Infektion

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	8.7%	7.4%	1.2	725	5.5%	6.7%	0.8	182
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	26	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.4%	2.0%	0.7	214	3.4%	2.2%	1.6	58
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	9.1%	7.5%	1.2	383	4.3%	6.2%	0.7	92
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	24.5%	20.0%	1.2	102	13.8%	18.0%	0.8	29
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	2.3%	53.7%	*	17	*	*	*	<10
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	11.4%	11.3%	1.0	537	8.3%	10.0%	0.8	109
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.6%	3.4%	1.1	55	2.9%	3.9%	0.7	34
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	9.7%	5.2%	*	70	5.5%	2.4%	*	10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	7.7%	8.1%	1.0	324	1.2%	7.0%	0.2	84
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	7.6%	5.1%	1.5	331	6.8%	4.9%	1.4	88
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	10.2%	9.1%	1.1	1'026	13.8%	9.0%	1.5	276
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.0%	0.0	10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.7%	3.2%	1.5	86	6.2%	3.3%	1.9	16
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	7.0%	7.6%	0.9	544	14.2%	7.2%	2.0	148
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	16.3%	12.7%	1.3	386	14.7%	12.6%	1.2	109
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronaragnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	50	*	*	*	11
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	17	*	*	*	<10
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	3.0%	0.5%	5.8	33	*	*	*	<10
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	*	*	*	<10	0.0%	37.7%	*	0
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	563	*	*	*	180
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	126	*	*	*	26
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	13	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	13	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	16.1%	13.5%	1.2	659	6.6%	11.0%	0.6	183
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	4.5%	4.3%	1.1	22	0.0%	3.8%	0.0	11
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	2.4%	6.2%	0.4	83	0.0%	5.1%	0.0	33
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	13.9%	11.4%	1.2	374	6.4%	9.8%	0.7	94
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	28.3%	22.2%	1.3	180	13.3%	19.8%	0.7	45
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	7.6%	*	0	0.0%	17.6%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	10.9%	9.1%	1.2	476	3.5%	7.9%	0.4	143
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	10.5%	9.2%	1.1	449	3.9%	8.1%	0.5	128
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	9.1%	*	0	0.0%	10.6%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	34.1%	29.5%	1.2	85	25.0%	23.3%	1.1	16
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	19.2%	15.8%	1.2	26	10.0%	17.2%	0.6	10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	10.9%	12.7%	*	72	7.7%	8.0%	*	14
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	27.8%	15.4%	1.8	72	14.3%	9.3%	1.5	14
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	217	2.2%	0.4%	5.9	46
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.4%	*	0	0.0%	8.8%	*	0
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.5%	6.5%	1.0	941	5.0%	6.0%	0.8	199
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	15	*	*	*	<10
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	89	0.0%	0.7%	0.0	16
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	6.1%	3.2%	1.9	163	8.3%	3.9%	2.1	24
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.5%	6.6%	0.8	454	3.7%	5.5%	0.7	107
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	11.8%	11.6%	1.0	220	8.2%	10.3%	0.8	49
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	15	*	*	*	<10
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.0%	5.4%	0.7	772	4.8%	5.0%	1.0	167

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	4.6%	4.1%	1.1	345	11.3%	4.5%	2.5	106
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	5.3%	6.3%	0.8	38	20.0%	9.2%	2.2	25
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	6.9%	2.7%	2.5	29	6.9%	2.9%	2.4	29
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.5%	0.0	16	9.1%	2.3%	3.9	11
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	55.9%	27.7%	*	193	35.8%	29.2%	*	38
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	3.6%	4.6%	0.8	193	7.9%	3.6%	2.2	38
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	533	*	*	*	142
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.3%	2.4%	1.0	44	6.7%	1.0%	6.4	15
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	0.0%	10.9%	*	0	0.0%	7.5%	*	0
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	0.0%	2.3%	*	0	0.0%	6.5%	*	0
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.3%	0.3%	0.9	799	0.4%	0.3%	1.5	226
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	90.9%	93.0%	*	726	88.1%	94.5%	*	199
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.9	1'570	0.0%	0.2%	0.0	438
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	4.5%	5.8%	0.8	22	10.0%	6.6%	1.5	10
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	273	*	*	*	72
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.2%	5.2%	0.8	596	5.1%	6.3%	0.8	195
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	4.7%	4.2%	1.1	127	4.1%	4.7%	0.9	49
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	5.6%	14.7%	0.4	18	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.0%	3.1%	0.3	104	6.9%	4.7%	1.5	29
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	124	0.0%	0.4%	0.0	43
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	14.6%	7.4%	2.0	48	0.0%	4.1%	0.0	24
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	170	*	*	*	45
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	11	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	133	*	*	*	42
<b>E.5 Operationen am Magen</b>								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	32	*	*	*	<10
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	7.7%	5.1%	1.5	13	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	4.8%	5.8%	0.8	21	*	*	*	<10
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	2.6%	7.0%	0.4	38	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>F Operationen an Gefässen</b>								
<b>F1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	26	*	*	*	<10
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	40.0%	38.0%	1.1	25	*	*	*	<10
<b>F3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	55	*	*	*	23
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	7.1%	0.9%	8.2	14	*	*	*	<10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	14	*	*	*	<10
<b>F4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	3.6%	3.4%	1.1	138	4.9%	2.2%	2.2	41
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	0.0%	14.4%	0.0	17	*	*	*	<10
<b>F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	253	*	*	*	63
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	12	*	*	*	<10
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	4'106	*	*	*	1'044
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	*	*	*	<10	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.1%	3.0%	*	94	4.0%	3.1%	*	31
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	16.7%	28.1%	*	508	17.5%	24.6%	*	134
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	26.0%	32.7%	*	1'067	26.5%	33.1%	*	277
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	11	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	170	*	*	*	53
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	3'995	*	*	*	1'002
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	849	0.0%	0.0%	0.0	180
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	74.8%	72.5%	*	615	81.9%	74.5%	*	140
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	781	*	*	*	293

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	580	*	*	*	191
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	403	*	*	*	141
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	64.3%	68.3%	*	259	67.4%	72.0%	*	95
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.8%	0.0	34	*	*	*	<10
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	0.0%	23.1%	*	0	0.0%	26.1%	*	0
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	0.0%	29.2%	*	0
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	20.4%	*	0	*	*	*	0
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	460	*	*	*	131
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	20.4%	43.3%	*	94	42.0%	46.0%	*	55
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	88	*	*	*	72
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	98	*	*	*	73
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	56	*	*	*	54
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	0.0%	5.5%	*	0	*	*	*	<10
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	1.1%	0.2%	5.1	189	1.6%	0.2%	7.7	62
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	671	*	*	*	191
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	126	0.0%	0.1%	0.0	35
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.2%	0.2%	1.2	1'241	0.6%	0.1%	6.1	321
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	2.0%	1.1%	1.8	100	6.5%	3.2%	2.0	31
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.1%	0.1%	1.0	1'048	0.0%	0.1%	0.0	309
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	54	0.0%	0.2%	0.0	23
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	2'389	*	*	*	648
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	491	0.0%	0.0%	0.0	136
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	4.5%	4.5%	1.0	401	5.3%	5.1%	1.0	114
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	30	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.5%	0.0	42	0.0%	1.4%	0.0	11
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	4.0%	2.1%	1.9	75	3.6%	3.2%	1.1	28
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	5.9%	3.9%	1.5	68	4.0%	3.3%	1.2	25
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	5.8%	5.6%	1.0	103	7.1%	5.5%	1.3	14
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	6.0%	8.9%	0.7	83	10.7%	11.2%	1.0	28
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.4%	4.0%	1.3	373	5.4%	4.5%	1.2	111
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	33.9%	31.9%	1.1	127	32.3%	28.5%	1.1	31
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	15.1%	17.4%	0.9	780	13.4%	14.0%	1.0	351