

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.3%	4.9%	0.9	970	4.3%	4.3%	1.0	280
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	42	0.0%	1.0%	0.0	13
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.5%	2.0%	0.7	399	0.8%	2.1%	0.4	120
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	5.6%	6.2%	0.9	481	7.3%	5.6%	1.3	137
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	18.8%	19.2%	1.0	48	10.0%	17.0%	0.6	10
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	92.4%	53.7%	*	896	94.3%	59.5%	*	264
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	5.7%	7.7%	0.7	600	4.9%	5.9%	0.8	183
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.4%	2.8%	0.9	328	3.9%	3.1%	1.3	76
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	2.2%	5.2%	*	21	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.3%	5.6%	0.9	549	6.0%	5.1%	1.2	134
A.1.11.M Nichtransmuraler Infarkt/STEMI (Alter >19), Mortalität	2.3%	3.2%	0.7	392	1.4%	2.9%	0.5	143
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	11.6%	8.2%	1.4	596	10.3%	9.1%	1.1	146
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	6.9%	2.8%	2.5	58	*	*	*	<10
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	10.2%	7.6%	1.4	401	9.3%	7.1%	1.3	86
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	18.5%	12.5%	1.5	130	13.0%	12.5%	1.0	54
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	3'350	*	*	*	791
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	2.2%	3.1%	0.7	896	2.7%	3.3%	0.8	264
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	15.9%	9.9%	1.6	126	0.0%	10.6%	0.0	21
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.8%	0.4%	1.7	2'327	1.4%	0.7%	2.0	505
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	32.7%	38.2%	*	760	35.6%	37.7%	*	180
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	540	*	*	*	140
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	464	*	*	*	106
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	94	*	*	*	17
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	28	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	28	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	14.6%	11.2%	1.3	608	12.2%	9.7%	1.3	148
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.6%	0.0	19	0.0%	3.9%	0.0	10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	7.0%	5.8%	1.2	129	7.1%	4.9%	1.5	42
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	14.5%	10.8%	1.3	358	10.1%	9.7%	1.0	69
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	27.5%	21.2%	1.3	102	29.6%	19.1%	1.6	27
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	8.0%	7.4%	1.1	426	9.2%	6.1%	1.5	109
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.8%	7.6%	1.0	384	9.9%	5.9%	1.7	101
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	10.1%	9.1%	*	43	12.8%	10.6%	*	14
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	7.0%	9.0%	0.8	43	7.1%	6.9%	1.0	14
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	35.7%	27.8%	1.3	126	26.1%	25.2%	1.0	23
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	8.3%	14.0%	0.6	36	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	3.3%	12.7%	*	20	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	35.0%	12.4%	2.8	20	*	*	*	<10
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	171	0.0%	0.3%	0.0	46
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.4%	*	0	0.0%	8.8%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	5.4%	3.9%	1.4	1'065	3.7%	4.3%	0.9	267
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	420	0.0%	0.1%	0.0	77
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.9%	0.6%	3.0	52	0.0%	0.6%	0.0	16
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	3.8%	3.3%	1.1	132	4.5%	3.7%	1.2	44
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	9.5%	6.5%	1.5	347	5.9%	5.5%	1.1	85
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	15.8%	11.7%	1.3	114	6.7%	10.8%	0.6	45
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	310	0.0%	0.2%	0.0	64
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	8.0%	5.1%	1.6	548	5.1%	4.8%	1.1	156

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012				
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	
D Erkrankungen der Lunge									
D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)									
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	4.7%	3.5%	1.3	277	12.0%	4.0%	3.0	50	
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	9.1%	6.0%	1.5	66	26.1%	7.6%	3.4	23	
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	9.1%	2.7%	3.4	44	*	*	*	<10	
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	31	*	*	*	<10	
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	10	*	*	*	<10	
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	18.4%	27.7%	*	51	*	*	*	<10	
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	2.0%	4.5%	0.4	51	*	*	*	<10	
D.3 Lungenkrebs									
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	838	*	*	*	233	
D.4 Operationen an der Lunge									
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.5%	2.4%	1.0	241	2.6%	2.5%	1.0	77	
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	13.3%	10.9%	*	14	*	*	*	<10	
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	4.6%	0.0	14	*	*	*	<10	
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	3.3%	2.3%	1.4	91	3.1%	1.4%	2.3	32	
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)									
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)									
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.7%	0.3%	2.9	537	0.0%	0.2%	0.0	124	
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	90.9%	93.0%	*	488	91.1%	94.5%	*	113	
E.2 Hernienoperationen									
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.9	1'035	0.3%	0.1%	2.6	310	
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	7.7%	5.4%	1.4	13	*	*	*	<10	
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse									
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	240	*	*	*	69	
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	*	*	*	<10	
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	78	*	*	*	36	
E.4 Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)									
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	7.5%	5.0%	1.5	548	8.8%	4.8%	1.8	136	
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	6.9%	3.9%	1.8	116	0.0%	2.6%	0.0	28	
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	7.7%	10.7%	0.7	13	*	*	*	<10	
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.8%	2.9%	0.6	113	8.3%	4.1%	2.1	24	
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	84	4.3%	0.3%	13.0	23	
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	16.4%	9.2%	1.8	55	*	*	*	<10	
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	157	*	*	*	41	
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	15	*	*	*	0	
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	195	*	*	*	53	
E.5 Operationen am Magen									
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	48	*	*	*	20	
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	6.7%	4.9%	1.4	30	8.3%	3.1%	2.7	12	
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.6 Operationen am Ösophagus									
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	15.4%	6.6%	2.3	13	*	*	*	<10	
E.7 Operationen am Pankreas									
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	2.0%	6.1%	0.3	49	15.0%	6.0%	2.5	20	

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
F Operationen an Gefäßen								
F.1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	101	3.8%	0.6%	6.0	26
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	118	*	*	*	33
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	7.0%	3.7%	1.9	43	15.4%	3.9%	3.9	13
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	52	0.0%	1.9%	0.0	16
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	54.2%	47.1%	1.2	24	*	*	*	<10
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	210	*	*	*	72
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	3.3%	0.7%	4.4	61	0.0%	0.7%	0.0	17
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	6.0%	5.3%	1.1	50	9.1%	6.9%	1.3	22
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	0.0%	2.6%	0.0	14	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	16	0.0%	1.6%	0.0	10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	16	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	39	*	*	*	<10
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	6.1%	3.1%	1.9	66	3.8%	2.1%	1.9	26
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	15.6%	13.0%	1.2	32	*	*	*	<10
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	717	*	*	*	237
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	31	*	*	*	20
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	16	*	*	*	10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	3'453	*	*	*	877
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	6.0%	3.0%	*	137	6.0%	3.1%	*	33
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	29.5%	28.1%	*	676	19.5%	24.6%	*	107
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	33.6%	32.7%	*	1'161	37.5%	33.1%	*	329
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	98	*	*	*	27
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	10	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	17	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	41	*	*	*	10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	30	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	46	*	*	*	16
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	320	*	*	*	97
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	3'640	*	*	*	898
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	364	0.0%	0.0%	0.0	89
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	76.6%	72.5%	*	279	86.5%	74.5%	*	77
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	846	*	*	*	219

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	774	*	*	*	180
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	452	*	*	*	112
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	76.5%	68.3%	*	346	75.9%	72.0%	*	85
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	2.9%	1.6%	1.8	68	5.6%	2.8%	2.0	18
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	35.3%	23.1%	*	24	66.7%	26.1%	*	12
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	33.3%	24.5%	*	34	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	34	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'228	*	*	*	245
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	62.6%	43.3%	*	769	68.6%	46.0%	*	168
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	469	*	*	*	142
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	493	*	*	*	136
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	368	*	*	*	117
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	23.9%	5.5%	*	88	53.8%	12.4%	*	63
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	3.2%	1.9%	1.7	31	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.3%	0.2%	1.6	689	0.0%	0.2%	0.0	172
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	950	*	*	*	240
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	466	0.0%	0.0%	0.0	95
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.4%	0.2%	2.3	553	0.0%	0.1%	0.0	155
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.2%	1.2%	1.0	86	13.3%	2.5%	5.2	15
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	367	0.0%	0.1%	0.0	162
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	41	0.0%	0.1%	0.0	13
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	1'270	*	*	*	419
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	543	0.0%	0.0%	0.0	161
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.0%	3.5%	0.9	296	6.8%	4.7%	1.4	74
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	50	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	40	0.0%	1.3%	0.0	11
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	0.0%	2.3%	0.0	56	0.0%	3.9%	0.0	12
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	6.1%	3.3%	1.8	49	10.0%	3.4%	2.9	10
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	6.5%	5.4%	1.2	62	6.2%	5.3%	1.2	16
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	5.1%	8.9%	0.6	39	18.8%	10.4%	1.8	16
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	2.7%	3.9%	0.7	258	3.2%	3.3%	1.0	63
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	28.7%	26.6%	1.1	258	34.4%	27.1%	1.3	96
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	14.4%	15.0%	1.0	367	14.9%	12.4%	1.2	148