

Erklärende Bemerkungen des Spitalzentrum Biel

- A.2.1.M
 ① Die meisten Patienten sind notfallmässig eingetreten und wiesen häufig schwere oder chronische Comorbiditäten auf. Bei der Mehrheit der Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt resp. auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet.
- A.2.5.M
 ② Alle Patienten sind notfallmässig eingetreten und wiesen häufig schwere oder chronische Comorbiditäten auf. Bei der Mehrheit der Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt resp. auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet.
- A.3.4.M
 ③ Häufig wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt.
- B.1.4.M
 B.1.7.M
 D.1.5.M
 D.1.8.M
 ④ Die meisten Patienten sind notfallmässig eingetreten. Bei der Mehrheit der Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet, die Therapie abgebrochen resp. nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt.
- D.1.4.M
 ⑤ Der Eintritt erfolgte in beiden Fällen notfallmässig und mit schweren chronischen Leiden.
- D.2.1.M
 ⑥ Alle Patienten sind notfallmässig eingetreten. Bei allen Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet, die Therapie abgebrochen resp. nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt.
- D.4.1.M
 ⑦ Einer der Patienten trat notfallmässig ein. Bei beiden Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt.
- F.4.1.M
 ⑧ Einer der beiden Patienten trat notfallmässig ein. Beide Male handelte es sich um multitorbide Patienten mit Dialyse.
- H.4.1.M
 ⑨ Beide Patienten traten notfallmässig ein, es wurde auf Patienten-/Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt.
- I.3.1.M
 I.3.7.M
 ⑩ Alle Patienten sind notfallmässig eingetreten. Bei der Mehrheit der Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt resp. auf eine Reanimation verzichtet.
- I.3.8.M
 ⑪ Alle Patienten sind notfallmässig eingetreten und wiesen häufig schwere Comorbiditäten auf. Bei der Mehrheit der Patienten wurde auf Patienten- / Angehörigenwunsch nur noch eine Palliativtherapie durchgeführt resp. auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet.

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	9.0%	6.5%	1.4	951	4.9%	5.9%	0.8	223
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	29	0.0%	0.7%	0.0	15
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.5%	2.0%	1.7	343	2.5%	2.3%	1.1	79
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	8.8%	6.8%	1.3	464	4.8%	6.6%	0.7	104
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	28.7%	20.4%	1.4	115	16.0%	17.4%	0.9	25
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19)	69.2%	55.0%	*	658	79.8%	61.4%	*	178
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	12.3%	9.8%	1.3	651	6.2%	7.7%	0.8	161
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.1%	3.4%	0.9	196	3.0%	4.3%	0.7	33
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	4.5%	4.6%	*	43	*	*	*	3
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	9.4%	7.2%	1.3	458	4.3%	6.8%	0.6	92
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	5.4%	4.4%	1.2	448	4.0%	4.4%	0.9	126
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	11.7%	8.8%	1.3	899	13.7%	8.3%	1.7	211
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	4
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	5.6%	3.3%	1.7	89	0.0%	3.5%	0.0	16
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	9.2%	7.6%	1.2	499	9.0%	6.8%	1.3	111
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	17.8%	12.6%	1.4	303	23.8%	11.8%	2.0	80
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	55.6%	40.3%	*	165	61.5%	52.7%	*	59
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	1'666	*	*	*	336
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.8%	3.3%	1.1	658	1.1%	3.3%	0.3	178
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.6%	1.0%	1.7	608	5.4%	1.5%	3.6	112
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.5%	1.1%	0.5	382	4.7%	1.5%	3.2	43
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	38.0%	38.7%	*	382	27.4%	38.5%	*	43
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	1	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	520	*	*	*	122
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	282	*	*	*	42
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	6	*	*	*	3
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	6	*	*	*	3
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	–	*	*	*	–
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	13.6%	12.2%	1.1	888	16.5%	11.7%	1.4	230
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	35	0.0%	4.0%	0.0	10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	7.6%	5.6%	1.4	158	7.7%	5.3%	1.4	39
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	12.0%	11.0%	1.1	493	16.5%	10.4%	1.6	121
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	24.8%	21.6%	1.1	202	25.0%	19.7%	1.3	60
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	10.9%	*	0	0.0%	24.1%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	10.1%	8.2%	1.2	605	13.4%	8.0%	1.7	164
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	10.3%	8.2%	1.3	484	14.3%	7.7%	1.9	126
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), nur Zuverlegungen, Mortalität	9.1%	8.9%	1.0	121	10.5%	9.0%	1.2	38
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	0.0%	9.9%	0.0	13	38.5%	10.1%	3.8	13
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	2.1%	2.1%	*	13	7.9%	8.7%	*	13
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	31.5%	28.0%	1.1	149	28.3%	30.3%	0.9	46
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	4.3%	14.9%	0.3	46	27.3%	22.2%	1.2	11
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	12.5%	14.0%	0.9	88	*	*	*	9
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	9.9%	11.6%	*	88	*	*	*	9
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.5%	0.3%	1.8	196	0.0%	0.4%	0.0	38
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	*	*	*	1	0.0%	13.8%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	721	*	*	*	1
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	37.6%	44.6%	*	271	0.0%	73.4%	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	65.1	*	*	271	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.8%	4.6%	1.5	939	6.7%	4.8%	1.4	252
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.4%	0.3%	1.6	236	0.0%	0.2%	0.0	43
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	71	0.0%	0.7%	0.0	17
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	3.2%	3.2%	1.0	156	6.1%	2.7%	2.2	33
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	9.9%	6.5%	1.5	343	9.7%	5.9%	1.6	103
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	18.0%	11.4%	1.6	133	8.9%	8.5%	1.0	56
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.5%	0.3%	1.6	205	0.0%	0.2%	0.0	38
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	8.7%	4.9%	1.8	585	8.6%	4.5%	1.9	162

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	6.2%	3.7%	1.7	388	5.6%	3.4%	1.7	89
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	10.2%	7.5%	1.3	118	5.1%	4.9%	1.1	39
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	3.9%	2.8%	1.4	76	0.0%	3.2%	0.0	22
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	37	*	*	*	7
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	0
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	7.1%	3.7%	1.9	84	14.3%	4.1%	3.5	21
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	21.6%	27.9%	*	84	23.6%	26.7%	*	21
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	529	*	*	*	135
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	4.0%	2.5%	1.6	99	6.1%	2.7%	2.2	33
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	5	0.0%	6.6%	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	2.6%	2.3%	1.2	38	6.2%	2.6%	2.4	16
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	0.0%	3.3%	*	0	0.0%	5.9%	*	0
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	11.3%	5.5%	2.1	53	10.0%	11.9%	0.8	10
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.6%	0.4%	1.6	702	0.0%	0.2%	0.0	124
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	85.5%	93.3%	*	600	96.0%	95.2%	*	119
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.7	1'017	0.5%	0.1%	3.8	198
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	9.7%	6.7%	1.4	31	*	*	*	2
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	*	*	*	5	0.0%	22.3%	*	0
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	90.5%	88.8%	*	630	91.9%	92.6%	*	114
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	123	*	*	*	29
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	3	0.0%	0.8%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen bei kolorektalem Karzinom (als HD oder ND)	*	*	*	638	*	*	*	138
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn	*	*	*	219	*	*	*	65
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	8.5%	5.6%	1.5	650	8.0%	6.5%	1.2	88
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	6.6%	4.4%	1.5	121	0.0%	4.3%	0.0	10
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	13.0%	10.9%	1.2	23	*	*	*	4
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	7.4%	3.2%	2.3	121	0.0%	6.2%	0.0	16
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	2.6%	0.6%	4.0	117	*	*	*	8
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	9.6%	7.5%	1.3	94	0.0%	6.1%	0.0	13
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	42.9%	37.5%	1.1	14	*	*	*	6
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	10	*	*	*	3
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	150	*	*	*	29
E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	6	0.0%	3.1%	*	0
E.5 Operationen am Magen								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen bei Magenkarzinom	*	*	*	122	*	*	*	20
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	5.5%	4.9%	1.1	201	0.0%	4.9%	0.0	32
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	68	*	*	*	12
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	4.9%	0.0	19	*	*	*	3
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	17.6%	6.9%	2.6	17	*	*	*	4

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	15.8%	5.3%	3.0	19	*	*	*	4
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	3.7%	6.1%	0.6	27	*	*	*	1
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	4.3%	0.8%	5.8	69	*	*	*	6
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	77	*	*	*	6
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	11.1%	4.9%	2.3	54	*	*	*	4
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	42.1%	41.8%	1.0	38	*	*	*	4
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	102	*	*	*	22
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	24	0.0%	0.5%	0.0	10
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	2
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	4
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	13.6%	8.2%	1.7	22	*	*	*	2
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	2
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	0
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	9	*	*	*	1
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	22	*	*	*	1
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	8.8%	3.0%	2.9	80	8.0%	3.7%	2.2	25
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	22.2%	14.0%	1.6	54	*	*	*	4
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	265	*	*	*	61
F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio	*	*	*	69	*	*	*	26
F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz	*	*	*	14	*	*	*	1
F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän	*	*	*	33	*	*	*	3
F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta	*	*	*	149	*	*	*	31
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	23	*	*	*	6
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	7	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	4'766	*	*	*	1'055
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	4.6%	3.0%	*	172	3.2%	3.0%	*	25
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	18.5%	27.4%	*	695	9.5%	22.9%	*	75
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	21.2%	32.8%	*	1'010	25.0%	33.0%	*	264
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	13	*	*	*	3
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	1	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	2	*	*	*	1
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	6	*	*	*	2
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	1	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	4	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	14	*	*	*	3
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	374	*	*	*	69
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	4'950	*	*	*	1'091
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	450	0.0%	0.0%	0.0	78
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	62.2%	72.9%	*	280	73.1%	75.8%	*	57
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	7.4%	8.4%	*	11	*	*	*	4
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	18.1%	23.4%	*	36	*	*	*	3
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	676	*	*	*	159
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	589	*	*	*	106
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	349	*	*	*	76
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	65.9%	69.1%	*	230	80.3%	73.6%	*	61
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	55	0.0%	2.7%	0.0	13
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	*	*	*	5	0.0%	24.0%	*	0
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	19	*	*	*	2
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	23.7%	*	0	0.0%	39.3%	*	0
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor	27.1%	32.7%	*	13	*	*	*	2
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	450	*	*	*	109
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	39.1%	43.9%	*	176	33.9%	48.1%	*	37
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	300	*	*	*	93
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	340	*	*	*	101
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	255	*	*	*	81
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	24.7%	7.0%	*	63	21.0%	12.2%	*	17
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	2
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.2%	0.3%	0.8	463	1.7%	0.2%	7.4	115
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	621	*	*	*	185
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	66	0.0%	0.1%	0.0	19

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.1.M Hüft-Endoprothese-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.3%	0.2%	1.4	679	0.9%	0.3%	2.9	106
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.1%	1.3%	0.8	93	4.5%	2.5%	1.9	22
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	237	0.0%	0.1%	0.0	100
I.1.6.M Unikondyläre Schlittenprothese des Kniegelenks, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	60	0.0%	0.0%	*	18
I.1.4.M Knie-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.1%	0.3%	4.3	88	0.0%	0.5%	0.0	18
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
I.1.7.M Hüft- oder Knie-TEP bei anderer Indikation oder Alter < 20, Mortalität	6.0%	4.9%	1.2	317	9.8%	5.2%	1.9	61
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	45	*	*	*	128
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	15	0.0%	0.0%	0.0	30
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	5.5%	4.6%	1.2	415	8.0%	4.6%	1.7	88
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	3.4%	0.6%	6.1	29	*	*	*	2
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	5.4%	1.6%	3.3	37	0.0%	1.0%	0.0	10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	4.7%	2.7%	1.7	64	0.0%	1.7%	0.0	14
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	6.2%	3.7%	1.7	113	0.0%	4.3%	0.0	20
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	3.9%	5.6%	0.7	102	10.3%	5.2%	2.0	29
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	8.6%	9.2%	0.9	70	30.8%	10.2%	3.0	13
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	4.7%	4.1%	1.1	407	6.8%	3.8%	1.8	73
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	33.2%	25.7%	1.3	395	29.9%	26.4%	1.1	107
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	139.5	*	*	395	141.2	*	*	107
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	39.6%	43.1%	*	40	45.5%	43.3%	*	15
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	13.7%	16.4%	0.8	650	11.8%	13.4%	0.9	203
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen bei Melanom (als HD oder ND)	*	*	*	34	*	*	*	3
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	32	*	*	*	4
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	1	*	*	*	1
L Transplantationen								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2012				2013			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Transplantationen								
L.4 Pankrestransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	...	*	*	*	...
L.6.5.F Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	...	*	*	*	...
L.6.6.F Autogene Stammzelltherapie	*	*	*	-	*	*	*	-
L.6.7.F Allogene Stammzelltherapie	*	*	*	-	*	*	*	-

Krankheitsgruppen	2012		2013	
	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl
Z Zusatzinformationen				
Z.1 Aufenthaltsdauer				
A.1.1.X HD Herzinfarkt (Alter >19), Aufenthaltsdauer	6.2	951	6.4	223
B.1.7.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Aufenthaltsdauer	12.7	605	11.8	164
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	5.0	702	4.5	124
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.8	1'017	2.8	198
F.1.1.X Extrakranielle Gefäss-OP, Aufenthaltsdauer	8.7	69	*	6
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	6.3	450	5.4	78
H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer	5.4	463	4.9	115
I.1.1.X Hüft-Endoprothese-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Aufenthaltsdauer	9.1	679	10.6	106
I.1.3.X Knie-TEP-Erstimplantation, Aufenthaltsdauer	8.7	237	9.4	100
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	1.7	1'016	1.7	170