

Erklärende Bemerkungen des Kantonsspitals Winterthur

- A.1.2.M
 ① Der notfallmässig eingelieferte Patient ist an einer Überdosis Kokain und dadurch verursachtem Infarkt verstorben.
- A.2.3.M
 ② Beide Patienten haben auf therapeutische Massnahmen verzichtet und sind an ihren Nebendiagnosen (Niereninsuffizienz, Demenz) verstorben.
- A.3.2.M
 ③ Durchschnittlich 70-jährig – sind viele der Patienten in einer überdurchschnittlich schlechten Verfassung via Rettungsdienst eingeliefert worden.
- D.1.1.M
 D.1.5.M
 D.1.6.M
 D.1.12.M
 D.2.1.M
 ④ Die Fälle wurden im Detail mit interdisziplinären Teams besprochen. Bei der Mehrheit der Patienten wurde im Verlauf des Aufenthaltes dem Patienten- / Angehörigenwunsch auf eine Palliativtherapie entsprochen.
- D.1.8.M
 ⑤ Das Durchschnittsalter der Patienten lag deutlich über 80 Jahren. Bei der Mehrheit der Patienten wurde aufgrund ausgeprägter Begleiterkrankungen im Verlauf des Aufenthaltes dem Patienten- / Angehörigenwunsch auf eine Palliativtherapie entsprochen.
- D.2.2.M
 D.2.3.M
 D.2.6.M
 ⑥ Die Fälle wurden im Detail mit interdisziplinären Teams besprochen. Im Verlauf des Aufenthaltes wurde dem Patienten- / Angehörigenwunsch auf eine Palliativtherapie entsprochen.
- E.1.1.M
 ⑦ Der Patient wurde als Notfall eingeliefert und ist aufgrund seiner Nebendiagnose (Septischer Schock) verstorben.
- E.4.1.M
 ⑧ Hohes Durchschnittsalter der Patienten sowie häufiger Wunsch auf Verzicht von lebensverlängernden Massnahmen aufgrund multipler und langjähriger Begleiterkrankungen.
- E.4.4.M
 ⑨ Die drei Patienten hatten ein hohes Durchschnittsalter und sind schlussendlich an den Folgen der Nebendiagnosen (fortgeschrittene Krebserkrankungen, Nierenversagen etc.) verstorben.
- E.7.1.M
 ⑩ Alle 3 Patienten litten an einem Karzinom mit bereits weit fortgeschrittener Metastasierung im Körper.
- F.3.1.M
 ⑪ Alle 6 Patienten verfügten über lange Krankheitsgeschichten und sich negativ auswirkende Begleiterkrankungen (Niereninsuffizienz, Polytrauma, Pankreatitis, Schlaganfall, Sepsis, Herzinfarkt etc.). In der Hälfte der Fälle äusserten die Patienten-/Angehörige den Wunsch nach Palliativecare und Verzicht auf lebenserhaltende Massnahmen.
- H.1.1.M
 ⑫ Die zwei Patienten sind jeweils an ihren Nebendiagnosen verstorben (ARDS, Sepsis).
- H.3.5.M
 ⑬ Einer der zwei Patienten ist nach erfolgreicher Operation an einem Schlaganfall verstorben.
- H.4.1.M
 ⑭ Codierfehler, es ist kein Patient verstorben.
- I.2.6.M
 ⑮ Schwerer Polytraumapatient wurde von extern (Spital) zu uns verlegt und ist an seinem schweren Trauma verstorben. Als eines von 12 Polytrauma-Zentren in der Schweiz, betreut das Kantonsspital Winterthur hochkomplexe Patienten in kritischem Zustand.
- I.2.13.M
 ⑯ Der Patient wurde erfolgreich operiert und ist danach an einem Herzinfarkt sowie einer Sepsis verstorben.
- I.2.14.M
 ⑰ Zwei der drei Patienten wiesen Frakturen aufgrund starker Metastasierungen im Körper auf und alle drei Patienten haben sich mit den Angehörigen darauf geeinigt, auf weitere lebenserhaltende Massnahmen zu verzichten.
- J.1.1.M
 J.1.4.M
 ⑱ Als Polytrauma-Zentrum erhält das Kantonsspital Winterthur hochkomplexe Direktaufnahmen sowie Zuweisungen von umliegenden Spitälern in kritischer Verfassung bei denen eine Beatmung notwendig ist.

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	7.3%	5.2%	1.4	1'501	6.4%	5.2%	1.2	405
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	1.5%	1.2%	1.3	68	7.7%	1.3%	5.8	13
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.2%	1.9%	1.7	558	1.4%	1.7%	0.8	142
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	8.0%	5.8%	1.4	726	5.9%	5.2%	1.1	202
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	21.5%	17.0%	1.3	149	22.9%	16.8%	1.4	48
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19)	76.3%	58.8%	*	1'146	79.3%	62.9%	*	321
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	8.0%	7.4%	1.1	1'329	7.2%	7.1%	1.0	345
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	7.0%	2.7%	2.6	43	4.0%	2.7%	1.5	25
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.5%	2.8%	*	23	*	*	*	1
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	9.4%	5.7%	1.6	660	9.6%	7.4%	1.3	167
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	4.2%	3.7%	1.1	809	3.9%	3.2%	1.2	233
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	12.5%	8.8%	1.4	1'373	10.0%	8.9%	1.1	299
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	3
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	2.9%	3.6%	0.8	104	13.3%	3.3%	4.1	15
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	10.8%	7.2%	1.5	756	10.5%	7.4%	1.4	171
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	17.3%	12.2%	1.4	504	9.1%	12.1%	0.8	110
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	71.4%	50.4%	*	540	57.5%	55.2%	*	88
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	3'099	*	*	*	693
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.9%	3.0%	1.0	1'146	4.4%	2.7%	1.6	318
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.8%	1.1%	0.7	1'258	0.4%	1.3%	0.3	236
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.7%	0.8%	0.9	1'206	0.5%	1.2%	0.4	214
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.8%	1.1%	0.7	654	1.5%	0.8%	1.8	131
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	33.6%	38.5%	*	654	35.6%	38.5%	*	131
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.6%	1.0	638	1.6%	0.6%	2.8	125
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	1
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	913	*	*	*	271
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	555	*	*	*	154
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	59	*	*	*	34
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	1	*	*	*	56
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	1	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	14	*	*	*	15
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	14	*	*	*	15
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	15.7%	10.5%	1.5	1'270	9.7%	9.1%	1.1	320
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.8%	0.0	44	*	*	*	8
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	5.6%	5.2%	1.1	233	2.7%	4.2%	0.6	74
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	15.2%	9.7%	1.6	748	10.9%	8.8%	1.2	175
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	29.4%	19.2%	1.5	245	15.9%	16.4%	1.0	63
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	4.9%	19.7%	*	62	37.5%	35.7%	*	120
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	11.0%	6.7%	1.6	930	4.7%	6.4%	0.7	256
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	10.8%	6.7%	1.6	899	4.9%	6.3%	0.8	247
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), nur Zuverlegungen, Mortalität	16.1%	6.4%	2.5	31	*	*	*	9
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	9.5%	8.1%	1.2	21	*	*	*	3
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	2.3%	5.5%	*	21	*	*	*	3
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	40.3%	24.6%	1.6	77	30.0%	24.9%	1.2	10
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	8.3%	8.4%	*	77	3.9%	8.2%	*	10
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	36.8%	27.3%	1.3	190	38.3%	24.1%	1.6	47
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	12.1%	16.0%	0.8	66	0.0%	13.4%	0.0	12
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	22.6%	13.5%	1.7	84	*	*	*	5
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	6.6%	8.6%	*	84	*	*	*	5

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	273	0.0%	0.1%	0.0	57
<i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>	*	*	*	9	50.9%	26.9%	*	29
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
<i>B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</i>	*	*	*	123	*	*	*	13
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	5.3%	2.1%	2.5	38	*	*	*	3
B.4 Epilepsie								
<i>B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)</i>	*	*	*	356	*	*	*	90
<i>B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)</i>	*	*	*	84	*	*	*	24
B.5 Multiple Sklerose								
<i>B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose</i>	*	*	*	47	*	*	*	6
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
<i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>	*	*	*	348	*	*	*	145
<i>C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index</i>	0.0%	62.0%	*	0	0.0%	71.2%	*	0
<i>C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.2%	3.4%	1.2	2'322	6.7%	3.7%	1.8	465
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.1%	0.2%	0.7	875	0.0%	0.2%	0.0	122
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.3%	0.7%	1.9	159	0.0%	0.6%	0.0	39
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.3%	2.7%	1.6	278	1.6%	2.3%	0.7	63
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	6.9%	5.7%	1.2	759	8.8%	4.9%	1.8	171
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	12.0%	9.9%	1.2	251	21.4%	9.6%	2.2	70
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.2%	0.2%	0.8	663	0.0%	0.1%	0.0	77
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.7%	4.1%	1.4	1'233	6.6%	4.0%	1.6	288
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.3%	0.4%	2.9	154	0.0%	0.5%	0.0	38
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	2.2%	1.3%	1.7	223	0.0%	0.9%	0.0	49
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.9%	4.2%	1.4	624	5.0%	3.7%	1.4	139
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	11.2%	9.2%	1.2	232	19.4%	9.5%	2.0	62
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	5.0%	3.4%	1.4	585	7.0%	3.6%	2.0	129
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	6.2%	5.8%	1.1	130	10.3%	5.9%	1.8	29
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	5.0%	2.6%	1.9	161	8.1%	2.2%	3.7	37
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	2.0%	1.4%	1.5	98	0.0%	1.9%	0.0	22
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	9.1%	2.4%	3.8	33	*	*	*	7
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	4.9%	3.2%	1.5	163	8.8%	3.2%	2.7	34
<i>D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)</i>	27.9%	30.4%	*	163	26.4%	24.1%	*	34
D.3 Lungenkrebs								
<i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs</i>	*	*	*	1'249	*	*	*	274
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	0.9%	2.4%	0.4	336	1.0%	1.8%	0.5	103
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	7.3%	0.0	15	*	*	*	3
<i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>	7.9%	8.3%	*	15	*	*	*	3
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.1%	2.1%	0.5	174	1.7%	1.1%	1.5	58
<i>D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom</i>	10.6%	5.2%	*	20	*	*	*	5
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	3.0%	6.4%	0.5	100	0.0%	5.4%	0.0	18

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.3%	0.2%	1.9	1'544	0.3%	0.1%	2.7	337
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	92.5%	94.4%	*	1'428	93.5%	95.8%	*	315
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	1.5	2'999	0.0%	0.1%	0.0	652
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	8.9%	5.7%	1.6	56	*	*	*	7
<i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>	28.1%	23.5%	*	27	*	*	*	9
<i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19</i>	96.9%	91.9%	*	2'084	95.4%	94.8%	*	432
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	330	*	*	*	56
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	4	0.0%	0.6%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	342	*	*	*	60
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
<i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	650	*	*	*	196
<i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>	*	*	*	497	*	*	*	101
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	6.5%	4.5%	1.4	1'136	5.3%	4.7%	1.1	227
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	10.2%	3.9%	2.6	167	5.6%	3.3%	1.7	36
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	25.0%	9.9%	2.5	20	*	*	*	4
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.3%	2.5%	1.7	254	4.5%	2.8%	1.6	67
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.3%	0.4%	0.7	309	0.0%	0.1%	0.0	44
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	9.7%	5.2%	1.8	93	5.9%	4.6%	1.3	17
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	42.1%	42.0%	1.0	19	*	*	*	5
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	5.9%	4.3%	1.4	34	0.0%	1.5%	0.0	13
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	8.8%	5.6%	1.6	240	9.8%	8.0%	1.2	41
<i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>	3.2%	2.9%	*	14	*	*	*	1
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	1	25.0%	11.6%	2.2	12
<i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz</i>	*	*	*	1	6.6%	6.0%	*	12
E.5 Erkrankungen des Magens								
<i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>	*	*	*	208	*	*	*	44
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	6.6%	4.0%	1.6	318	1.7%	4.5%	0.4	60
<i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>	*	*	*	107	*	*	*	21
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	13.9%	4.0%	3.5	36	0.0%	5.6%	0.0	11
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	15.9%	8.7%	1.8	44	*	*	*	4
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	40.7%	14.2%	2.9	27	*	*	*	6
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	16.0%	8.1%	2.0	50	*	*	*	7
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.7%	7.2%	1.5	121	8.6%	6.2%	1.4	35
E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität	8.6%	7.2%	1.2	70	5.6%	5.9%	0.9	18
E.8 Bariatrische Chirurgie								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	144	0.0%	0.5%	0.0	35
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	0.0%	4.9%	0.0	49	0.0%	3.5%	0.0	12
<i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
<i>F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen</i>	*	*	*	1	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	192	*	*	*	65
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	190	*	*	*	65
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	9.3%	3.8%	2.4	75	8.7%	3.3%	2.6	23
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	1.3%	1.6%	0.8	76	0.0%	0.6%	0.0	32
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	3
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	7.1%	1.3%	5.7	14	*	*	*	1
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	7	*	*	*	0
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	52.3%	41.7%	1.3	44	*	*	*	9
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	44.4%	23.1%	1.9	18	*	*	*	6
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	3.1%	4.0%	0.8	414	4.8%	3.5%	1.4	125
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I-II), Mortalität	1.5%	0.7%	2.1	133	6.1%	0.9%	7.1	33
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	6.2%	1.1%	5.5	16	*	*	*	7
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	8.7%	5.5%	1.6	46	0.0%	4.6%	0.0	15
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	1.3%	4.9%	0.3	78	7.7%	4.7%	1.6	13
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	4.2%	4.9%	0.9	24	5.9%	3.4%	1.7	17
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	54	0.0%	0.3%	0.0	23
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	23	*	*	*	6
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	40	*	*	*	11
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	3.4%	3.4%	1.0	384	1.5%	3.2%	0.5	68
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	8.3%	11.8%	0.7	36	13.3%	12.7%	1.0	15
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	1'669	*	*	*	369
F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio	*	*	*	647	*	*	*	104
F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz	*	*	*	38	*	*	*	6
F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän	*	*	*	275	*	*	*	60
F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta	*	*	*	709	*	*	*	199
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	100	*	*	*	35
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	54	*	*	*	23
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	69	*	*	*	11

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	8'232	*	*	*	1'764
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.1%	3.1%	*	178	2.6%	2.9%	*	31
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	14.1%	24.6%	*	806	12.6%	20.0%	*	150
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	30.8%	33.0%	*	2'534	32.3%	33.1%	*	569
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	24.8%	27.8%	*	1'785	26.3%	27.8%	*	405
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	22.9%	25.0%	*	1'265	23.4%	25.0%	*	271
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	31.0%	35.9%	*	520	35.2%	35.6%	*	134
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	73	*	*	*	20
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	9	*	*	*	5
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	21	*	*	*	3
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	16	*	*	*	2
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	13	*	*	*	2
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	23	*	*	*	13
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	41	*	*	*	13
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	657	*	*	*	160
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	8'624	*	*	*	1'819
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	852	0.0%	0.1%	0.0	166
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	82.9%	75.0%	*	705	83.7%	80.2%	*	139
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	6.3%	11.0%	*	23	*	*	*	5
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	12.8%	27.7%	*	43	16.5%	33.4%	*	14
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	884	*	*	*	230
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	1'419	*	*	*	361
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	117	*	*	*	29
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariectomie, Mortalität	1.5%	1.5%	1.0	66	0.0%	0.4%	0.0	14
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	363	*	*	*	87
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	118	0.0%	0.4%	0.0	28
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'082	*	*	*	290
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	691	*	*	*	157
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	65.1%	72.2%	*	450	72.0%	76.1%	*	113
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	1.6%	1.5%	1.1	127	8.3%	1.8%	4.5	24
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	34.6%	22.1%	*	44	*	*	*	3
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	56	0.0%	0.2%	0.0	11
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	75.0%	32.1%	*	42	90.9%	44.7%	*	10
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor	36.3%	36.6%	*	37	*	*	*	7
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'507	*	*	*	372
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	53.4%	45.8%	*	805	59.4%	47.7%	*	221

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	873	*	*	*	186
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	862	*	*	*	154
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	671	*	*	*	119
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	22.5%	10.9%	*	151	35.3%	13.4%	*	42
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	7.0%	4.0%	1.7	71	9.5%	3.4%	2.8	21
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	3
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.2%	0.2%	0.8	1'187	0.4%	0.2%	2.5	246
H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen	2.6%	1.8%	*	31	*	*	*	4
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F HD Prostatakarzinom	*	*	*	891	*	*	*	177
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.2%	0.1%	1.8	491	0.0%	0.3%	0.0	75
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.1%	0.1%	1.5	1'453	0.0%	0.1%	0.0	432
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und petrochantärer Fraktur, Mortalität	7.6%	2.7%	2.8	66	2.9%	3.8%	0.8	68
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	1.9%	0.0	63	4.8%	2.9%	1.6	42
I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	8	*	*	*	4
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	0.0%	0.5%	0.0	33
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	0.0%	1.9%	0.0	11
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	531	0.0%	0.1%	0.0	279
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	26	0.0%	0.3%	0.0	24
I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	4	*	*	*	2
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	0.0%	0.4%	0.0	18
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	3
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	3.2%	2.9%	1.1	31	0.0%	4.5%	0.0	13
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	3'323	*	*	*	743
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	224	*	*	*	52
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	3.0%	0.0	10	*	*	*	5
I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität	3.9%	1.6%	2.4	76	6.2%	1.0%	6.4	16
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.1%	0.2%	0.9	707	0.0%	0.2%	0.0	179
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.1%	0.1%	1.5	1'098	0.0%	0.1%	0.0	247
I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	292	0.0%	0.1%	0.0	134
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.4%	0.5%	0.7	270	1.4%	0.6%	2.5	70
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	2.1%	1.2%	1.7	873	3.2%	1.7%	1.8	95
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	2	0.0%	0.5%	*	0
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	531	*	*	*	121
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	1'277	*	*	*	210
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	7.0%	4.0%	1.7	556	2.9%	3.7%	0.8	104
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	1.8%	0.5%	3.5	56	0.0%	0.2%	0.0	12
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	1.6%	1.2%	1.4	61	*	*	*	8
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	2.5%	2.2%	1.1	120	4.3%	2.7%	1.6	23
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	5.2%	3.7%	1.4	116	0.0%	4.3%	0.0	20
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	15.2%	5.5%	2.8	112	4.3%	5.7%	0.8	23
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	12.1%	9.2%	1.3	91	5.6%	5.4%	1.0	18
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	6.4%	3.7%	1.7	561	5.2%	3.7%	1.4	135
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	126	*	*	*	20
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	30.3%	25.7%	1.2	1'179	30.3%	26.0%	1.2	238
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	31.3%	26.1%	1.2	1'058	31.8%	26.3%	1.2	201
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	278.7	*	*	1'179	246.1	*	*	238
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	43.0%	43.0%	*	131	38.8%	43.2%	*	19
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	17.1%	15.1%	1.1	1'097	46.2%	22.8%	2.0	130
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	40.1%	28.4%	1.4	327	46.8%	23.6%	2.0	124
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	7.4%	6.9%	1.1	770	*	*	*	6
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	23.1%	20.6%	1.1	908	12.7%	11.2%	1.1	424
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	52.7%	41.6%	1.3	258	56.0%	37.9%	1.5	50
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	81	*	*	*	20
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	61	*	*	*	15
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	6	*	*	*	6

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
L Transplantationen								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.4 Pankreastreansplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	–	*	*	*	–
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	–	*	*	*	–
L.6.6.F Autogene Stammzelltherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.7.F Allogene Stammzelltherapie	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2010–2014		2015	
	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl
Z Zusatzinformationen				
Z.1 Aufenthaltsdauer				
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.7	1'499	5.5	405
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	9.1	921	7.0	250
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.3	1'544	4.4	337
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.6	2'999	2.4	652
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.9	144	7.0	35
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	5.2	852	5.2	166
H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer	5.8	1'187	5.7	246
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.0	1'451	5.7	430
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.3	531	5.7	279
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	3.4	198	1.8	39