

Commentaires explicatifs du CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

A.1.1.M

- ① On retrouve dans ce même groupe des patients qui décèdent en salle de déchocage peu après leur admission et ceux décédés au cours de leur hospitalisation. Il est important de pouvoir distinguer ces deux types de situation pour évaluer la qualité des soins dans le domaine des maladies cardiaques en particulier. En effet, le centre d'urgences d'un hôpital universitaire accueille de nombreux patients en arrêt cardio-respiratoire pouvant décéder à leur entrée dans une ultime tentative de réanimation.

B.1.1.M

- ② Il a été montré dans les études multicentriques que les traitements de recanalisation ne réduisent pas la mortalité mais le handicap. De plus, lors d'un AVC massif, c'est un projet de soins palliatifs qui est souvent décidé et qui vise à accompagner le patient jusqu'à son décès sans avoir à le transférer dans une autre structure hospitalière. L'évaluation de la mortalité requiert dès lors une analyse différenciée de ces différentes situations.

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.4%	5.9%	0.8	3'458	5.1%	4.8%	1.1	622
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	2.3%	1.2%	2.0	172	0.0%	1.2%	0.0	34
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.5%	1.8%	0.8	1'261	1.7%	1.6%	1.0	237
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	4.5%	6.2%	0.7	1'570	7.8%	4.8%	1.6	270
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	13.0%	17.9%	0.7	455	8.6%	15.5%	0.6	81
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19)	85.7%	58.8%	*	2'963	85.7%	62.9%	*	533
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	7.5%	8.4%	0.9	1'740	7.3%	6.6%	1.1	331
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.0%	3.4%	0.6	1'164	3.8%	3.3%	1.2	213
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.4%	2.8%	*	47	3.7%	1.9%	*	23
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.0%	6.6%	0.9	1'598	6.7%	6.3%	1.1	299
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.3%	4.3%	0.5	1'797	3.4%	3.2%	1.0	298
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	7.1%	8.5%	0.8	2'818	6.3%	8.6%	0.7	617
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	6.4%	3.2%	2.0	47	0.0%	1.6%	0.0	12
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	3.4%	3.4%	1.0	384	1.3%	3.1%	0.4	76
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	5.6%	7.1%	0.8	1'354	5.3%	7.0%	0.8	285
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	10.6%	12.5%	0.8	1'033	9.4%	12.5%	0.8	244
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	36.8%	50.4%	*	386	42.9%	55.2%	*	96
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	7'363	*	*	*	1'387
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.3%	3.4%	0.7	2'776	3.7%	2.7%	1.4	483
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.2%	1.2%	1.9	2'571	1.9%	1.3%	1.5	465
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.9%	0.9%	2.2	2'165	2.0%	1.2%	1.8	395
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.1%	1.2%	2.6	1'288	0.4%	1.0%	0.4	256
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	33.0%	38.5%	*	1'288	34.9%	38.5%	*	256
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.7%	0.7%	2.5	1'107	0.0%	0.7%	0.0	228
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	196	*	*	*	28
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	2'639	*	*	*	516
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	1'093	*	*	*	194
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	396	*	*	*	62
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	986	*	*	*	213
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	260	*	*	*	29

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	3'043	*	*	*	586
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	1'497	*	*	*	288
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	1'025	*	*	*	164
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	1'233	*	*	*	262
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	631	*	*	*	119
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	484	*	*	*	101
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	3.1%	2.2%	1.4	385	7.3%	2.4%	3.0	55
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität	0.0%	8.4%	0.0	10	*	*	*	3
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität	3.2%	2.0%	1.6	375	7.7%	2.4%	3.2	52
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	9.6%	5.3%	1.8	157	10.4%	3.4%	3.1	48
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	8.0%	5.5%	1.5	112	8.3%	3.8%	2.2	36
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	8.3%	10.4%	0.8	24	*	*	*	8
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	2.4%	1.6%	1.5	42	7.1%	3.9%	1.8	14
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.2%	4.1%	0.3	160	0.0%	3.0%	0.0	29
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.3%	1.3%	1.9	600	1.2%	1.1%	1.1	83
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	2.4%	0.8%	3.0	42	*	*	*	2
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	118	0.0%	0.9%	0.0	13
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	1.5%	0.8%	1.8	203	3.3%	0.8%	4.2	30
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	4.3%	1.6%	2.7	185	0.0%	1.3%	0.0	36
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	3.8%	3.4%	1.1	52	*	*	*	2
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	52.7%	13.7%	*	316	26.5%	8.9%	*	22
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen	0.0%	0.4%	*	0	0.0%	0.1%	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	3	*	*	*	1
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	11.0%	9.7%	1.1	3'409	9.7%	9.3%	1.0	702
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	5.2%	4.0%	1.3	250	4.5%	4.2%	1.1	44
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	7.8%	5.1%	1.5	959	7.6%	4.2%	1.8	144
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	11.3%	9.5%	1.2	1'600	9.0%	8.8%	1.0	367
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	17.5%	19.9%	0.9	600	15.0%	16.8%	0.9	147
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	47.6%	19.7%	*	1'622	50.0%	35.7%	*	351
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	6.2%	6.6%	0.9	2'584	6.1%	6.3%	1.0	570
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	6.4%	6.8%	0.9	2'120	6.3%	6.5%	1.0	447
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), nur Zuverlegungen, Mortalität	5.4%	5.7%	1.0	464	5.7%	5.9%	1.0	123
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	9.6%	9.3%	1.0	249	7.5%	10.7%	0.7	93
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	9.6%	5.5%	*	249	16.3%	9.7%	*	93
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	22.7%	23.0%	1.0	216	14.1%	21.7%	0.6	64
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	8.4%	8.4%	*	216	11.2%	8.2%	*	64
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	27.5%	23.8%	1.2	517	24.7%	25.5%	1.0	89
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	25.5%	14.4%	1.8	271	25.6%	15.2%	1.7	43
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	8.1%	8.5%	1.0	37	*	*	*	0
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	1.1%	8.6%	*	37	0.0%	5.2%	*	0

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.2%	0.3%	0.6	649	0.7%	0.2%	4.2	138
<i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>	23.6%	8.9%	*	153	40.6%	26.9%	*	56
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
<i>B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</i>	*	*	*	734	*	*	*	171
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	1.8%	2.0%	0.9	166	0.0%	1.4%	0.0	41
B.4 Epilepsie								
<i>B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)</i>	*	*	*	1'098	*	*	*	224
<i>B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)</i>	*	*	*	516	*	*	*	132
B.5 Multiple Sklerose								
<i>B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose</i>	*	*	*	139	*	*	*	31
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
<i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>	*	*	*	1	*	*	*	0
<i>C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index</i>	0.0%	62.0%	*	0	*	*	*	0
<i>C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.6%	5.0%	0.9	3'410	5.1%	4.9%	1.0	827
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.2%	0.2%	0.9	561	0.0%	0.2%	0.0	113
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	236	0.0%	0.8%	0.0	46
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	3.5%	2.8%	1.3	510	2.7%	2.4%	1.1	111
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.5%	5.7%	1.0	1'374	4.5%	4.9%	0.9	352
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	8.5%	10.1%	0.8	729	11.2%	9.5%	1.2	205
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.2%	0.2%	1.1	451	0.0%	0.1%	0.0	97
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.1%	4.8%	0.9	2'242	5.2%	4.8%	1.1	581
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	204	0.0%	0.6%	0.0	40
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	2.2%	1.3%	1.7	405	1.1%	1.0%	1.2	88
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.4%	4.3%	0.8	1'048	3.6%	3.7%	1.0	277
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	7.9%	9.5%	0.8	585	10.8%	9.4%	1.1	176
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	2.2%	3.5%	0.6	1'012	1.1%	3.6%	0.3	271
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	2.9%	5.2%	0.6	279	1.2%	5.8%	0.2	81
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	2.7%	2.7%	1.0	185	0.0%	2.9%	0.0	42
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	1.5%	1.4%	1.0	136	0.0%	1.3%	0.0	46
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	3.0%	0.0	53	0.0%	0.9%	0.0	10
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	1.9%	3.5%	0.6	359	2.2%	3.7%	0.6	92
<i>D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)</i>	35.5%	30.4%	*	359	33.9%	24.1%	*	92
D.3 Lungenkrebs								
<i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs</i>	*	*	*	2'009	*	*	*	366
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.0%	2.2%	0.9	1'129	0.7%	1.8%	0.4	274
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	2.0%	6.0%	0.3	49	*	*	*	7
<i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>	8.4%	8.3%	*	49	*	*	*	7
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.5%	2.1%	0.7	532	0.8%	1.2%	0.7	122
<i>D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom</i>	6.7%	5.2%	*	39	11.6%	6.1%	*	15
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	4.1%	5.6%	0.7	193	7.9%	5.7%	1.4	63

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.1%	0.2%	0.5	1'053	0.0%	0.1%	0.0	226
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	97.9%	94.4%	*	1'031	94.7%	95.8%	*	214
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.2%	1.7	1'026	0.0%	0.1%	0.0	212
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	5.5%	7.3%	0.8	73	5.6%	2.5%	2.2	18
<i>E.2.3.P Anteil allopplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>	*	*	*	5	*	*	*	1
<i>E.2.4.P Anteil allopplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19</i>	94.5%	91.9%	*	415	88.3%	94.8%	*	68
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
<i>E.3.1.F Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	465	*	*	*	76
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	2.8%	0.8%	*	13	*	*	*	1
<i>E.3.3.F Radiojodtherapie</i>	*	*	*	323	*	*	*	85
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
<i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	879	*	*	*	222
<i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>	*	*	*	730	*	*	*	172
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	7.0%	4.8%	1.5	1'190	9.8%	4.5%	2.2	276
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	2.7%	3.5%	0.8	263	6.7%	2.6%	2.6	60
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	8.9%	9.0%	1.0	45	*	*	*	8
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.8%	2.1%	0.9	168	0.0%	1.6%	0.0	49
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	60	*	*	*	9
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	8.4%	6.9%	1.2	95	0.0%	2.8%	0.0	16
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	39.4%	35.4%	1.1	104	48.4%	38.3%	1.3	31
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	64	6.2%	7.1%	0.9	16
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	5.1%	5.4%	1.0	389	8.0%	6.1%	1.3	87
<i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>	4.2%	2.9%	*	20	*	*	*	4
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	2
<i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz</i>	0.0%	0.4%	*	0	*	*	*	2
E.5 Erkrankungen des Magens								
<i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>	*	*	*	230	*	*	*	59
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	4.5%	3.7%	1.2	445	1.2%	4.0%	0.3	83
<i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>	*	*	*	171	*	*	*	37
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	36	6.7%	3.5%	1.9	15
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	5.8%	5.5%	1.0	69	*	*	*	9
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	4.5%	6.3%	0.7	66	7.7%	6.8%	1.1	13
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	4.0%	4.8%	0.8	177	4.2%	5.5%	0.8	48
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	3.2%	6.6%	0.5	278	9.7%	5.5%	1.8	72
E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität	3.6%	6.7%	0.5	168	5.3%	4.8%	1.1	38
E.8 Bariatrische Chirurgie								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	139	0.0%	0.0%	0.0	42
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	270	0.0%	0.5%	0.0	46
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	5.1%	4.4%	1.2	39	5.0%	2.8%	1.8	20
<i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>	*	*	*	9	*	*	*	4
<i>F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen</i>	*	*	*	198	*	*	*	102

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	579	*	*	*	167
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	313	*	*	*	90
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	7.1%	3.7%	1.9	70	13.3%	5.2%	2.6	15
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	3.1%	1.8%	1.7	195	0.0%	0.8%	0.0	57
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	2
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	13	*	*	*	7
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	241	*	*	*	73
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	4.6%	5.9%	0.8	108	7.7%	5.0%	1.5	39
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	7.0%	6.2%	1.1	114	7.4%	5.2%	1.4	27
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	8.0%	9.3%	0.9	25	*	*	*	4
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	43.0%	39.8%	1.1	107	32.1%	38.9%	0.8	28
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	28.0%	25.2%	1.1	50	12.5%	21.0%	0.6	16
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	3.7%	3.9%	0.9	973	4.4%	3.9%	1.1	252
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I-II), Mortalität	1.3%	0.6%	2.1	238	1.6%	1.5%	1.1	62
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	44	0.0%	3.2%	0.0	18
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	5.9%	4.7%	1.3	102	11.8%	6.7%	1.7	34
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	2.5%	5.7%	0.4	281	0.0%	4.3%	0.0	44
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	4.7%	3.8%	1.2	64	9.4%	4.2%	2.3	32
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	3.5%	0.8%	4.7	85	0.0%	1.9%	0.0	27
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	35	*	*	*	16
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	124	*	*	*	19
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	1.7%	2.6%	0.7	403	0.0%	3.1%	0.0	92
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	10.2%	11.9%	0.9	166	5.4%	9.7%	0.6	37
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	1'692	*	*	*	425
F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio	*	*	*	423	*	*	*	101
F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz	*	*	*	58	*	*	*	13
F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän	*	*	*	281	*	*	*	68
F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta	*	*	*	930	*	*	*	243
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	288	*	*	*	94
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	85	*	*	*	27
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	183	*	*	*	51

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	13'590	*	*	*	2'909
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	*	*	*	1	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.9%	3.1%	*	265	2.0%	2.9%	*	38
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	23.6%	24.6%	*	2'174	16.5%	20.0%	*	322
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	32.3%	33.0%	*	4'396	33.1%	33.1%	*	963
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	23.9%	27.8%	*	2'605	25.0%	27.8%	*	588
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	20.9%	25.0%	*	1'686	21.8%	25.0%	*	368
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	32.2%	35.9%	*	919	33.0%	35.6%	*	220
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	549	*	*	*	117
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	31	*	*	*	6
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	59	*	*	*	15
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	139	*	*	*	35
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	155	*	*	*	32
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	196	*	*	*	35
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	212	*	*	*	46
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	1'926	*	*	*	403
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	13'302	*	*	*	2'835
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.1%	0.0%	3.3	753	0.0%	0.0%	0.0	139
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	73.6%	75.0%	*	542	78.8%	80.2%	*	108
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	14.4%	11.0%	*	52	29.4%	13.5%	*	20
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	42.6%	27.7%	*	118	41.2%	33.4%	*	21
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	1'772	*	*	*	374
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	2'471	*	*	*	561
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	215	*	*	*	67
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariectomie, Mortalität	1.2%	1.2%	1.0	86	3.7%	1.7%	2.2	27
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	346	*	*	*	90
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.7%	0.6%	1.1	148	0.0%	0.4%	0.0	46
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	2'415	*	*	*	509
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	1'093	*	*	*	233
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	60.0%	72.2%	*	656	63.9%	76.1%	*	149
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.8%	1.1%	0.7	256	2.2%	1.7%	1.3	45
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	16.8%	22.1%	*	43	35.6%	32.3%	*	16
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	54	*	*	*	7
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	32.1%	*	0	0.0%	44.7%	*	0
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor	19.6%	36.6%	*	33	*	*	*	3
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'241	*	*	*	229
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	34.9%	45.8%	*	433	48.0%	47.7%	*	110

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	1'051	*	*	*	225
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	1'054	*	*	*	230
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	786	*	*	*	166
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	1.9%	10.9%	*	15	*	*	*	5
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	5.0%	4.5%	1.1	120	0.0%	3.5%	0.0	23
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	6
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.3%	0.2%	1.5	633	0.0%	0.2%	0.0	169
H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen	3.3%	1.8%	*	21	*	*	*	5
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F HD Prostatakarzinom	*	*	*	434	*	*	*	86
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	133	0.0%	0.1%	0.0	25
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	801	0.0%	0.1%	0.0	184
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und petrochantärer Fraktur, Mortalität	3.1%	3.9%	0.8	97	3.9%	4.3%	0.9	77
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	1.1%	1.1%	1.0	91	5.3%	2.8%	1.9	57
I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	2.2%	1.4%	*	18	*	*	*	2
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	0.0%	0.5%	0.0	51
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	0.0%	1.2%	0.0	35
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	221	0.5%	0.1%	10.4	186
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	46	10.5%	5.4%	2.0	19
I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	4	*	*	*	3
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	1	0.0%	0.2%	0.0	42
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	0.0%	1.2%	0.0	17
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	11.8%	3.2%	3.7	17	4.5%	5.2%	0.9	22
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	2'786	*	*	*	438
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	341	*	*	*	60
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	4.3%	0.0	34	*	*	*	5
I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität	1.4%	1.6%	0.9	74	0.0%	0.0%	*	10
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.4%	0.2%	2.3	559	0.0%	0.2%	0.0	88
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.2%	0.0%	5.6	907	0.0%	0.1%	0.0	137
I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität	0.4%	0.1%	3.6	224	2.1%	0.1%	16.1	47
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	145	0.0%	0.3%	0.0	28
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	1.6%	1.1%	1.5	875	2.3%	1.3%	1.9	128
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	1.1%	0.5%	*	10	*	*	*	2
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	112	*	*	*	49
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	1'933	*	*	*	354
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.2%	4.5%	0.7	1'049	4.2%	4.3%	1.0	212
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	76	0.0%	0.1%	0.0	13
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	1.0%	1.4%	0.7	102	0.0%	1.0%	0.0	30
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	1.0%	2.1%	0.5	199	0.0%	2.9%	0.0	31
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	2.4%	3.6%	0.7	211	10.8%	4.6%	2.4	37
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	4.4%	5.3%	0.8	229	4.3%	5.9%	0.7	46
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	6.9%	9.1%	0.8	232	5.5%	6.3%	0.9	55
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	3.0%	3.7%	0.8	1'115	4.0%	3.6%	1.1	223
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	1'045	*	*	*	243
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	16.0%	22.9%	0.7	6'959	18.8%	22.3%	0.8	1'001
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	15.9%	23.3%	0.7	5'527	19.1%	22.2%	0.9	727
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	191.8	*	*	6'959	199.1	*	*	1'001
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	40.6%	43.0%	*	737	44.6%	43.2%	*	121
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	19.7%	16.1%	1.2	1'509	28.0%	22.8%	1.2	289
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	29.6%	28.8%	1.0	697	30.8%	24.1%	1.3	260
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	11.2%	7.7%	1.4	812	3.4%	6.9%	0.5	29
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	22.8%	20.2%	1.1	2'078	15.1%	11.3%	1.3	674
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	37.2%	39.8%	0.9	819	25.7%	35.8%	0.7	261
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	351	*	*	*	68
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	467	*	*	*	70
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	64	*	*	*	8

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Transplantationen								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	62	*	*	*	11
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	62	*	*	*	11
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	103	*	*	*	17
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	103	*	*	*	17
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.4 Pankreastretransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	1
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	229	*	*	*	52
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogene, syngene	*	*	*	86	*	*	*	12
L.5.3.F Nierentransplantation, allogene, Leichenniere	*	*	*	85	*	*	*	33
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	3	*	*	*	4
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	324	*	*	*	70
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	6	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	6	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	–	*	*	*	–
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	–	*	*	*	–
L.6.6.F Autogene Stammzelltherapie	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6.7.F Allogene Stammzelltherapie	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2010–2014		2015	
	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl
Z Zusatzinformationen				
Z.1 Aufenthaltsdauer				
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.5	3'458	7.7	622
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	13.0	2'584	11.9	570
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.1	1'053	4.5	226
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	4.9	1'026	4.9	212
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.3	270	8.0	46
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	4.2	753	3.8	139
H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer	5.7	633	6.0	169
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.5	801	8.3	184
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	10.5	221	10.0	186
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.0	394	4.0	91