

Erklärende Bemerkungen des Universitätsspitals Basel

- A.1.2.M
 ① Von 39 Patienten in dieser Altersgruppe ist 1 Patient verstorben. Der Patient wurde als Notfall unter Reanimation eingeliefert.
- B.1.3.M
 ② Von 156 Patienten sind 19 Patienten verstorben. Das Patientenkollektiv enthält Patienten mit schweren Krankheitsverläufen, bei denen aufgrund infauster Prognose eine Palliativbehandlung eingeleitet oder auf eigenen Wunsch von lebensverlängernden Massnahmen abgesehen wurde. 7 der verstorbenen Patienten sind auch unter B.1.11.M erfasst.
- B.1.11.M
 ③ Von 33 Patienten sind 10 Patienten verstorben. Bei Subarachnoidalblutung mit sekundärer intrazerebraler Blutung wird am Universitätsspital Basel als Hauptdiagnose die Subarachnoidalblutung codiert. Dadurch enthält das Kollektiv verhältnismässig viele Patienten (7 der Verstorbenen) mit diesem besonders schweren Krankheitsbild. Würde stattdessen ebenfalls kodierregelkonform die Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung codiert, wäre die beobachtete Mortalität für den vorliegenden Indikator deutlich tiefer und nicht auffällig.
- D.1.3.M
 ④ Von 54 Patienten ist 1 Patient verstorben. Der Patient wurde leider falsch codiert. Er wies als Hauptdiagnose eine Sepsis auf und müsste J.2 zugeordnet werden. Gleicher Patient wie unter D.1.9.M.
- D.1.9.M
 ⑤ Von 46 Patienten ist 1 Patient verstorben. Der Patient wurde leider falsch codiert. Er wies als Hauptdiagnose eine Sepsis auf und müsste J.2 zugeordnet werden. Gleicher Patient wie unter D.1.3.M.
- D.4.3.M
 ⑥ Von 71 Patienten sind 2 Patienten (>70 Jahre) verstorben. Einmal wurde aufgrund des fortgeschrittenen Tumorleidens im weiteren Verlauf eine Palliativbehandlung eingeleitet. Ein Patient verstarb postoperativ an einem Herzinfarkt.
- E.2.1.M
 ⑦ Von 240 Patienten ist 1 Patient (>75 Jahre) verstorben. Er erlitt im weiteren Verlauf u.a einen Ileus und eine Pneumonie und verstarb an Herzversagen.
- E.4.4.M
 ⑧ Von 15 Patienten ist 1 Patient verstorben. Er erlag bei fortgeschrittenem Tumorleiden einem Multiorganversagen.
- E.6.1.M
 ⑨ Von 7 Patienten sind 2 Patienten verstorben. Ein Patient erlag einer Hirnblutung. Der zweite Patient starb bei fortgeschrittenem Tumorleiden an einer postoperativen Blutung.
- F.1.1.M
 ⑩ Von 69 Patienten ist 1 Patient verstorben. Er erlag einem erneut aufgetretenen Hirninfarkt.
- F.3.7.M
 ⑪ Von 20 Patienten ist 1 Patient verstorben. Auf Patientenwunsch wurde im weiteren Verlauf eine Palliativbehandlung eingeleitet.
- H.1.1.M
 ⑫ Von 34 Patienten ist 1 Patient verstorben. Er erlag bei fortgeschrittenem Tumorleiden einem Multiorganversagen.
- I.1.8.M
 ⑬ Von 117 Patienten ist 1 Patient (>85 Jahre) verstorben. Er erlag im weiteren Verlauf einem Herzinfarkt.
- I.1.12.M
 ⑭ Von 49 Patienten ist 1 Patient (>80 Jahre) verstorben. Er erlitt im weiteren Verlauf eine Sepsis und es wurde eine Palliativbehandlung eingeleitet.
- I.3.4.M
 ⑮ Von 33 Patienten ist 1 Patient (>75 Jahre) verstorben. Er erlag im weiteren Verlauf einem Multiorganversagen bei multiplen Begleiterkrankungen.
- I.3.5.M
 ⑯ Von 27 Patienten sind 3 Patienten (> 80 Jahre) verstorben. Die Patienten wiesen multiple verlaufsbestimmende Begleiterkrankungen auf. Auf Wunsch der Patienten wurde von weiteren lebensverlängernden Massnahmen abgesehen.

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.2%	5.6%	1.1	3'641	7.3%	4.9%	1.5	772
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.7%	1.2%	0.6	140	2.6%	1.3%	1.9	39
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.2%	1.9%	1.7	1'298	3.2%	1.8%	1.8	277
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	6.8%	6.0%	1.1	1'802	9.1%	5.2%	1.8	372
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	15.2%	17.6%	0.9	401	14.3%	15.6%	0.9	84
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19)	88.8%	58.8%	*	3'234	90.2%	62.9%	*	696
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	8.5%	8.0%	1.1	2'099	9.0%	6.3%	1.4	502
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	4.3%	3.2%	1.4	1'083	5.1%	3.0%	1.7	215
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.3%	2.8%	*	49	*	*	*	5
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	7.4%	6.2%	1.2	1'686	11.0%	6.7%	1.6	356
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	4.1%	4.2%	1.0	1'896	3.4%	3.3%	1.0	407
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	5.9%	8.3%	0.7	2'296	4.4%	8.0%	0.5	546
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	3.8%	3.4%	1.1	26	*	*	*	9
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.0%	3.6%	1.1	299	3.8%	3.2%	1.2	78
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.3%	7.1%	0.9	1'246	4.6%	7.0%	0.7	304
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	6.1%	12.4%	0.5	725	4.5%	12.7%	0.4	155
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	55.1%	50.4%	*	457	40.2%	55.2%	*	99
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	9'837	*	*	*	2'126
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	4.6%	3.6%	1.3	2'700	4.4%	2.9%	1.5	567
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.8%	1.1%	1.6	3'822	1.6%	1.3%	1.2	788
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.3%	0.9%	1.5	3'487	1.6%	1.2%	1.4	686
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.6%	1.2%	1.4	2'290	1.2%	0.9%	1.4	481
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	36.7%	38.5%	*	2'290	37.1%	38.5%	*	481
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.7%	0.7%	1.1	2'135	0.9%	0.6%	1.5	439
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	50	*	*	*	13
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	3'755	*	*	*	995
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	2'004	*	*	*	516
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	629	*	*	*	171
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	2'144	*	*	*	604
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	161	*	*	*	22

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	4'036	*	*	*	766
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	2'078	*	*	*	407
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	2'268	*	*	*	352
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	709	*	*	*	218
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	928	*	*	*	187
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	2	*	*	*	1
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	3.2%	1.8%	1.8	402	3.4%	2.2%	1.6	58
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität	6.2%	5.9%	1.1	16	*	*	*	2
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität	3.1%	1.6%	1.9	386	3.6%	2.2%	1.7	56
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	6.6%	4.9%	1.4	346	0.9%	2.7%	0.4	106
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	3.8%	4.1%	0.9	236	1.1%	2.7%	0.4	88
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	12.5%	10.0%	1.3	104	0.0%	1.1%	0.0	18
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	5.1%	2.2%	2.3	59	8.3%	3.1%	2.7	12
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.0%	3.9%	1.3	441	7.3%	3.6%	2.0	82
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.3%	1.2%	1.9	1'080	3.1%	1.6%	2.0	162
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	2.0%	0.7%	2.8	49	*	*	*	9
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	1.4%	0.7%	2.1	220	0.0%	0.9%	0.0	22
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	0.7%	0.7%	1.0	403	3.0%	0.8%	3.7	67
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	3.9%	1.6%	2.4	337	2.2%	1.3%	1.7	46
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	7.0%	4.3%	1.6	71	11.1%	6.2%	1.8	18
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	26.3%	13.7%	*	284	22.8%	8.9%	*	37
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen	*	*	*	2	0.0%	0.1%	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	2.1%	1.5%	*	23	0.0%	1.0%	*	0
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	7.8%	9.9%	0.8	3'566	8.0%	9.7%	0.8	870
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	5.7%	4.0%	1.5	174	0.0%	2.6%	0.0	22
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	6.8%	5.1%	1.3	828	12.2%	4.1%	3.0	156
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	7.9%	9.6%	0.8	1'980	7.1%	9.0%	0.8	495
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	9.4%	19.7%	0.5	584	8.1%	16.5%	0.5	197
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	42.9%	19.7%	*	1'530	71.3%	35.7%	*	620
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	4.1%	6.6%	0.6	2'843	4.4%	6.8%	0.6	707
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	4.5%	6.7%	0.7	2'447	4.6%	6.9%	0.7	603
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), nur Zuverlegungen, Mortalität	1.8%	6.1%	0.3	396	2.9%	6.2%	0.5	104
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	6.4%	9.2%	0.7	281	8.4%	11.2%	0.7	179
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	9.9%	5.5%	*	281	25.3%	9.7%	*	179
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	17.5%	23.4%	0.7	275	12.5%	24.2%	0.5	40
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	9.7%	8.4%	*	275	5.7%	8.2%	*	40
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	23.2%	24.9%	0.9	491	23.0%	25.4%	0.9	126
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	21.6%	13.3%	1.6	208	30.3%	12.3%	2.5	33
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	8.3%	12.4%	0.7	24	*	*	*	4
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	0.7%	8.6%	*	24	*	*	*	4

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.1%	0.3%	0.4	886	0.0%	0.1%	0.0	227
<i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>	32.3%	8.9%	*	286	63.4%	26.9%	*	144
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
<i>B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</i>	*	*	*	489	*	*	*	102
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	1.3%	2.0%	0.6	158	0.0%	1.8%	0.0	44
B.4 Epilepsie								
<i>B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)</i>	*	*	*	1'697	*	*	*	339
<i>B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)</i>	*	*	*	29	*	*	*	7
B.5 Multiple Sklerose								
<i>B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose</i>	*	*	*	613	*	*	*	143
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
<i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>	*	*	*	330	*	*	*	0
<i>C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index</i>	*	*	*	3	*	*	*	0
<i>C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme</i>	*	*	*	3	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.1%	5.2%	0.8	2'297	5.7%	4.8%	1.2	548
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	2
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.8%	0.6%	1.3	242	1.9%	0.6%	2.9	54
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	3.3%	2.7%	1.2	572	0.8%	2.2%	0.4	124
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	4.4%	5.7%	0.8	1'076	4.7%	4.9%	1.0	255
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	6.5%	10.1%	0.6	400	15.0%	9.5%	1.6	113
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	2
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	2.8%	4.0%	0.7	1'905	6.0%	4.1%	1.5	447
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.9%	0.5%	2.0	217	2.2%	0.4%	5.1	46
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.7%	1.3%	1.3	462	0.0%	1.0%	0.0	94
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	2.9%	4.2%	0.7	871	4.9%	3.7%	1.3	205
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.4%	9.5%	0.6	355	15.7%	9.4%	1.7	102
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	2.6%	3.3%	0.8	1'313	2.4%	3.5%	0.7	379
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	3.2%	5.5%	0.6	507	3.3%	6.4%	0.5	121
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	1.4%	2.5%	0.6	287	2.3%	2.5%	0.9	86
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	0.4%	1.3%	0.4	223	0.0%	1.3%	0.0	66
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	45	0.0%	1.5%	0.0	25
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	5.2%	3.4%	1.5	251	3.7%	3.8%	1.0	81
<i>D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)</i>	19.1%	30.4%	*	251	21.4%	24.1%	*	81
D.3 Lungenkrebs								
<i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs</i>	*	*	*	1'805	*	*	*	356
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	5.3%	2.5%	2.1	1'090	3.4%	1.8%	1.9	238
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	19.6%	8.3%	2.4	51	16.7%	10.7%	1.6	12
<i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>	12.1%	8.3%	*	51	14.5%	6.6%	*	12
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	4.6%	2.3%	2.0	372	2.8%	1.2%	2.4	71
<i>D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom</i>	6.6%	5.2%	*	28	*	*	*	6
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	12.9%	6.8%	1.9	311	10.1%	7.4%	1.4	79

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.1%	0.2%	0.7	688	0.0%	0.1%	0.0	163
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	91.7%	94.4%	*	631	96.3%	95.8%	*	157
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.1%	2.3	1'083	0.4%	0.1%	4.5	240
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	15.2%	6.4%	2.4	33	0.0%	3.0%	0.0	13
<i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>	*	*	*	2	*	*	*	1
<i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19</i>	93.3%	91.9%	*	609	93.1%	94.8%	*	134
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	355	*	*	*	103
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	6	*	*	*	3
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	656	*	*	*	97
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
<i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	714	*	*	*	140
<i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>	*	*	*	734	*	*	*	164
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	13.9%	5.6%	2.5	718	10.8%	4.9%	2.2	130
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	6.4%	4.5%	1.4	109	4.0%	3.9%	1.0	25
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	15.6%	9.5%	1.6	32	*	*	*	1
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	10.0%	3.2%	3.2	80	6.7%	1.3%	5.1	15
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	55	*	*	*	8
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	6.8%	5.8%	1.2	73	6.2%	6.9%	0.9	16
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	50.9%	40.4%	1.3	110	41.2%	37.0%	1.1	17
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	12.5%	3.8%	3.3	24	9.1%	9.8%	0.9	11
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	7.2%	6.4%	1.1	235	7.9%	4.7%	1.7	38
<i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>	*	*	*	8	*	*	*	1
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	2	0.0%	5.3%	0.0	12
<i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz</i>	*	*	*	2	15.8%	6.0%	*	12
E.5 Erkrankungen des Magens								
<i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>	*	*	*	130	*	*	*	45
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	3.8%	4.3%	0.9	320	3.0%	4.2%	0.7	67
<i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>	*	*	*	124	*	*	*	53
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	30	*	*	*	5
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	0.0%	7.1%	0.0	14	*	*	*	2
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	5.0%	2.9%	1.7	80	0.0%	2.6%	0.0	46
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	5.1%	5.8%	0.9	39	*	*	*	7
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.4%	6.8%	1.5	115	0.0%	5.0%	0.0	16
E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität	8.8%	7.3%	1.2	57	0.0%	3.1%	0.0	12
E.8 Bariatrische Chirurgie								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	63	0.0%	0.0%	0.0	45
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.3%	0.5%	0.5	356	1.4%	0.4%	4.1	69
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	6.4%	4.0%	1.6	78	0.0%	2.2%	0.0	13
<i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>	*	*	*	48	*	*	*	5
<i>F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen</i>	*	*	*	133	*	*	*	41

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	759	*	*	*	149
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	324	*	*	*	59
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	5.5%	4.5%	1.2	182	0.0%	3.9%	0.0	25
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.5%	0.0	81	0.0%	0.5%	0.0	24
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	6.7%	6.0%	1.1	15	*	*	*	1
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	394	*	*	*	83
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	6.8%	6.2%	1.1	146	3.7%	3.7%	1.0	27
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	8.3%	5.4%	1.6	228	4.3%	4.0%	1.1	47
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	22.0%	13.3%	1.7	41	*	*	*	7
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	48.0%	39.9%	1.2	102	48.0%	35.0%	1.4	25
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	32.3%	28.0%	1.2	65	33.3%	30.6%	1.1	18
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	6.0%	4.1%	1.5	829	5.2%	3.9%	1.3	172
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I-II), Mortalität	1.4%	0.7%	1.9	71	0.0%	0.9%	0.0	29
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	69	0.0%	1.7%	0.0	13
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	1.7%	4.8%	0.4	59	15.4%	7.4%	2.1	13
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	8.4%	6.2%	1.3	286	3.7%	4.2%	0.9	54
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	0.0%	3.1%	0.0	27	*	*	*	8
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	67	5.0%	1.2%	4.2	20
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	125	*	*	*	22
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	125	*	*	*	13
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	3.7%	2.9%	1.3	407	5.4%	2.9%	1.9	92
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	14.2%	12.2%	1.2	106	5.6%	7.9%	0.7	18
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	1'381	*	*	*	353
F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio	*	*	*	511	*	*	*	139
F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz	*	*	*	46	*	*	*	12
F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän	*	*	*	126	*	*	*	32
F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta	*	*	*	698	*	*	*	170
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	119	*	*	*	33
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	67	*	*	*	20
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	90	*	*	*	21

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	11'507	*	*	*	2'509
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	*	*	*	1	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.7%	3.1%	*	280	2.4%	2.9%	*	38
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	28.7%	24.6%	*	2'187	25.0%	20.0%	*	399
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	33.7%	33.0%	*	3'876	36.3%	33.1%	*	912
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	26.7%	27.8%	*	2'531	29.8%	27.8%	*	630
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	24.0%	25.0%	*	1'607	27.0%	25.0%	*	383
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	32.9%	35.9%	*	924	35.3%	35.6%	*	247
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	286	*	*	*	69
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	9	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	65	*	*	*	17
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	95	*	*	*	21
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	62	*	*	*	22
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	64	*	*	*	9
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	123	*	*	*	28
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	939	*	*	*	232
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	10'802	*	*	*	2'348
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	580	0.0%	0.0%	0.0	118
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	75.1%	75.0%	*	434	76.3%	80.2%	*	90
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovariektomie	12.9%	11.0%	*	30	*	*	*	9
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovariektomie	31.4%	27.7%	*	71	41.1%	33.4%	*	23
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	1'273	*	*	*	325
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	2'125	*	*	*	561
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	229	*	*	*	97
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	1.1%	1.9%	0.6	93	0.0%	0.7%	0.0	29
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	522	*	*	*	92
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	1.2%	0.6%	2.0	163	6.9%	0.2%	34.7	29
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'512	*	*	*	367
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	932	*	*	*	239
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	74.7%	72.2%	*	696	82.0%	76.1%	*	196
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	2.6%	1.3%	2.0	190	2.9%	1.6%	1.8	34
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	34.7%	22.1%	*	66	*	*	*	8
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	76	0.0%	0.6%	0.0	12
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	47.4%	32.1%	*	36	*	*	*	5
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor	36.4%	36.6%	*	51	*	*	*	9
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'568	*	*	*	343
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	60.5%	45.8%	*	948	49.0%	47.7%	*	168

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	672	*	*	*	110
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	785	*	*	*	143
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	432	*	*	*	84
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	13.4%	10.9%	*	58	25.0%	13.4%	*	21
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	6.0%	4.3%	1.4	83	15.4%	7.7%	2.0	13
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	1
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.4%	0.2%	2.0	987	0.0%	0.2%	0.0	237
H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen	4.0%	1.8%	*	39	7.2%	2.3%	*	17
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F HD Prostatakarzinom	*	*	*	543	*	*	*	85
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	252	0.0%	0.2%	0.0	31
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.2%	0.1%	2.1	495	0.9%	0.1%	7.7	117
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und petrochantärer Fraktur, Mortalität	2.7%	2.8%	0.9	113	4.3%	3.3%	1.3	69
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	4.4%	2.0%	2.2	136	2.3%	3.3%	0.7	86
I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	3.0%	1.4%	*	15	*	*	*	5
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	2.0%	1.2%	1.7	49
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	1	0.0%	2.1%	0.0	24
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.4%	0.1%	6.2	283	0.0%	0.1%	0.0	73
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	44	0.0%	0.2%	0.0	17
I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	4.9%	1.2%	*	14	*	*	*	3
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	1	0.0%	0.4%	0.0	28
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	8
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	9.1%	2.2%	4.1	33	4.0%	4.9%	0.8	25
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	1
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	4'609	*	*	*	809
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	437	*	*	*	102
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	3.3%	4.4%	0.8	30	*	*	*	4
I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität	2.1%	3.1%	0.7	94	0.0%	2.0%	0.0	39
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.2%	0.2%	0.8	1'169	0.0%	0.2%	0.0	276
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.1%	0.1%	1.4	1'300	0.0%	0.1%	0.0	181
I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität	0.7%	0.2%	4.0	564	0.0%	0.1%	0.0	116
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	214	0.0%	0.6%	0.0	45
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	1.2%	1.2%	1.1	1'287	2.0%	1.8%	1.1	151
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	1.2%	0.5%	*	16	*	*	*	2
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	98	*	*	*	33
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	1'384	*	*	*	226
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	4.4%	4.2%	1.0	703	3.1%	3.4%	0.9	163
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	1.4%	0.3%	4.4	74	0.0%	0.1%	0.0	18
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	73	0.0%	0.7%	0.0	21
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	2.1%	2.1%	1.0	142	3.0%	1.9%	1.6	33
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	3.1%	4.0%	0.8	127	11.1%	4.3%	2.6	27
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	4.3%	5.3%	0.8	161	0.0%	4.6%	0.0	31
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	12.7%	9.4%	1.4	126	3.0%	6.4%	0.5	33
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	4.9%	3.8%	1.3	756	5.7%	4.1%	1.4	175
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	561	*	*	*	130
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	24.5%	25.6%	1.0	3'370	27.7%	26.0%	1.1	632
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	25.5%	25.7%	1.0	2'691	28.9%	26.5%	1.1	495
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	137.4	*	*	3'370	132.7	*	*	632
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	40.7%	43.0%	*	310	35.5%	43.2%	*	54
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	13.2%	15.6%	0.8	2'388	22.6%	22.3%	1.0	341
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	31.0%	28.3%	1.1	733	23.6%	23.1%	1.0	322
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	5.3%	7.4%	0.7	1'655	5.3%	6.8%	0.8	19
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	16.9%	20.4%	0.8	1'755	9.2%	10.4%	0.9	698
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	43.6%	39.8%	1.1	358	34.1%	36.3%	0.9	123
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	278	*	*	*	62
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	256	*	*	*	32
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	32	*	*	*	11

Krankheitsgruppen	2010–2014				2015			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
L Transplantationen								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.4 Pankreastreansplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	306	*	*	*	80
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	109	*	*	*	34
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	110	*	*	*	44
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	7	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	518	*	*	*	119
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	16	*	*	*	9
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	3	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	–	*	*	*	–
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	–	*	*	*	–
L.6.6.F Autogene Stammzelltherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.7.F Allogene Stammzelltherapie	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2010–2014		2015	
	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl
Z Zusatzinformationen				
Z.1 Aufenthaltsdauer				
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.1	3'625	7.9	772
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	9.8	2'803	8.6	707
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	5.6	688	4.4	163
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	3.7	1'083	3.4	240
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	10.1	356	11.4	69
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	6.0	580	4.4	118
H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer	6.9	987	6.6	237
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	11.0	495	10.6	117
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne geriatrische Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	11.2	283	9.5	73
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.0	349	4.1	59