

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.1 Herzinfarkt | | | | | | | | |
| A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 4.6% | 5.1% | 0.9 | 2'342 | 4.6% | 4.4% | 1.1 | 453 |
| A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität | 1.0% | 1.2% | 0.9 | 97 | 0.0% | 1.1% | 0.0 | 14 |
| A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität | 0.8% | 1.9% | 0.4 | 927 | 2.2% | 1.7% | 1.3 | 182 |
| A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität | 5.6% | 5.6% | 1.0 | 1'101 | 5.2% | 4.7% | 1.1 | 211 |
| A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität | 17.1% | 17.3% | 1.0 | 217 | 13.0% | 14.6% | 0.9 | 46 |
| A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19) | 66.7% | 60.4% | * | 1'561 | 68.9% | 63.2% | * | 312 |
| A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität | 6.1% | 7.0% | 0.9 | 1'558 | 6.2% | 6.1% | 1.0 | 306 |
| A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | 2.0% | 3.4% | 0.6 | 603 | 1.9% | 2.9% | 0.7 | 103 |
| A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19) | 1.7% | 2.4% | * | 39 | * | * | * | 3 |
| A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 5.3% | 6.1% | 0.9 | 1'161 | 5.6% | 5.0% | 1.1 | 215 |
| A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität | 3.4% | 3.6% | 1.0 | 1'131 | 3.8% | 3.3% | 1.2 | 234 |
| A.2 Herzinsuffizienz | | | | | | | | |
| A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität | 7.4% | 8.6% | 0.9 | 2'389 | 9.6% | 8.3% | 1.2 | 657 |
| A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität | 3.6% | 3.1% | 1.2 | 28 | * | * | * | 3 |
| A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität | 1.1% | 3.6% | 0.3 | 186 | 2.0% | 4.3% | 0.5 | 49 |
| A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität | 6.0% | 7.1% | 0.9 | 1'342 | 7.7% | 6.7% | 1.2 | 336 |
| A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität | 11.0% | 12.3% | 0.9 | 833 | 13.4% | 11.1% | 1.2 | 269 |
| A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19) | 41.2% | 52.3% | * | 426 | 55.7% | 56.8% | * | 191 |
| A.3 Herzkatheter | | | | | | | | |
| A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19) | * | * | * | 3'315 | * | * | * | 611 |
| A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | 3.3% | 3.3% | 1.0 | 1'547 | 3.3% | 2.6% | 1.3 | 301 |
| A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | 2.5% | 1.3% | 2.0 | 1'028 | 4.0% | 1.4% | 2.8 | 175 |
| A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität | 2.6% | 1.0% | 2.6 | 909 | 4.9% | 1.3% | 3.8 | 142 |
| A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | 2.9% | 1.3% | 2.3 | 666 | 2.6% | 1.3% | 2.0 | 114 |
| A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19) | 38.9% | 38.5% | * | 666 | 39.4% | 40.1% | * | 114 |
| A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität | 2.2% | 0.8% | 2.9 | 591 | 1.1% | 1.0% | 1.0 | 95 |
| A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 0 | * | * | * | 1 |
| A.4 Herzrhythmusstörungen | | | | | | | | |
| A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen | * | * | * | 1'110 | * | * | * | 229 |
| A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator | | | | | | | | |
| A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren) | * | * | * | 388 | * | * | * | 106 |
| A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators | * | * | * | 70 | * | * | * | 23 |
| A.6 Ablative Therapie | | | | | | | | |
| A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie | * | * | * | 18 | * | * | * | 11 |
| A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.7 Operationen am Herzen | | | | | | | | |
| A.7.1.F OP am Herzen insgesamt | * | * | * | 79 | * | * | * | 29 |
| A.7.2.F OP an Herzklappen | * | * | * | 15 | * | * | * | 5 |
| A.7.3.F OP an Koronargefässen | * | * | * | 4 | * | * | * | 0 |
| A.7.4.F Andere OP am Herzen | * | * | * | 60 | * | * | * | 24 |
| A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |
| A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 1 |
| A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 1 |
| A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 0 |
| A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke) | | | | | | | | |
| B.1 Schlaganfall | | | | | | | | |
| B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität | 7.5% | 9.9% | 0.8 | 1'884 | 6.0% | 8.5% | 0.7 | 452 |
| B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität | 0.0% | 3.8% | 0.0 | 85 | 0.0% | 2.6% | 0.0 | 12 |
| B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität | 2.1% | 4.8% | 0.4 | 425 | 3.5% | 4.2% | 0.8 | 113 |
| B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität | 6.2% | 9.4% | 0.7 | 1'026 | 5.1% | 8.2% | 0.6 | 236 |
| B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität | 19.5% | 18.8% | 1.0 | 348 | 12.1% | 15.6% | 0.8 | 91 |
| B.1.6.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19) | 11.6% | 24.8% | * | 218 | 33.8% | 41.2% | * | 153 |
| B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität | 6.0% | 6.6% | 0.9 | 1'453 | 5.0% | 5.8% | 0.9 | 378 |
| B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität | 5.9% | 6.5% | 0.9 | 948 | 4.3% | 5.8% | 0.7 | 253 |
| B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | 6.1% | 6.9% | 0.9 | 505 | 6.4% | 5.9% | 1.1 | 125 |
| B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität | 13.8% | 10.8% | 1.3 | 29 | * | * | * | 1 |
| B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse | 2.0% | 7.3% | * | 29 | * | * | * | 1 |
| B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität | 23.6% | 24.1% | 1.0 | 144 | 16.1% | 20.5% | 0.8 | 31 |
| B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie | 9.9% | 8.3% | * | 144 | 8.2% | 7.9% | * | 31 |
| B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität | 20.0% | 24.8% | 0.8 | 205 | 13.5% | 22.2% | 0.6 | 52 |
| B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität | 5.7% | 15.7% | 0.4 | 87 | 8.3% | 9.8% | 0.8 | 12 |
| B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität | 5.8% | 7.8% | 0.7 | 139 | 0.0% | 5.4% | 0.0 | 10 |
| B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19) | 7.4% | 7.2% | * | 139 | 2.2% | 4.1% | * | 10 |

HFR - Hôpital fribourgeois

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke) | | | | | | | | |
| B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | | | | | | | |
| B.2.1.M TIA, Mortalität | 0.8% | 0.3% | 2.7 | 478 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 108 |
| <i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i> | 9.6% | 14.4% | * | 46 | 38.0% | 32.8% | * | 41 |
| B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute | | | | | | | | |
| <i>B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</i> | * | * | * | 134 | * | * | * | 21 |
| B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität | * | * | * | 9 | * | * | * | 2 |
| B.4 Epilepsie | | | | | | | | |
| <i>B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)</i> | * | * | * | 574 | * | * | * | 127 |
| <i>B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)</i> | * | * | * | 110 | * | * | * | 23 |
| B.5 Multiple Sklerose | | | | | | | | |
| <i>B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose</i> | * | * | * | 124 | * | * | * | 27 |
| C Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| C.1 Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| <i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i> | * | * | * | 473 | * | * | * | 461 |
| <i>C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index</i> | 0.0% | 66.2% | * | 0 | 0.0% | 68.0% | * | 0 |
| <i>C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D Erkrankungen der Lunge | | | | | | | | |
| D.1 Lungenentzündung (Pneumonie) | | | | | | | | |
| D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität | 5.5% | 5.3% | 1.0 | 2'740 | 3.2% | 4.7% | 0.7 | 622 |
| D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 238 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 53 |
| D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität | 1.3% | 0.7% | 1.8 | 157 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 29 |
| D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität | 3.1% | 2.8% | 1.1 | 488 | 0.0% | 1.8% | 0.0 | 103 |
| D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität | 5.6% | 5.5% | 1.0 | 1'222 | 4.5% | 4.5% | 1.0 | 292 |
| D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität | 10.2% | 9.9% | 1.0 | 635 | 4.8% | 9.8% | 0.5 | 145 |
| D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 217 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 50 |
| D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 4.7% | 4.6% | 1.0 | 1'977 | 2.4% | 4.1% | 0.6 | 451 |
| D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 0.7% | 0.5% | 1.4 | 147 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 29 |
| D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 1.8% | 1.3% | 1.3 | 395 | 0.0% | 0.7% | 0.0 | 87 |
| D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 3.3% | 4.0% | 0.8 | 932 | 2.7% | 3.4% | 0.8 | 219 |
| D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 10.7% | 9.4% | 1.1 | 503 | 4.3% | 9.0% | 0.5 | 116 |
| D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | | | | | | | | |
| D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität | 3.0% | 3.8% | 0.8 | 1'232 | 1.2% | 3.3% | 0.4 | 243 |
| D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität | 3.1% | 6.8% | 0.5 | 426 | 3.0% | 5.1% | 0.6 | 67 |
| D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität | 2.6% | 2.9% | 0.9 | 308 | 1.1% | 2.5% | 0.4 | 92 |
| D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität | 1.4% | 1.3% | 1.1 | 142 | 0.0% | 1.8% | 0.0 | 42 |
| D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 2.1% | 0.0 | 32 | * | * | * | 4 |
| D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität | 4.3% | 4.1% | 1.1 | 324 | 0.0% | 2.4% | 0.0 | 38 |
| <i>D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)</i> | 26.3% | 27.7% | * | 324 | 15.6% | 20.9% | * | 38 |
| D.3 Lungenkrebs | | | | | | | | |
| <i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs</i> | * | * | * | 1'035 | * | * | * | 195 |
| D.4 Operationen an der Lunge | | | | | | | | |
| D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität | 0.8% | 2.1% | 0.4 | 255 | 2.4% | 1.6% | 1.5 | 42 |
| D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität | * | * | * | 6 | * | * | * | 0 |
| <i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i> | * | * | * | 6 | 0.0% | 5.8% | * | 0 |
| D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität | 0.7% | 1.9% | 0.4 | 140 | 0.0% | 1.4% | 0.0 | 17 |
| <i>D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom</i> | * | * | * | 6 | 0.0% | 5.9% | * | 0 |
| D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität | * | * | * | 8 | * | * | * | 3 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| E Erkrankungen der Bauchorgane | | | | | | | | |
| E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) | | | | | | | | |
| E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität | 0.2% | 0.2% | 0.9 | 1'141 | 0.4% | 0.2% | 2.6 | 232 |
| <i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i> | 94.0% | 94.8% | * | 1'072 | 96.1% | 96.2% | * | 223 |
| E.2 Hernienoperationen | | | | | | | | |
| E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität | 0.3% | 0.2% | 2.0 | 926 | 0.7% | 0.2% | 3.7 | 152 |
| E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität | 13.6% | 4.0% | 3.4 | 22 | * | * | * | 8 |
| <i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i> | * | * | * | 5 | * | * | * | 2 |
| <i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19</i> | 77.1% | 92.9% | * | 431 | 95.0% | 95.3% | * | 76 |
| E.3 Eingriffe an der Schilddrüse | | | | | | | | |
| <i>E.3.1.F Resektion der Schilddrüse</i> | * | * | * | 166 | * | * | * | 42 |
| <i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse</i> | * | * | * | 1 | * | * | * | 2 |
| <i>E.3.3.F Radiojodtherapie</i> | * | * | * | 139 | * | * | * | 33 |
| E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm | | | | | | | | |
| <i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i> | * | * | * | 813 | * | * | * | 239 |
| <i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i> | * | * | * | 390 | * | * | * | 95 |
| E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität | 5.9% | 5.3% | 1.1 | 713 | 6.6% | 4.6% | 1.4 | 152 |
| E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität | 4.0% | 3.7% | 1.1 | 199 | 7.4% | 1.6% | 4.6 | 54 |
| E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität | 10.6% | 8.1% | 1.3 | 47 | * | * | * | 2 |
| E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität | 0.0% | 2.4% | 0.0 | 118 | 0.0% | 2.1% | 0.0 | 34 |
| E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 27 | * | * | * | 8 |
| E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität | 4.9% | 4.8% | 1.0 | 82 | 0.0% | 1.8% | 0.0 | 13 |
| E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität | 39.1% | 37.9% | 1.0 | 23 | * | * | * | 9 |
| E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität | 0.0% | 1.8% | 0.0 | 27 | * | * | * | 2 |
| E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität | 8.1% | 6.4% | 1.3 | 185 | 10.0% | 7.9% | 1.3 | 30 |
| <i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i> | * | * | * | 5 | * | * | * | 4 |
| E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 7 |
| <i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz</i> | * | * | * | 4 | * | * | * | 7 |
| E.5 Erkrankungen des Magens | | | | | | | | |
| <i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i> | * | * | * | 186 | * | * | * | 50 |
| E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität | 4.3% | 3.7% | 1.2 | 235 | 1.6% | 3.4% | 0.5 | 61 |
| <i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i> | * | * | * | 53 | * | * | * | 12 |
| E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität | 0.0% | 4.1% | 0.0 | 23 | * | * | * | 8 |
| E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität | 0.0% | 6.8% | 0.0 | 14 | * | * | * | 4 |
| E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität | 0.0% | 2.8% | 0.0 | 16 | * | * | * | 0 |
| E.6 Operationen am Ösophagus | | | | | | | | |
| E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität | 0.0% | 7.2% | 0.0 | 27 | * | * | * | 7 |
| E.7 Operationen am Pankreas | | | | | | | | |
| E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität | 4.9% | 6.4% | 0.8 | 41 | * | * | * | 6 |
| E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität | 4.5% | 6.4% | 0.7 | 22 | * | * | * | 3 |
| E.8 Bariatrische Chirurgie | | | | | | | | |
| E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 74 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 34 |
| F Gefässerkrankungen | | | | | | | | |
| F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien | | | | | | | | |
| F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität | 0.0% | 0.5% | 0.0 | 130 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 18 |
| F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| <i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i> | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| <i>F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen</i> | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| F Gefässerkrankungen | | | | | | | | |
| F.2 Erkrankungen der Aorta | | | | | | | | |
| F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt | * | * | * | 68 | * | * | * | 21 |
| F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta | * | * | * | 68 | * | * | * | 21 |
| F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität | 0.0% | 4.6% | 0.0 | 24 | * | * | * | 4 |
| F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität | 4.0% | 1.3% | 3.0 | 25 | 0.0% | 2.1% | 0.0 | 16 |
| F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität | 48.0% | 46.6% | 1.0 | 50 | * | * | * | 7 |
| F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität | 41.2% | 28.2% | 1.5 | 17 | * | * | * | 1 |
| F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien | | | | | | | | |
| F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität | 6.0% | 3.9% | 1.5 | 349 | 3.9% | 4.8% | 0.8 | 76 |
| F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I-II), Mortalität | 2.4% | 0.9% | 2.8 | 41 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 15 |
| F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität | * | * | * | 6 | * | * | * | 0 |
| F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität | 7.7% | 4.9% | 1.6 | 26 | * | * | * | 5 |
| F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität | 7.0% | 5.1% | 1.4 | 128 | 0.0% | 5.3% | 0.0 | 27 |
| F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität | 6.1% | 4.6% | 1.3 | 33 | * | * | * | 6 |
| F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität | 0.0% | 0.9% | 0.0 | 41 | * | * | * | 8 |
| F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP | * | * | * | 12 | * | * | * | 2 |
| F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen | * | * | * | 62 | * | * | * | 13 |
| F.4 Amputationen | | | | | | | | |
| F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität | 4.6% | 3.2% | 1.4 | 219 | 4.4% | 2.6% | 1.7 | 45 |
| F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität | 8.8% | 12.3% | 0.7 | 80 | 41.7% | 16.7% | 2.5 | 12 |
| F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA) | | | | | | | | |
| F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) | * | * | * | 230 | * | * | * | 58 |
| F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio | * | * | * | 40 | * | * | * | 8 |
| F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz | * | * | * | 9 | * | * | * | 1 |
| F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän | * | * | * | 47 | * | * | * | 10 |
| F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta | * | * | * | 134 | * | * | * | 39 |
| F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien | * | * | * | 12 | * | * | * | 9 |
| F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP | * | * | * | 41 | * | * | * | 8 |
| F.6 Arteriovenöser Shunt | | | | | | | | |
| F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel) | * | * | * | 66 | * | * | * | 12 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| G Geburtshilfe und Frauenheilkunde | | | | | | | | |
| G.1 Geburten | | | | | | | | |
| G.1.1.F Stationäre Geburten | * | * | * | 5'253 | * | * | * | 923 |
| G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten | 0.0% | 0.0% | * | 0 | 0.0% | 0.0% | * | 0 |
| G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades | 1.8% | 3.0% | * | 67 | 2.3% | 3.0% | * | 15 |
| G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie | 24.5% | 23.0% | * | 928 | 22.3% | 18.7% | * | 146 |
| G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio) | 27.8% | 33.1% | * | 1'462 | 29.1% | 32.9% | * | 269 |
| G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt | 22.6% | 27.9% | * | 1'012 | 23.7% | 27.6% | * | 187 |
| G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35 | 20.8% | 25.1% | * | 763 | 20.3% | 24.6% | * | 125 |
| G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34 | 30.6% | 35.9% | * | 249 | 35.8% | 35.5% | * | 62 |
| G.2 Neugeborene | | | | | | | | |
| G.2.1.F Neugeborene <1250 g | * | * | * | 25 | * | * | * | 12 |
| G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| G.2.3.F Neugeborene <500 g | * | * | * | 6 | * | * | * | 3 |
| G.2.4.F Neugeborene 500–749 g | * | * | * | 13 | * | * | * | 7 |
| G.2.5.F Neugeborene 750–999 g | * | * | * | 2 | * | * | * | 1 |
| G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g | * | * | * | 4 | * | * | * | 1 |
| G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g | * | * | * | 33 | * | * | * | 5 |
| G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g | * | * | * | 559 | * | * | * | 112 |
| G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe | * | * | * | 5'301 | * | * | * | 914 |
| G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie) | | | | | | | | |
| G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 268 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 54 |
| G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik | 77.2% | 76.7% | * | 203 | 83.3% | 82.6% | * | 45 |
| G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovariektomie | 18.8% | 12.1% | * | 22 | * | * | * | 3 |
| G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovariektomie | 48.5% | 29.7% | * | 47 | * | * | * | 9 |
| G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs | * | * | * | 363 | * | * | * | 67 |
| G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane | * | * | * | 623 | * | * | * | 115 |
| G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien | * | * | * | 124 | * | * | * | 29 |
| G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität | 0.0% | 1.5% | 0.0 | 39 | 0.0% | 1.2% | 0.0 | 15 |
| G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus | * | * | * | 104 | * | * | * | 15 |
| G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität | 2.2% | 0.5% | 4.8 | 45 | * | * | * | 6 |
| G.5 Eingriffe an der Brust | | | | | | | | |
| G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken) | * | * | * | 238 | * | * | * | 51 |
| G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs | * | * | * | 176 | * | * | * | 34 |
| G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs | 52.8% | 73.6% | * | 93 | 55.9% | 79.3% | * | 19 |
| H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie) | | | | | | | | |
| H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität | 0.0% | 1.5% | 0.0 | 35 | * | * | * | 8 |
| H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie | * | * | * | 1 | 0.0% | 31.1% | * | 0 |
| H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 16 | * | * | * | 1 |
| H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie | * | * | * | 1 | 0.0% | 48.9% | * | 0 |
| H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor | 41.2% | 38.7% | * | 14 | * | * | * | 1 |
| H.2 Nierensteine | | | | | | | | |
| H.2.1.F HD Nierensteine | * | * | * | 840 | * | * | * | 141 |
| H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine | 18.9% | 46.6% | * | 159 | 13.5% | 48.9% | * | 19 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| H.3 Eingriffe an der Harnblase | | | | | | | | |
| H.3.1.F HD Malignom der Blase | * | * | * | 291 | * | * | * | 65 |
| H.3.2.F TUR der Blase insgesamt | * | * | * | 297 | * | * | * | 60 |
| H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom | * | * | * | 210 | * | * | * | 42 |
| H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase | * | * | * | 1 | 0.0% | 13.8% | * | 0 |
| H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität | 5.3% | 3.4% | 1.6 | 19 | * | * | * | 2 |
| H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |
| H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR) | | | | | | | | |
| H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität | 1.0% | 0.2% | 5.0 | 286 | 0.0% | 0.4% | 0.0 | 41 |
| H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen | 4.2% | 1.9% | * | 12 | 0.0% | 2.1% | * | 0 |
| H.5 Prostatakarzinom | | | | | | | | |
| H.5.1.F HD Prostatakarzinom | * | * | * | 191 | * | * | * | 49 |
| H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 42 | * | * | * | 1 |
| I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | | | | | | | | |
| I.1 Gelenkersatz, Endoprothese | | | | | | | | |
| I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität | 0.2% | 0.1% | 1.8 | 1'071 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 148 |
| I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und petrochantärer Fraktur, Mortalität | 3.2% | 3.5% | 0.9 | 188 | 3.4% | 3.3% | 1.0 | 59 |
| I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität | 2.4% | 2.5% | 1.0 | 126 | 2.6% | 2.6% | 1.0 | 39 |
| I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen | 1.8% | 1.3% | * | 19 | * | * | * | 3 |
| I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität | 5.6% | 0.9% | 6.5 | 18 | 10.0% | 1.8% | 5.4 | 10 |
| I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität | 4.5% | 2.9% | 1.6 | 22 | * | * | * | 6 |
| I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 408 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 83 |
| I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 27 | * | * | * | 8 |
| I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen | * | * | * | 5 | * | * | * | 4 |
| I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität | * | * | * | 9 | * | * | * | 3 |
| I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität | * | * | * | – | * | * | * | – |
| I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität | * | * | * | 5 | * | * | * | 3 |
| I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität | 0.0% | 3.1% | 0.0 | 22 | * | * | * | 9 |
| I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark | | | | | | | | |
| I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne lokale Schmerztherapie | * | * | * | 1'558 | * | * | * | 255 |
| I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne lokale Schmerztherapie | * | * | * | 148 | * | * | * | 49 |
| I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | 5 | * | * | * | 3 |
| I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität | 9.5% | 1.8% | 5.2 | 21 | * | * | * | 4 |
| I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität | 0.9% | 0.1% | 6.2 | 436 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 112 |
| I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | – | * | * | * | – |
| I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | – | * | * | * | – |
| I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | – | * | * | * | – |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|------|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | | | | | | | | |
| I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark | | | | | | | | |
| I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 325 | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 37 |
| I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität | 1.1% | 0.1% | 8.0 | 87 | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 10 |
| I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität | 0.8% | 0.5% | 1.6 | 366 | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 55 |
| I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität | 3.3% | 1.3% | 2.6 | 332 | 5.4% | 1.8% | 3.0 | 37 |
| I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule) | * | * | * | 5 | * | * | * | 1 |
| I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule | * | * | * | 122 | * | * | * | 32 |
| I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule | * | * | * | 1'538 | * | * | * | 350 |
| I.3 Hüftgelenknahe Frakturen | | | | | | | | |
| I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität | 4.0% | 4.0% | 1.0 | 805 | 2.9% | 3.5% | 0.8 | 175 |
| I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität | 0.0% | 0.3% | 0.0 | 66 | 5.9% | 0.3% | 17.5 | 17 |
| I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität | 0.0% | 1.0% | 0.0 | 83 | 0.0% | 1.2% | 0.0 | 19 |
| I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität | 1.3% | 2.0% | 0.6 | 159 | 2.9% | 1.9% | 1.5 | 35 |
| I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität | 3.6% | 3.9% | 0.9 | 165 | 0.0% | 2.3% | 0.0 | 42 |
| I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität | 7.9% | 4.9% | 1.6 | 178 | 2.7% | 4.6% | 0.6 | 37 |
| I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität | 6.5% | 8.3% | 0.8 | 154 | 8.0% | 10.1% | 0.8 | 25 |
| I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität | 2.9% | 3.5% | 0.8 | 857 | 2.1% | 3.8% | 0.6 | 189 |
| I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | | | | | | | | |
| I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen | * | * | * | 55 | * | * | * | 6 |
| J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review) | | | | | | | | |
| J.1 Beatmung | | | | | | | | |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität | 25.3% | 26.8% | 0.9 | 1'343 | 30.0% | 25.6% | 1.2 | 170 |
| J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität | 25.7% | 27.2% | 0.9 | 1'213 | 31.4% | 26.3% | 1.2 | 153 |
| J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene) | 124.5 | * | * | 1'343 | 129.8 | * | * | 170 |
| J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene) | 40.0% | 43.1% | * | 136 | 38.5% | 41.8% | * | 15 |
| J.2 Sepsis | | | | | | | | |
| J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität | 22.8% | 17.2% | 1.3 | 999 | 36.5% | 22.1% | 1.7 | 137 |
| J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität | 37.3% | 27.6% | 1.4 | 498 | 36.8% | 22.9% | 1.6 | 133 |
| J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität | 8.4% | 6.2% | 1.4 | 501 | * | * | * | 4 |
| J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität | 20.8% | 17.5% | 1.2 | 1'135 | 13.7% | 12.0% | 1.1 | 350 |
| J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität | 42.4% | 40.9% | 1.0 | 314 | 33.3% | 36.7% | 0.9 | 78 |
| K Hautkrankheiten | | | | | | | | |
| K.1 Hautkrankheiten | | | | | | | | |
| K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom | * | * | * | 42 | * | * | * | 9 |
| K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem | * | * | * | 123 | * | * | * | 23 |
| K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis | * | * | * | 17 | * | * | * | 2 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | | | 2016 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| L Transplantationen | | | | | | | | |
| L.1 Herztransplantationen | | | | | | | | |
| L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.1.3.F Herztransplantation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.2 Lungentransplantationen | | | | | | | | |
| L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.2.2.F Lungentransplantation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3 Lebertransplantationen | | | | | | | | |
| L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3.2.F Lebertransplantation, komplett | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.4 Pankreastransplantationen | | | | | | | | |
| L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5 Nierentransplantationen | | | | | | | | |
| L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen | | | | | | | | |
| L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.8.F Andere Stammzelltherapien | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppen | 2011–2015 | | 2016 | |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | Aufenthaltsdauer (Tage) | Fallzahl | Aufenthaltsdauer (Tage) | Fallzahl |
| Z Zusatzinformationen | | | | |
| Z.1 Aufenthaltsdauer | | | | |
| A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 8.5 | 2'340 | 7.9 | 451 |
| B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 16.4 | 1'435 | 14.1 | 361 |
| E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer | 3.7 | 1'141 | 4.2 | 232 |
| E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer | 3.7 | 926 | 4.1 | 152 |
| F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 9.2 | 130 | 8.9 | 18 |
| G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer | 4.4 | 268 | 4.4 | 54 |
| H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer | 6.6 | 286 | 6.4 | 41 |
| I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 8.3 | 1'068 | 9.0 | 143 |
| I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 10.0 | 406 | 10.2 | 82 |
| Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer | 2.1 | 265 | 2.0 | 29 |