

# Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>A Erkrankungen des Herzens</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>A.1 Herzinfarkt</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität   | 4.7%           | 6.4%         | 0.7 | 494      | 2.8%           | 5.8%         | 0.5 | 106      |
| A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität  | 0.0%           | 1.3%         | 0.0 | 21       | *              | *            | *   | 2        |
| A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität  | 0.0%           | 1.9%         | 0.0 | 163      | 2.3%           | 1.7%         | 1.3 | 44       |
| A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität  | 2.7%           | 6.3%         | 0.4 | 225      | 0.0%           | 5.5%         | 0.0 | 39       |
| A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität  | 20.0%          | 16.6%        | 1.2 | 85       | 9.5%           | 15.3%        | 0.6 | 21       |
| A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19)                            | *              | *            | *   | 5        | 0.0%           | 63.2%        | *   | 0        |
| A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität                             | 8.2%           | 9.0%         | 0.9 | 281      | 5.4%           | 8.7%         | 0.6 | 56       |
| A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität  | 0.0%           | 4.1%         | 0.0 | 90       | 0.0%           | 3.2%         | 0.0 | 24       |
| A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)  | 4.9%           | 2.4%         | *   | 24       | *              | *            | *   | 4        |
| A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität  | 3.2%           | 7.2%         | 0.4 | 216      | 2.1%           | 7.3%         | 0.3 | 47       |
| A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität  | 4.7%           | 4.7%         | 1.0 | 254      | 1.8%           | 4.2%         | 0.4 | 55       |
| <b>A.2 Herzinsuffizienz</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität  | 8.9%           | 8.7%         | 1.0 | 654      | 9.3%           | 8.2%         | 1.1 | 194      |
| A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität   | *              | *            | *   | 7        | *              | *            | *   | 0        |
| A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität   | 9.5%           | 3.6%         | 2.6 | 42       | 9.1%           | 3.6%         | 2.6 | 11       |
| A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität   | 8.3%           | 7.3%         | 1.1 | 373      | 6.9%           | 6.6%         | 1.1 | 101      |
| A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität   | 9.9%           | 12.2%        | 0.8 | 232      | 12.2%          | 10.9%        | 1.1 | 82       |
| A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)  | 49.7%          | 52.3%        | *   | 82       | *              | *            | *   | 4        |
| <b>A.3 Herzkatheter</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)  | *              | *            | *   | 11       | *              | *            | *   | 9        |
| A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität                 | *              | *            | *   | 5        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 7        |
| A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität    | *              | *            | *   | 5        | *              | *            | *   | 7        |
| A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 2        |
| A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)      | 0.0%           | 38.5%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 2        |
| A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 2        |
| A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen   | *              | *            | *   | 601      | *              | *            | *   | 118      |
| <b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>                                       |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)                              | *              | *            | *   | 112      | *              | *            | *   | 29       |
| A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators   | *              | *            | *   | 8        | *              | *            | *   | 1        |
| <b>A.6 Ablative Therapie</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>A Erkrankungen des Herzens</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>A.7 Operationen am Herzen</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.7.1.F OP am Herzen insgesamt   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.2.F OP an Herzklappen  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.3.F OP an Koronargefässen  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.4.F Andere OP am Herzen  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität                       | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität                           | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität                           | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität                              | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität                              | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität                             | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität                            | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität                            | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität                            | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität                            | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität                              | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)         | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen         | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>B.1 Schlaganfall</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität  | 9.7%           | 10.6%        | 0.9 | 454      | 10.8%          | 10.1%        | 1.1 | 83       |
| B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität   | 0.0%           | 3.4%         | 0.0 | 15       | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität   | 0.0%           | 4.8%         | 0.0 | 80       | *              | *            | *   | 9        |
| B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität   | 8.7%           | 9.5%         | 0.9 | 252      | 8.2%           | 8.4%         | 1.0 | 49       |
| B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität   | 20.6%          | 18.8%        | 1.1 | 107      | 20.0%          | 15.7%        | 1.3 | 25       |
| B.1.6.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)                                      | 0.0%           | 24.8%        | *   | 0        | 0.0%           | 41.2%        | *   | 0        |
| B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität  | 6.0%           | 7.5%         | 0.8 | 268      | 8.8%           | 6.7%         | 1.3 | 68       |
| B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität                                   | 4.8%           | 7.6%         | 0.6 | 231      | 8.3%           | 7.0%         | 1.2 | 60       |
| B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität                                    | 13.5%          | 7.2%         | 1.9 | 37       | *              | *            | *   | 8        |
| B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität                       | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse                            | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität                                     | 25.0%          | 25.1%        | 1.0 | 28       | 25.0%          | 24.7%        | 1.0 | 12       |
| B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie  | 10.4%          | 8.3%         | *   | 28       | 17.6%          | 7.9%         | *   | 12       |
| B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität  | 22.0%          | 26.6%        | 0.8 | 59       | *              | *            | *   | 9        |
| B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität   | 4.2%           | 16.0%        | 0.3 | 24       | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität   | 13.6%          | 9.0%         | 1.5 | 103      | *              | *            | *   | 6        |
| B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)  | 22.7%          | 7.2%         | *   | 103      | *              | *            | *   | 6        |

# Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |          |            | 2016           |              |          |           |
|--|----------------|--------------|----------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR      | Fallzahl   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR      | Fallzahl  |
| <b>B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)</b>                                 |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>   |                |              |          |            |                |              |          |           |
| B.2.1.M TIA, Mortalität  | 0.0%           | 0.3%         | 0.0      | 190        | 0.0%           | 0.1%         | 0.0      | 38        |
| <i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>   | <i>0.0%</i>    | <i>14.4%</i> | <i>*</i> | <i>0</i>   | <i>0.0%</i>    | <i>32.8%</i> | <i>*</i> | <i>0</i>  |
| <b>B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</b>                               |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <i>B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</i>                        | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>12</i>  | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>4</i>  |
| B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität                                   | *              | *            | *        | 0          | *              | *            | *        | 0         |
| <b>B.4 Epilepsie</b>   |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <i>B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter &gt;19)</i>                       | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>216</i> | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>36</i> |
| <i>B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter &lt;20)</i>                       | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>28</i>  | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>4</i>  |
| <b>B.5 Multiple Sklerose</b>   |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <i>B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose</i>                              | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>18</i>  | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>3</i>  |
| <b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>   |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>   |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>   | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>316</i> | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>33</i> |
| <i>C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index</i>                        | <i>87.7%</i>   | <i>66.2%</i> | <i>*</i> | <i>277</i> | <i>90.9%</i>   | <i>68.0%</i> | <i>*</i> | <i>30</i> |
| <i>C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme</i>                                       | <i>46.4</i>    | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>277</i> | <i>39.3</i>    | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>30</i> |
| <b>D Erkrankungen der Lunge</b>  |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>  |                |              |          |            |                |              |          |           |
| D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität   | 3.5%           | 5.7%         | 0.6      | 969        | 4.1%           | 4.8%         | 0.8      | 222       |
| D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität  | 0.0%           | 0.6%         | 0.0      | 33         | *              | *            | *        | 8         |
| D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität  | 0.0%           | 0.7%         | 0.0      | 58         | 0.0%           | 0.3%         | 0.0      | 14        |
| D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität  | 2.9%           | 2.8%         | 1.1      | 170        | 2.7%           | 1.8%         | 1.5      | 37        |
| D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität  | 3.3%           | 5.6%         | 0.6      | 481        | 1.9%           | 4.3%         | 0.4      | 107       |
| D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität  | 5.7%           | 9.9%         | 0.6      | 227        | 10.7%          | 9.6%         | 1.1      | 56        |
| D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität   | 0.0%           | 0.6%         | 0.0      | 32         | *              | *            | *        | 8         |
| D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität    | 3.1%           | 4.8%         | 0.7      | 801        | 4.2%           | 4.2%         | 1.0      | 189       |
| D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität  | 0.0%           | 0.5%         | 0.0      | 57         | 0.0%           | 0.3%         | 0.0      | 12        |
| D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 0.7%           | 1.3%         | 0.5      | 141        | 2.9%           | 0.7%         | 3.9      | 35        |
| D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 3.3%           | 4.2%         | 0.8      | 392        | 1.1%           | 3.2%         | 0.4      | 89        |
| D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität   | 5.2%           | 9.4%         | 0.6      | 211        | 11.3%          | 9.1%         | 1.2      | 53        |
| <b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)</b>  |                |              |          |            |                |              |          |           |
| D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität  | 4.4%           | 4.5%         | 1.0      | 295        | 1.4%           | 4.0%         | 0.3      | 72        |
| D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität                                  | 5.6%           | 7.3%         | 0.8      | 36         | 0.0%           | 5.7%         | 0.0      | 15        |
| D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität                                | 12.5%          | 3.7%         | 3.4      | 48         | 0.0%           | 3.1%         | 0.0      | 16        |
| D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität                                | 0.0%           | 1.6%         | 0.0      | 37         | 0.0%           | 2.7%         | 0.0      | 10        |
| D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität                                  | *              | *            | *        | 8          | *              | *            | *        | 1         |
| D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität                              | 3.0%           | 4.2%         | 0.7      | 166        | 3.3%           | 2.9%         | 1.1      | 30        |
| <i>D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter &gt;19)</i>                         | <i>56.3%</i>   | <i>27.7%</i> | <i>*</i> | <i>166</i> | <i>41.7%</i>   | <i>20.9%</i> | <i>*</i> | <i>30</i> |
| <b>D.3 Lungenkrebs</b>   |                |              |          |            |                |              |          |           |
| <i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs</i>                                    | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>191</i> | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>82</i> |
| <b>D.4 Operationen an der Lunge</b>  |                |              |          |            |                |              |          |           |
| D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität                    | *              | *            | *        | 7          | *              | *            | *        | 1         |
| D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität                                      | *              | *            | *        | 0          | *              | *            | *        | 0         |
| <i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>                                    | <i>0.0%</i>    | <i>7.5%</i>  | <i>*</i> | <i>0</i>   | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>0</i>  |
| D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität                              | *              | *            | *        | 1          | *              | *            | *        | 0         |
| <i>D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom</i>                          | <i>0.0%</i>    | <i>6.3%</i>  | <i>*</i> | <i>0</i>   | <i>*</i>       | <i>*</i>     | <i>*</i> | <i>0</i>  |
| D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität   | *              | *            | *        | 5          | *              | *            | *        | 0         |

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>E Erkrankungen der Bauchorgane</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität   | 0.0%           | 0.2%         | 0.0 | 503      | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 114      |
| <i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>                      | 89.3%          | 94.8%        | *   | 449      | 94.7%          | 96.2%        | *   | 108      |
| <b>E.2 Hernienoperationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität  | 0.1%           | 0.1%         | 0.7 | 1'123    | 0.4%           | 0.1%         | 6.3 | 250      |
| E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität   | 8.3%           | 6.0%         | 1.4 | 12       | *              | *            | *   | 4        |
| <i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>   | *              | *            | *   | 7        | *              | *            | *   | 2        |
| <i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter &gt;19</i>   | 93.8%          | 92.9%        | *   | 766      | 97.9%          | 95.3%        | *   | 191      |
| <b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| E.3.1.F Resektion der Schilddrüse  | *              | *            | *   | 64       | *              | *            | *   | 26       |
| <i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle &gt;24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>  | 0.0%           | 0.7%         | *   | 0        | 0.0%           | 0.6%         | *   | 0        |
| E.3.3.F Radiojodtherapie   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>   | *              | *            | *   | 237      | *              | *            | *   | 53       |
| <i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>                                    | *              | *            | *   | 174      | *              | *            | *   | 35       |
| E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität  | 4.0%           | 5.6%         | 0.7 | 297      | 5.3%           | 5.0%         | 1.1 | 75       |
| E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität  | 7.2%           | 4.2%         | 1.7 | 83       | 4.5%           | 2.5%         | 1.9 | 22       |
| E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität  | 10.0%          | 12.8%        | 0.8 | 10       | *              | *            | *   | 0        |
| E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität  | 2.9%           | 3.7%         | 0.8 | 35       | *              | *            | *   | 8        |
| E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität  | 0.0%           | 0.3%         | 0.0 | 69       | 0.0%           | 0.0%         | *   | 10       |
| E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität   | 2.4%           | 5.2%         | 0.5 | 41       | 0.0%           | 3.8%         | 0.0 | 13       |
| E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität   | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 2        |
| E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität   | 5.7%           | 7.0%         | 0.8 | 53       | 15.0%          | 7.7%         | 2.0 | 20       |
| <i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>                          | *              | *            | *   | 1        | 0.0%           | 3.6%         | *   | 0        |
| E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität   | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 2        |
| <i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz</i> | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 2        |
| <b>E.5 Erkrankungen des Magens</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>  | *              | *            | *   | 48       | *              | *            | *   | 10       |
| E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität  | 4.2%           | 4.1%         | 1.0 | 95       | 0.0%           | 3.4%         | 0.0 | 24       |
| <i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.7 Operationen am Pankreas</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität                                       | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.8 Bariatrische Chirurgie</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F Gefässerkrankungen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen</i>  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |

# Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>F Gefässerkrankungen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>F.2 Erkrankungen der Aorta</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität                             | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität                    | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)                                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität                                     | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität   | 16.7%          | 40.4%        | 0.4 | 18       | *              | *            | *   | 9        |
| F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität   | 13.3%          | 5.0%         | 2.6 | 15       | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität   | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität   | *              | *            | *   | 7        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität                                     | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.4 Amputationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität   | 2.6%           | 2.7%         | 1.0 | 77       | 0.0%           | 3.2%         | 0.0 | 16       |
| F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität  | *              | *            | *   | 5        | *              | *            | *   | 2        |
| <b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)   | *              | *            | *   | 147      | *              | *            | *   | 25       |
| F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio   | *              | *            | *   | 60       | *              | *            | *   | 14       |
| F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz   | *              | *            | *   | 8        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän   | *              | *            | *   | 36       | *              | *            | *   | 5        |
| F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta  | *              | *            | *   | 43       | *              | *            | *   | 6        |
| F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien  | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.6 Arteriovenöser Shunt</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)   | *              | *            | *   | 23       | *              | *            | *   | 1        |

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>G.1 Geburten</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.1.1.F Stationäre Geburten  | *              | *            | *   | 2'841    | *              | *            | *   | 624      |
| G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten   | 0.0%           | 0.0%         | *   | 0        | 0.0%           | 0.0%         | *   | 0        |
| G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades   | 3.4%           | 3.0%         | *   | 65       | 2.3%           | 3.0%         | *   | 10       |
| G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie   | 14.0%          | 23.0%        | *   | 267      | 10.4%          | 18.7%        | *   | 45       |
| G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)  | 32.7%          | 33.1%        | *   | 929      | 30.9%          | 32.9%        | *   | 193      |
| G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt  | 28.3%          | 27.9%        | *   | 730      | 25.8%          | 27.6%        | *   | 146      |
| G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35   | 26.7%          | 25.1%        | *   | 542      | 22.4%          | 24.6%        | *   | 96       |
| G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34   | 33.9%          | 35.9%        | *   | 188      | 36.5%          | 35.5%        | *   | 50       |
| <b>G.2 Neugeborene</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.2.1.F Neugeborene <1250 g  | *              | *            | *   | 9        | *              | *            | *   | 2        |
| G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.3.F Neugeborene <500 g   | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 1        |
| G.2.4.F Neugeborene 500–749 g  | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.5.F Neugeborene 750–999 g  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g  | *              | *            | *   | 112      | *              | *            | *   | 31       |
| G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe   | *              | *            | *   | 2'800    | *              | *            | *   | 603      |
| <b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>                        |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität                                | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 396      | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 65       |
| G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik                              | 70.7%          | 76.7%        | *   | 277      | 70.8%          | 82.6%        | *   | 46       |
| G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovariektomie | 8.2%           | 12.1%        | *   | 12       | *              | *            | *   | 1        |
| G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovariektomie | 12.7%          | 29.7%        | *   | 21       | *              | *            | *   | 3        |
| <b>G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                         |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs  | *              | *            | *   | 305      | *              | *            | *   | 64       |
| G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane                             | *              | *            | *   | 553      | *              | *            | *   | 109      |
| G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien                              | *              | *            | *   | 61       | *              | *            | *   | 5        |
| G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität                                  | 0.0%           | 1.1%         | 0.0 | 19       | *              | *            | *   | 3        |
| G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus                               | *              | *            | *   | 181      | *              | *            | *   | 40       |
| G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität                                  | 0.0%           | 0.4%         | 0.0 | 49       | 0.0%           | 0.6%         | 0.0 | 16       |
| <b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)                               | *              | *            | *   | 368      | *              | *            | *   | 78       |
| G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs   | *              | *            | *   | 248      | *              | *            | *   | 52       |
| G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs  | 72.2%          | 73.6%        | *   | 179      | 76.9%          | 79.3%        | *   | 40       |
| <b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>                                    |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität  | 5.3%           | 1.6%         | 3.2 | 19       | *              | *            | *   | 4        |
| H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie   | 0.0%           | 25.1%        | *   | 0        | 0.0%           | 31.1%        | *   | 0        |
| H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität   | 0.0%           | 0.2%         | 0.0 | 15       | *              | *            | *   | 4        |
| H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie  | 0.0%           | 36.7%        | *   | 0        | 0.0%           | 48.9%        | *   | 0        |
| H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor  | *              | *            | *   | 8        | *              | *            | *   | 3        |
| <b>H.2 Nierensteine</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.2.1.F HD Nierensteine  | *              | *            | *   | 510      | *              | *            | *   | 132      |
| H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine                            | 35.3%          | 46.6%        | *   | 180      | 45.5%          | 48.9%        | *   | 60       |

# Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.3.1.F HD Malignom der Blase  | *              | *            | *   | 269      | *              | *            | *   | 47       |
| H.3.2.F TUR der Blase insgesamt  | *              | *            | *   | 340      | *              | *            | *   | 54       |
| H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom   | *              | *            | *   | 227      | *              | *            | *   | 37       |
| H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase  | 6.2%           | 12.3%        | *   | 14       | 0.0%           | 13.8%        | *   | 0        |
| H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität   | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität   | 0.2%           | 0.2%         | 1.1 | 524      | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 124      |
| H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen   | *              | *            | *   | 9        | *              | *            | *   | 2        |
| <b>H.5 Prostatakarzinom</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.5.1.F HD Prostatakarzinom  | *              | *            | *   | 331      | *              | *            | *   | 77       |
| H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität  | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 119      | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 30       |
| <b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>I.1 Gelenkersatz, Endoprothese</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität  | 0.1%           | 0.1%         | 1.6 | 782      | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 192      |
| I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität  | 1.7%           | 3.7%         | 0.5 | 58       | 0.0%           | 3.8%         | 0.0 | 22       |
| I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität   | 5.5%           | 2.0%         | 2.7 | 55       | 0.0%           | 2.6%         | 0.0 | 20       |
| I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen                             | 1.5%           | 1.3%         | *   | 12       | 0.0%           | 1.2%         | *   | 0        |
| I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität   | *              | *            | *   | 9        | 0.0%           | 0.9%         | 0.0 | 13       |
| I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität   | *              | *            | *   | 9        | 0.0%           | 0.7%         | 0.0 | 11       |
| I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität   | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 160      | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 151      |
| I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität   | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 18       | *              | *            | *   | 7        |
| I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen                             | 0.0%           | 1.2%         | *   | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität   | *              | *            | *   | 9        | *              | *            | *   | 7        |
| I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität   | *              | *            | *   | –        | *              | *            | *   | –        |
| I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität   | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 1        |
| I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität   | 0.0%           | 3.9%         | 0.0 | 14       | *              | *            | *   | 2        |
| I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne lokale Schmerztherapie   | *              | *            | *   | 594      | *              | *            | *   | 257      |
| I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne lokale Schmerztherapie  | *              | *            | *   | 15       | *              | *            | *   | 6        |
| I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität                          | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität    | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität   | 0.5%           | 0.2%         | 2.5 | 202      | 0.0%           | 0.2%         | 0.0 | 60       |
| I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität      | *              | *            | *   | –        | *              | *            | *   | –        |
| I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität      | *              | *            | *   | –        | *              | *            | *   | –        |
| I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | *              | *            | *   | –        | *              | *            | *   | –        |

| Krankheitsgruppen   | 2011–2015      |              |      |          | 2016           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|------|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR  | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| <b>I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität   | 0.9%           | 0.1%         | 14.1 | 114      | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 47       |
| I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität  | 0.0%           | 0.1%         | 0.0  | 45       | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 63       |
| I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität | 0.0%           | 0.6%         | 0.0  | 128      | 0.0%           | 0.4%         | 0.0 | 58       |
| I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität  | 0.0%           | 1.1%         | 0.0  | 104      | 3.3%           | 1.3%         | 2.7 | 30       |
| I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)                                   | 0.0%           | 0.5%         | *    | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule  | *              | *            | *    | 90       | *              | *            | *   | 1        |
| I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule                            | *              | *            | *    | 489      | *              | *            | *   | 137      |
| <b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität   | 4.0%           | 3.5%         | 1.1  | 303      | 0.0%           | 3.1%         | 0.0 | 63       |
| I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität  | 0.0%           | 0.2%         | 0.0  | 52       | 0.0%           | 0.2%         | 0.0 | 16       |
| I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität  | 0.0%           | 0.9%         | 0.0  | 32       | *              | *            | *   | 7        |
| I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität  | 1.9%           | 1.9%         | 1.0  | 52       | 0.0%           | 2.3%         | 0.0 | 12       |
| I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität  | 3.6%           | 3.8%         | 1.0  | 55       | *              | *            | *   | 9        |
| I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität  | 6.0%           | 5.3%         | 1.1  | 67       | *              | *            | *   | 8        |
| I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität  | 11.1%          | 8.4%         | 1.3  | 45       | 0.0%           | 9.1%         | 0.0 | 11       |
| I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität  | 4.5%           | 3.5%         | 1.3  | 291      | 2.8%           | 3.6%         | 0.8 | 72       |
| <b>I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen                             | *              | *            | *    | 4        | *              | *            | *   | 2        |
| <b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| <b>J.1 Beatmung</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität   | 20.0%          | 30.5%        | 0.7  | 420      | 23.8%          | 31.1%        | 0.8 | 80       |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität  | 19.1%          | 31.0%        | 0.6  | 383      | 26.4%          | 32.0%        | 0.8 | 72       |
| J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)  | 122.6          | *            | *    | 420      | 127.1          | *            | *   | 80       |
| J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)  | 45.4%          | 43.1%        | *    | 49       | *              | *            | *   | 4        |
| <b>J.2 Sepsis</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität   | 15.3%          | 17.7%        | 0.9  | 399      | 26.7%          | 21.0%        | 1.3 | 75       |
| J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität  | 30.1%          | 29.3%        | 1.0  | 173      | 31.5%          | 21.9%        | 1.4 | 54       |
| J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität   | 4.0%           | 6.2%         | 0.6  | 226      | 14.3%          | 11.9%        | 1.2 | 21       |
| J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität   | 12.0%          | 17.3%        | 0.7  | 416      | 9.0%           | 11.1%        | 0.8 | 133      |
| J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität  | 28.9%          | 42.0%        | 0.7  | 97       | *              | *            | *   | 8        |
| <b>K Hautkrankheiten</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| <b>K.1 Hautkrankheiten</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom  | *              | *            | *    | 23       | *              | *            | *   | 3        |
| K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem   | *              | *            | *    | 53       | *              | *            | *   | 10       |
| K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis  | *              | *            | *    | 2        | *              | *            | *   | 3        |



# Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

| Krankheitsgruppen   | 2011–2015      |              |     |          | 2016           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>L Transplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>L.1 Herztransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt                             | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.1.3.F Herztransplantation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.2 Lungentransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt                           | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.2.2.F Lungentransplantation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.3 Lebertransplantationen</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.3.2.F Lebertransplantation, komplett  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere                              | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen                 | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.4 Pankreastransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt                         | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.5 Nierentransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen                        | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere                                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere                       | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas                          | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen</b>                            |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen                     | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen            | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.8.F Andere Stammzelltherapien   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen  | 2011–2015               |          | 2016                    |          |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
|  | Aufenthaltsdauer (Tage) | Fallzahl | Aufenthaltsdauer (Tage) | Fallzahl |
| <b>Z Zusatzinformationen</b>   |                         |          |                         |          |
| <b>Z.1 Aufenthaltsdauer</b>  |                         |          |                         |          |
| A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer  | 5.5                     | 488      | 5.0                     | 105      |
| B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer   | 8.8                     | 226      | 8.6                     | 62       |
| E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer                                       | 4.2                     | 503      | 3.4                     | 114      |
| E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer  | 2.0                     | 1'123    | 1.9                     | 250      |
| F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer   | *                       | 0        | *                       | 0        |
| G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer  | 4.0                     | 396      | 3.5                     | 65       |
| H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer   | 3.9                     | 524      | 3.7                     | 124      |
| I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 6.0                     | 782      | 5.4                     | 192      |
| I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 6.4                     | 160      | 5.6                     | 151      |
| Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer   | 2.1                     | 353      | 2.2                     | 81       |