

| Krankheitsgruppen  | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>A Erkrankungen des Herzens</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>A.1 Herzinfarkt</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 1        |
| A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität                             | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)                                       | 0.0%           | 61.4%        | *   | 0        | 0.0%           | 64.0%        | *   | 0        |
| A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen                      | 0.0%           | 57.9%        | *   | 0        | 0.0%           | 60.4%        | *   | 0        |
| A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen                        | 0.0%           | 71.4%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen          | 0.0%           | 58.5%        | *   | 0        | 0.0%           | 60.8%        | *   | 0        |
| A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)  | 0.0%           | 1.9%         | *   | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)   | *              | *            | *   | 3        | 0.0%           | 40.6%        | *   | 0        |
| A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 1        |
| <b>A.2 Herzinsuffizienz</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität  | 5.7%           | 7.3%         | 0.8 | 53       | *              | *            | *   | 7        |
| A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität   | *              | *            | *   | 5        | *              | *            | *   | 0        |
| A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität   | 3.2%           | 6.1%         | 0.5 | 31       | *              | *            | *   | 3        |
| A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität   | 11.8%          | 10.3%        | 1.1 | 17       | *              | *            | *   | 4        |
| A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)  | *              | *            | *   | 5        | 0.0%           | 56.3%        | *   | 0        |
| <b>A.3 Herzkatheter</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität                 | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität    | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)      | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen   | *              | *            | *   | 7        | *              | *            | *   | 4        |

| Krankheitsgruppen   | 2013–2017         |                 |     |               | 2018              |                 |     |               |
|---|-------------------|-----------------|-----|---------------|-------------------|-----------------|-----|---------------|
|   | beobacht.<br>Rate | erwart.<br>Rate | SMR | Fall-<br>zahl | beobacht.<br>Rate | erwart.<br>Rate | SMR | Fall-<br>zahl |
| <b>A Erkrankungen des Herzens</b>   |                   |                 |     |               |                   |                 |     |               |
| <b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>  |                   |                 |     |               |                   |                 |     |               |
| A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| <b>A.6 Ablative Therapie</b>  |                   |                 |     |               |                   |                 |     |               |
| A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| <b>A.7 Operationen am Herzen</b>  |                   |                 |     |               |                   |                 |     |               |
| A.7.1.F OP am Herzen insgesamt  | *                 | *               | *   | 1             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.2.F OP an Herzklappen   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.3.F OP an Koronargefässen   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.4.F Andere OP am Herzen   | *                 | *               | *   | 1             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität                                  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität             | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität            | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität                     | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität   | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität  | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)                                | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)                    | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |
| A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)                                       | *                 | *               | *   | 0             | *                 | *               | *   | 0             |

| Krankheitsgruppen   | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)</b>                              |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>B.1 Schlaganfall</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität                                 | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 2        |
| B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität                                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität                                | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität                                | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 2        |
| B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität                                  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.19.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Direktaufnahmen     | 0.0%           | 36.9%        | *   | 0        | 0.0%           | 42.6%        | *   | 0        |
| B.1.20.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Zuverlegungen       | 0.0%           | 25.9%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität                                     | *              | *            | *   | 5        | *              | *            | *   | 2        |
| B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität                    | *              | *            | *   | 5        | *              | *            | *   | 2        |
| B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität                     | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen | 0.0%           | 3.0%         | *   | 0        | 0.0%           | 3.3%         | *   | 0        |
| B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität        | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse             | 0.0%           | 12.5%        | *   | 0        | 0.0%           | 11.8%        | *   | 0        |
| B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie       | 0.0%           | 4.4%         | *   | 0        | 0.0%           | 6.8%         | *   | 0        |
| B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität                      | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie                           | 0.0%           | 7.9%         | *   | 0        | 0.0%           | 6.8%         | *   | 0        |
| B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität                         | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität                          | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität                          | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)                               | 0.0%           | 5.3%         | *   | 0        | 0.0%           | 4.2%         | *   | 0        |
| <b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| B.2.1.M TIA, Mortalität   | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 0        |
| B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung   | 0.0%           | 25.6%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</b>                            |                |              |     |          |                |              |     |          |
| B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute                            | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 0        |
| B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität                                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>B.4 Epilepsie</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)                              | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)                              | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>B.5 Multiple Sklerose</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose                                  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen   | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>C Altersmedizin</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>C.2 Mangelernährung bei Älteren</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64   | *              | *            | *   | 7        | *              | *            | *   | 4        |
| C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64 | 0.0%           | 10.9%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| <b>D Erkrankungen der Lunge</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität  | 5.3%           | 5.3%         | 1.0 | 76       | 9.5%           | 4.8%         | 2.0 | 21       |
| D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 2        |
| D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität   | 4.2%           | 2.9%         | 1.4 | 24       | *              | *            | *   | 2        |
| D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität   | 7.1%           | 5.6%         | 1.3 | 42       | 8.3%           | 4.5%         | 1.9 | 12       |
| D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität   | *              | *            | *   | 9        | *              | *            | *   | 4        |
| D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität                                      | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität                                       | 6.2%           | 3.3%         | 1.9 | 32       | 11.1%          | 3.5%         | 3.2 | 18       |
| D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität                                     | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität                                    | *              | *            | *   | 8        | *              | *            | *   | 1        |
| D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität                                    | 10.0%          | 3.4%         | 2.9 | 20       | 8.3%           | 2.5%         | 3.3 | 12       |
| D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität                                      | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 4        |
| D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 9        | *              | *            | *   | 4        |
| D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 3        |
| D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)  | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 3        |
| <b>D.3 Lungenkrebs</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs  | *              | *            | *   | 124      | *              | *            | *   | 22       |
| <b>D.4 Operationen an der Lunge</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 2        |
| D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen   | 2013–2017      |              |      |          | 2018           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|------|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR  | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>E Erkrankungen der Bauchorgane</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| <b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität  | 0.0%           | 0.0%         | 0.0  | 160      | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 54       |
| <i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>   | 100.0%         | 95.8%        | *    | 160      | 100.0%         | 96.9%        | *   | 54       |
| <b>E.2 Hernienoperationen</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität   | 0.0%           | 0.1%         | 0.0  | 541      | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 128      |
| E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität  | *              | *            | *    | 4        | *              | *            | *   | 1        |
| <i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>  | *              | *            | *    | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter &gt;19</i>  | 96.4%          | 95.0%        | *    | 322      | 100.0%         | 98.1%        | *   | 76       |
| <b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| E.3.1.F Resektion der Schilddrüse   | *              | *            | *    | 1        | *              | *            | *   | 2        |
| <i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle &gt;24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>   | 0.0%           | 0.4%         | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse</i>  | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse</i>  | *              | *            | *    | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.3.3.F Radiojodtherapie</i>   | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| <i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>  | *              | *            | *    | 176      | *              | *            | *   | 14       |
| <i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>   | *              | *            | *    | 32       | *              | *            | *   | 3        |
| E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität   | 1.0%           | 4.2%         | 0.2  | 101      | 3.6%           | 4.1%         | 0.9 | 28       |
| E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität   | 0.0%           | 2.1%         | 0.0  | 44       | 0.0%           | 1.6%         | 0.0 | 10       |
| E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität   | *              | *            | *    | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität   | *              | *            | *    | 4        | *              | *            | *   | 0        |
| E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität   | 0.0%           | 0.2%         | 0.0  | 14       | *              | *            | *   | 5        |
| E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität  | *              | *            | *    | 3        | *              | *            | *   | 4        |
| E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität  | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität   | *              | *            | *    | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität  | 3.1%           | 5.4%         | 0.6  | 32       | *              | *            | *   | 9        |
| <i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>   | 0.0%           | 3.3%         | *    | 0        | 0.0%           | 3.3%         | *   | 0        |
| E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität   | *              | *            | *    | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i> | *              | *            | *    | 3        | 0.0%           | 5.3%         | *   | 0        |
| E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität  | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>  | 0.0%           | 9.4%         | *    | 0        | 0.0%           | 9.3%         | *   | 0        |
| <b>E.5 Erkrankungen des Magens</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| <i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>   | *              | *            | *    | 61       | *              | *            | *   | 7        |
| E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität   | *              | *            | *    | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>   | *              | *            | *    | 24       | *              | *            | *   | 2        |
| E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität   | 7.7%           | 2.5%         | 3.1  | 13       | *              | *            | *   | 1        |
| E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität  | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität  | 9.1%           | 0.7%         | 13.5 | 11       | *              | *            | *   | 1        |
| <b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität   | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.7 Operationen am Pankreas</b>  |                |              |      |          |                |              |     |          |
| E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *    | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *    | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>E.8 Bariatrische Eingriffe</b>   |                |              |      |          |                |              |     |          |
| E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität  | *              | *            | *    | 5        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen  | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>F Gefässerkrankungen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien oder bei HNO-Malignom (Alter >19)                   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.2 Erkrankungen der Aorta</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität                             | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität                    | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)                                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität                                     | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität                                     | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.4 Amputationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität   | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 2        |
| F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.4.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.5.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.6.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.7.F PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>F.6 Arteriovenöser Shunt</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen  | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>G.1 Geburten</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.1.1.F Stationäre Geburten  | *              | *            | *   | 3'977    | *              | *            | *   | 782      |
| G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten   | 0.0%           | 0.0%         | *   | 0        | 0.0%           | 0.0%         | *   | 0        |
| G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades   | 0.5%           | 3.0%         | *   | 11       | *              | *            | *   | 2        |
| G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie   | 21.8%          | 19.9%        | *   | 530      | 15.0%          | 14.5%        | *   | 75       |
| G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)  | 39.0%          | 32.9%        | *   | 1'551    | 36.1%          | 31.8%        | *   | 282      |
| G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt  | 34.1%          | 27.6%        | *   | 1'203    | 30.1%          | 26.6%        | *   | 212      |
| G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35   | 28.4%          | 24.8%        | *   | 637      | 24.7%          | 23.7%        | *   | 106      |
| G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34   | 44.0%          | 35.4%        | *   | 566      | 38.5%          | 33.8%        | *   | 106      |
| <b>G.2 Neugeborene</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.2.1.F Neugeborene <1250 g  | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.3.F Neugeborene <500 g   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.4.F Neugeborene 500–749 g  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.5.F Neugeborene 750–999 g  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g  | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 1        |
| G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g  | *              | *            | *   | 252      | *              | *            | *   | 50       |
| G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe   | *              | *            | *   | 3'826    | *              | *            | *   | 744      |
| <b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>                        |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität                                | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 447      | 0.0%           | 0.1%         | 0.0 | 105      |
| G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik                              | 73.5%          | 80.4%        | *   | 325      | 84.8%          | 85.8%        | *   | 89       |
| G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik  | 44.3%          | 41.0%        | *   | 196      | 28.6%          | 35.2%        | *   | 30       |
| G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik                                       | 29.2%          | 39.4%        | *   | 129      | 56.2%          | 50.6%        | *   | 59       |
| G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovariektomie | 17.8%          | 11.9%        | *   | 27       | *              | *            | *   | 7        |
| G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovariektomie | 46.7%          | 33.1%        | *   | 70       | 65.1%          | 34.9%        | *   | 28       |
| <b>G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>                         |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs  | *              | *            | *   | 794      | *              | *            | *   | 129      |
| G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane                             | *              | *            | *   | 1'032    | *              | *            | *   | 159      |
| G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien                              | *              | *            | *   | 83       | *              | *            | *   | 12       |
| G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität                                  | 0.0%           | 0.8%         | 0.0 | 25       | *              | *            | *   | 7        |
| G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus                               | *              | *            | *   | 146      | *              | *            | *   | 15       |
| G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität                                  | 0.0%           | 0.4%         | 0.0 | 43       | *              | *            | *   | 9        |
| <b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)                               | *              | *            | *   | 1'653    | *              | *            | *   | 333      |
| G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs   | *              | *            | *   | 606      | *              | *            | *   | 105      |
| G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs  | 73.1%          | 72.5%        | *   | 443      | 71.4%          | 73.7%        | *   | 75       |
| <b>G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt                               | *              | *            | *   | 222      | *              | *            | *   | 38       |
| G.6.2.F OP bei Genitalprolaps  | *              | *            | *   | 140      | *              | *            | *   | 22       |
| G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps  | *              | *            | *   | 65       | *              | *            | *   | 15       |
| G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose  | *              | *            | *   | 17       | *              | *            | *   | 1        |

| Krankheitsgruppen   | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>                                      | 0.0%           | 36.4%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>              | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>                         | 0.0%           | 27.9%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>H.2 Nierensteine</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.2.1.F HD Nierensteine   | *              | *            | *   | 4        | *              | *            | *   | 1        |
| <i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i>                                    | 0.0%           | 48.5%        | *   | 0        | 0.0%           | 49.8%        | *   | 0        |
| <b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.3.1.F HD Malignom der Blase   | *              | *            | *   | 31       | *              | *            | *   | 4        |
| H.3.2.F TUR der Blase insgesamt   | *              | *            | *   | 15       | *              | *            | *   | 0        |
| <i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i>   | *              | *            | *   | 12       | *              | *            | *   | 0        |
| <i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i>                              | 0.0%           | 13.6%        | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>                                    |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i>   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>H.5 Prostatakarzinom</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| H.5.1.F HD Prostatakarzinom   | *              | *            | *   | 16       | *              | *            | *   | 4        |
| H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>I.1 Gelenkersatz, Endoprothese</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität                       | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität                   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i> | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität                        | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |



| Krankheitsgruppen   | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>I.1 Gelenkersatz, Endoprothese</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>                               | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <i>I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i>   | *              | *            | *   | 69       | *              | *            | *   | 2        |
| <i>I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i>  | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 1        |
| I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität                                   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität             | *              | *            | *   | 3        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität               | 0.0%           | 0.0%         | 0.0 | 19       | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität               | *              | *            | *   | 9        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität          | 0.0%           | 0.2%         | 0.0 | 14       | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität   | 0.0%           | 0.0%         | *   | 10       | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität  | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 0        |
| I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität | *              | *            | *   | 2        | *              | *            | *   | 1        |
| I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität  | *              | *            | *   | 6        | *              | *            | *   | 1        |
| <i>I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)</i>                            | 0.0%           | 0.5%         | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <i>I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule</i>   | *              | *            | *   | 22       | *              | *            | *   | 10       |
| <i>I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule</i>                     | *              | *            | *   | 51       | *              | *            | *   | 8        |
| <b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität   | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 1        |
| I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 1        |
| I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität  | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <i>I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen</i>                      | *              | *            | *   | 19       | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen   | 2013–2017      |              |     |          | 2018           |              |     |          |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
|   | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>               |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>J.1 Beatmung</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität                           | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität          | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität                   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität                  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)          | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)                  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>J.2 Sepsis</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität   | 23.5%          | 17.6%        | 1.3 | 34       | *              | *            | *   | 1        |
| J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität                          | 23.1%          | 23.5%        | 1.0 | 13       | *              | *            | *   | 1        |
| J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität                         | 23.8%          | 4.6%         | 5.2 | 21       | *              | *            | *   | 0        |
| J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität   | 31.1%          | 11.5%        | 2.7 | 61       | *              | *            | *   | 7        |
| J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität                          | 58.3%          | 39.5%        | 1.5 | 12       | *              | *            | *   | 2        |
| <b>J.3 Nierenversagen bei Kontrastmitteleinsatz</b>                                   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | *              | *            | *   | 1        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>K Hautkrankheiten</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>K.1 Hautkrankheiten</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom                                      | *              | *            | *   | 50       | *              | *            | *   | 6        |
| K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem                         | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis                                    | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L Hochspezialisierte Medizin</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| <b>L.1 Herztransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt                               | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.1.3.F Herztransplantation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.2 Lungentransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt                             | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.2.2.F Lungentransplantation   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.3 Lebertransplantationen</b>   |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.3.2.F Lebertransplantation, komplett  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere                                | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen                   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.4 Pankreastransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt                           | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.5 Nierentransplantationen</b>  |                |              |     |          |                |              |     |          |
| L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt   | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen                          | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere                                  | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere                         | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas                            | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |
| L.5.6.F Nieren-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes           | *              | *            | *   | 0        | *              | *            | *   | 0        |

| Krankheitsgruppen  | 2013–2017               |              |          |                         | 2018           |              |     |          |
|--|-------------------------|--------------|----------|-------------------------|----------------|--------------|-----|----------|
|  | beobacht. Rate          | erwart. Rate | SMR      | Fallzahl                | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| <b>L Hochspezialisierte Medizin</b>  |                         |              |          |                         |                |              |     |          |
| <b>L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen</b>   |                         |              |          |                         |                |              |     |          |
| L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt  | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt   | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen  | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen  | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen   | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| L.6.8.F Andere Stammzelltherapien  | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| <b>L.7 Hypertherme Chemotherapie</b>   |                         |              |          |                         |                |              |     |          |
| L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]   | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]   | *                       | *            | *        | 0                       | *              | *            | *   | 0        |
| <b>Z Zusatzinformationen</b>   |                         |              |          |                         |                |              |     |          |
| <b>Z.1 Aufenthaltsdauer</b>  |                         |              |          |                         |                |              |     |          |
|  | Aufenthaltsdauer (Tage) |              | Fallzahl | Aufenthaltsdauer (Tage) |                | Fallzahl     |     |          |
| A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer  | *                       |              | 3        | *                       |                | 1            |     |          |
| B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer   | *                       |              | 5        | *                       |                | 2            |     |          |
| E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer                                       | 2.6                     |              | 160      | 2.7                     |                | 54           |     |          |
| E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer  | 2.2                     |              | 541      | 2.2                     |                | 128          |     |          |
| F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer   | *                       |              | 0        | *                       |                | 0            |     |          |
| G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer  | 5.0                     |              | 447      | 4.5                     |                | 105          |     |          |
| H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer   | *                       |              | 0        | *                       |                | 0            |     |          |
| I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | *                       |              | 0        | *                       |                | 0            |     |          |
| I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | *                       |              | 0        | *                       |                | 0            |     |          |
| Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer   | 2.7                     |              | 68       | 2.3                     |                | 10           |     |          |
| <b>Z.2 Verlegungsraten</b>   |                         |              |          |                         |                |              |     |          |
|  | beobacht. Rate          | erwart. Rate | Fallzahl | beobacht. Rate          | erwart. Rate   | Fallzahl     |     |          |
| A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)  | *                       | *            | 1        | *                       | *              | 1            |     |          |
| A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)   | *                       | *            | 2        | 0.0%                    | 5.6%           | 0            |     |          |
| A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)                     | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)     | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)                      | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)   | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)  | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)   | 0.0%                    | 17.9%        | 0        | 0.0%                    | 18.0%          | 0            |     |          |
| B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)   | 0.0%                    | 14.3%        | 0        | 0.0%                    | 14.4%          | 0            |     |          |
| D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen                           | 0.0%                    | 4.0%         | 0        | *                       | *              | 2            |     |          |
| D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)   | 0.0%                    | 4.0%         | 0        | *                       | *              | 1            |     |          |
| E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt  | *                       | *            | 6        | *                       | *              | 2            |     |          |
| F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert                           | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt  | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis                     | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)  | *                       | *            | 0        | *                       | *              | 0            |     |          |
| J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis   | *                       | *            | 5        | 0.0%                    | 12.2%          | 0            |     |          |