

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.6%	4.1%	1.1	3'146	4.4%	4.0%	1.1	641
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.8%	1.2%	0.6	132	0.0%	0.1%	0.0	37
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	2.1%	1.7%	1.3	1'358	1.6%	1.6%	1.0	257
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	5.8%	5.0%	1.2	1'433	5.1%	4.8%	1.1	293
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	14.3%	14.8%	1.0	223	16.7%	13.4%	1.2	54
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	6.3%	5.8%	1.1	1'646	6.2%	5.5%	1.1	387
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.4%	2.9%	1.2	1'223	2.2%	2.9%	0.8	180
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	94.3%	62.2%	*	2'966	94.5%	64.6%	*	606
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	92.6%	58.8%	*	1'780	93.5%	61.0%	*	431
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	97.0%	72.3%	*	1'186	97.2%	76.6%	*	175
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	92.6%	59.3%	*	1'780	93.5%	61.4%	*	431
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	*	*	*	6	*	*	*	2
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.5%	5.3%	1.2	1'576	6.1%	5.4%	1.1	314
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	50.1%	41.3%	*	1'576	49.0%	41.3%	*	314
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.5%	2.7%	0.9	1'558	2.8%	2.5%	1.1	323
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	18.3%	14.8%	1.2	907	19.5%	13.4%	1.5	174
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	10.2%	7.6%	1.3	1'542	9.5%	7.0%	1.4	347
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.4%	0.0	15	*	*	*	3
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	2.1%	3.2%	0.6	191	0.0%	2.8%	0.0	34
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	9.2%	6.6%	1.4	876	8.0%	6.0%	1.3	188
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	15.7%	11.3%	1.4	460	14.8%	9.8%	1.5	122
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	76.0%	55.7%	*	554	88.3%	54.9%	*	151
<b>A.3 Herzkatheter</b>								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	7'179	*	*	*	1'086
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.5%	3.0%	1.2	2'964	3.6%	3.1%	1.2	606
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.1%	2.3%	1.4	1'186	2.3%	2.1%	1.1	175
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	23.5%	31.9%	0.7	17
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.6%	1.5%	1.1	2'500	2.8%	1.6%	1.7	289
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	4.5%	2.8%	1.6	220	0.0%	2.2%	0.0	35
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	9
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.2%	1.2%	0.9	2'215	1.9%	1.5%	1.3	263
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.9%	1.2%	1.7	1'505	1.1%	1.1%	1.0	176
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	36.7%	40.9%	*	1'505	37.6%	46.7%	*	176
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	6.0%	2.6%	2.3	83	*	*	*	6
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	5
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.2%	0.8%	1.5	1'380	1.2%	0.9%	1.3	170
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	6	*	*	*	1
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	1'475	*	*	*	400

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	1'128	*	*	*	236
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	301	*	*	*	62
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	125	*	*	*	130
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	45	0.0%	0.0%	0.0	58
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	0.0%	0.6%	*	0	0.0%	0.4%	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	4	*	*	*	1
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	264	*	*	*	47
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	140	*	*	*	26
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	125	*	*	*	21
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	2.9%	2.7%	1.1	136	7.7%	3.2%	2.4	26
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	10.8%	8.0%	1.4	3'937	8.6%	6.9%	1.3	952
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	3.6%	3.8%	0.9	168	4.7%	2.6%	1.8	43
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	6.3%	4.0%	1.6	1'002	6.0%	3.4%	1.8	265
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	10.9%	8.0%	1.4	2'175	7.8%	6.5%	1.2	488
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	19.9%	15.7%	1.3	592	16.7%	15.2%	1.1	156
B.1.19.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Direktaufnahmen	71.2%	40.1%	*	1'964	81.6%	45.4%	*	558
B.1.20.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Zuverlegungen	59.0%	30.9%	*	695	67.9%	45.1%	*	182
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	6.7%	5.2%	1.3	3'080	4.9%	4.7%	1.1	770
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	6.5%	5.4%	1.2	2'312	4.8%	4.8%	1.0	581
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	7.4%	5.1%	1.4	768	5.3%	4.4%	1.2	189
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	0.0%	3.2%	*	0	0.0%	2.6%	*	0
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	0.0%	7.6%	*	0	0.0%	8.7%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolysse, Mortalität	13.4%	7.7%	1.7	554	5.9%	6.8%	0.9	135
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolysse	18.0%	12.6%	*	554	17.5%	12.4%	*	135
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	19.8%	12.2%	1.6	349	18.2%	12.4%	1.5	88
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	11.3%	5.2%	*	349	11.4%	7.6%	*	88
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	28.6%	21.0%	1.4	203	30.2%	21.2%	1.4	43
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	6.6%	7.7%	*	203	5.6%	6.4%	*	43
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	27.0%	23.9%	1.1	600	27.0%	21.1%	1.3	115
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	22.1%	14.4%	1.5	249	19.4%	13.2%	1.5	67
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	0
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	*	*	*	8	0.0%	4.1%	*	0
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.2%	0.1%	1.4	1'097	0.0%	0.1%	0.0	245
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	66.6%	29.8%	*	731	87.8%	38.4%	*	215
<b>B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</b>								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	558	*	*	*	104
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	3.6%	1.2%	3.0	224	2.3%	0.4%	5.6	44
<b>B.4 Epilepsie</b>								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	1'250	*	*	*	262
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	328	*	*	*	66
<b>B.5 Multiple Sklerose</b>								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	221	*	*	*	43

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>C Altersmedizin</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	2.3%	2.1%	*	609	2.9%	2.5%	*	149
<b>C.2 Mangelernährung bei Älteren</b>								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	1.2%	1.5%	*	493	2.1%	2.3%	*	180
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	26.0%	15.8%	*	128	25.6%	15.5%	*	46
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.3%	4.4%	1.0	1'936	4.0%	3.6%	1.1	403
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.2%	0.2%	1.3	406	0.0%	0.3%	0.0	105
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	129	0.0%	0.5%	0.0	33
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	1.9%	2.5%	0.8	313	1.5%	1.9%	0.8	67
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.7%	5.6%	1.0	802	6.0%	5.0%	1.2	151
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	10.8%	11.0%	1.0	286	12.8%	11.4%	1.1	47
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	318	0.0%	0.2%	0.0	78
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.7%	3.6%	1.0	1'092	4.3%	3.1%	1.4	209
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	110	0.0%	0.4%	0.0	30
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.5%	0.8%	0.5	220	2.1%	0.8%	2.7	48
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.7%	3.3%	1.1	537	5.2%	3.0%	1.7	96
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	8.4%	8.9%	1.0	225	8.6%	8.8%	1.0	35
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	18.1%	16.4%	1.1	166	15.2%	16.2%	0.9	33
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	6.2%	3.5%	1.8	649	4.9%	3.5%	1.4	164
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	11.3%	6.0%	1.9	213	3.2%	7.0%	0.5	62
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	2.7%	2.5%	1.1	184	7.7%	2.2%	3.5	39
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	1.8%	1.6%	1.1	110	2.7%	1.7%	1.6	37
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	23	*	*	*	1
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	7.6%	3.6%	2.1	119	8.0%	3.0%	2.7	25
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	18.3%	22.1%	*	119	15.2%	21.1%	*	25
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	1'427	*	*	*	311
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.4%	2.0%	1.2	933	1.8%	1.6%	1.1	222
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	7.0%	0.0	20	*	*	*	7
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	4.4%	5.8%	*	20	*	*	*	7
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	3.7%	1.7%	2.2	431	1.8%	1.4%	1.2	113
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	7.8%	6.2%	*	35	10.0%	6.5%	*	12
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	4.6%	6.0%	0.8	284	1.3%	3.7%	0.4	75

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>E Erkrankungen der Bauchorgane</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.3%	0.2%	1.4	1'101	0.0%	0.1%	0.0	238
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	91.7%	96.1%	*	1'010	96.6%	97.1%	*	230
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	3.4	1'657	0.3%	0.1%	3.5	327
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	11.4%	3.9%	2.9	44	0.0%	4.1%	0.0	10
<i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>	*	*	*	9	*	*	*	1
<i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter &gt;19</i>	98.3%	96.0%	*	970	96.7%	98.5%	*	174
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
<i>E.3.1.F Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	507	*	*	*	119
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle &gt;24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	2	0.0%	0.2%	*	0
<i>E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse</i>	*	*	*	113	*	*	*	28
<i>E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse</i>	*	*	*	354	*	*	*	77
<i>E.3.3.F Radiojodtherapie</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm</b>								
<i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	637	*	*	*	131
<i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>	*	*	*	707	*	*	*	164
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	7.9%	4.4%	1.8	870	6.7%	4.8%	1.4	180
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	5.3%	2.3%	2.3	171	0.0%	3.1%	0.0	41
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	10.2%	8.2%	1.2	49	0.0%	4.5%	0.0	15
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	2.7%	2.3%	1.2	74	4.3%	1.5%	2.9	23
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	1.2%	0.4%	3.3	84	5.9%	0.5%	11.1	17
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	1.9%	4.1%	0.5	103	0.0%	4.4%	0.0	16
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	40.5%	35.4%	1.1	74	40.0%	41.6%	1.0	15
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	40	*	*	*	7
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	8.2%	5.1%	1.6	243	8.7%	6.2%	1.4	46
<i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>	3.1%	3.3%	*	10	*	*	*	3
<i>E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität</i>	7.7%	7.0%	1.1	26	*	*	*	8
<i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>	5.8%	4.5%	*	26	*	*	*	8
<i>E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität</i>	*	*	*	5	*	*	*	1
<i>E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>	*	*	*	5	*	*	*	1
<b>E.5 Erkrankungen des Magens</b>								
<i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>	*	*	*	179	*	*	*	19
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	6.5%	3.4%	1.9	184	2.3%	3.4%	0.7	44
<i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>	*	*	*	308	*	*	*	59
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	14.3%	4.3%	3.4	28	*	*	*	4
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	16.0%	6.5%	2.5	25	*	*	*	1
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	2.7%	0.8%	3.3	255	0.0%	0.6%	0.0	54
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	12.1%	5.6%	2.1	58	0.0%	5.5%	0.0	10
<b>E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber</b>								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	7.8%	5.6%	1.4	115	0.0%	3.5%	0.0	28
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	7.0%	5.0%	1.4	57	0.0%	2.3%	0.0	18
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	13.6%	6.9%	2.0	22	*	*	*	3
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	4.5%	3.0%	1.5	22	7.1%	3.9%	1.8	14
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	*	*	*	9	10.0%	5.6%	1.8	10
<b>E.8 Bariatrische Eingriffe</b>								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.4%	0.0%	11.3	226	0.0%	0.2%	0.0	49

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>F Gefässerkrankungen</b>								
<b>F.1 Eingriffe an den hirnersorgenden Arterien</b>								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.5%	1.2	175	2.0%	1.1%	1.9	49
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	6.8%	4.3%	1.6	191	7.5%	13.1%	0.6	53
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	8.2%	7.2%	1.1	147	10.5%	18.1%	0.6	38
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	2.3%	0.4%	6.2	44	0.0%	1.1%	0.0	15
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	8.3%	9.0%	0.9	12	*	*	*	0
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	3
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	361	*	*	*	71
<b>F.2 Erkrankungen der Aorta</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	110	*	*	*	30
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	100	*	*	*	28
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	4.0%	3.9%	1.0	25	*	*	*	5
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	60	0.0%	1.2%	0.0	20
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	1
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	10	*	*	*	2
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	2
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	46.8%	40.6%	1.2	77	*	*	*	9
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	20.0%	24.8%	0.8	10	*	*	*	1
<b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	6.6%	4.2%	1.6	639	6.9%	3.7%	1.9	130
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	4.4%	0.5%	8.3	91	0.0%	0.1%	0.0	18
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	9.1%	2.0%	4.6	22	*	*	*	6
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	6.5%	4.4%	1.5	46	0.0%	2.3%	0.0	10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	7.1%	6.0%	1.2	198	15.8%	6.9%	2.3	38
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	7.4%	5.0%	1.5	54	0.0%	3.8%	0.0	13
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.9%	1.0%	0.9	112	7.1%	1.7%	4.2	14
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	19	*	*	*	4
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	97	*	*	*	27
<b>F.4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	3.9%	2.6%	1.5	283	3.1%	2.5%	1.3	64
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	15.2%	10.9%	1.4	105	0.0%	7.7%	0.0	21
<b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	2.8%	2.3%	1.2	1'574	4.9%	2.5%	2.0	225
F.5.4.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.5%	0.3%	1.8	569	0.0%	0.3%	0.0	52
F.5.5.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	1.0%	0.7%	1.5	101	0.0%	0.5%	0.0	12
F.5.6.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	5.3%	2.9%	1.8	318	2.2%	2.6%	0.8	46
F.5.7.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	3.9%	4.0%	1.0	586	8.7%	3.8%	2.3	115
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	112	*	*	*	23
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	112	*	*	*	14
<b>F.6 Arteriovenöser Shunt</b>								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	99	*	*	*	23

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	8'592	*	*	*	2'023
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.0%	2.9%	*	177	2.6%	2.9%	*	37
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	10.3%	18.3%	*	611	6.3%	13.5%	*	89
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	30.7%	32.7%	*	2'641	30.1%	31.7%	*	608
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	23.5%	27.4%	*	1'667	23.3%	26.5%	*	400
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	21.5%	24.5%	*	1'150	21.1%	23.5%	*	268
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	29.7%	35.0%	*	517	29.6%	33.9%	*	132
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	203	*	*	*	43
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	19	*	*	*	2
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	22	*	*	*	5
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	45	*	*	*	9
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	64	*	*	*	11
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	72	*	*	*	18
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	116	*	*	*	16
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	903	*	*	*	140
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	8'909	*	*	*	2'144
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.1%	0.0%	4.4	1'042	0.0%	0.0%	0.0	224
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	95.7%	82.9%	*	997	96.4%	87.2%	*	216
G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	2.4%	40.3%	*	25	*	*	*	5
G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	93.3%	42.6%	*	972	94.2%	54.0%	*	211
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovariektomie	6.3%	10.2%	*	22	*	*	*	3
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovariektomie	55.6%	33.4%	*	200	59.2%	36.0%	*	45
<b>G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	1'134	*	*	*	204
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	1'810	*	*	*	348
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	234	*	*	*	48
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	1.8%	1.1%	1.7	112	5.0%	0.4%	13.3	20
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	364	*	*	*	79
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	203	0.0%	0.3%	0.0	47
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'446	*	*	*	281
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	960	*	*	*	184
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	74.0%	73.0%	*	710	75.0%	75.4%	*	138
<b>G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau</b>								
G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt	*	*	*	571	*	*	*	139
G.6.2.F OP bei Genitalprolaps	*	*	*	197	*	*	*	38
G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps	*	*	*	367	*	*	*	101
G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose	*	*	*	7	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	1.4%	0.3%	5.6	69	0.0%	0.0%	*	11
<i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	38.8%	37.7%	*	69	25.0%	42.9%	*	11
<i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	30.4%	48.9%	*	21	*	*	*	7
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	30	*	*	*	3
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.9%	1.2%	0.8	109	0.0%	0.4%	0.0	33
<i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	20.2%	30.9%	*	22	51.5%	36.9%	*	17
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	2.5%	1.8%	1.4	40	0.0%	2.5%	0.0	13
<b>H.2 Nierensteine</b>								
<i>H.2.1.F HD Nierensteine</i>	*	*	*	1'398	*	*	*	339
<i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i>	26.0%	48.8%	*	363	29.8%	50.1%	*	101
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
<i>H.3.1.F HD Malignom der Blase</i>	*	*	*	857	*	*	*	239
<i>H.3.2.F TUR der Blase insgesamt</i>	*	*	*	788	*	*	*	215
<i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i>	*	*	*	585	*	*	*	171
<i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i>	38.6%	14.4%	*	226	43.3%	16.1%	*	74
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	3.0%	4.0%	0.8	99	0.0%	2.2%	0.0	26
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	9.1%	2.3%	4.0	11	*	*	*	2
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
<i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i>	2.7%	2.5%	*	30	*	*	*	4
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.1%	0.1%	1.8	887	0.0%	0.1%	0.0	191
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.4%	0.4%	1.0	244	1.8%	0.4%	4.2	57
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
<i>H.5.1.F HD Prostatakarzinom</i>	*	*	*	1'127	*	*	*	209
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	663	0.0%	0.1%	0.0	125
<b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Endoprothese</b>								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.2%	0.1%	2.1	606	0.0%	0.0%	0.0	122
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	5.6%	4.0%	1.4	195	4.0%	4.0%	1.0	50
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	5.2%	2.8%	1.9	115	8.0%	3.7%	2.1	25
<i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	2.6%	1.4%	*	16	0.0%	1.5%	*	0
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	1.4%	0.7%	2.2	70	5.9%	0.8%	7.3	17
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	3
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	56	8.3%	1.6%	5.3	12
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.2%	0.0%	6.2	553	0.0%	0.0%	0.0	121
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	2.4%	0.1%	17.9	42	0.0%	0.0%	*	10
<i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	2.5%	1.2%	*	14	*	*	*	4
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	5.0%	0.2%	23.2	20	0.0%	0.2%	0.0	13
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	5
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	1.8%	0.0	28	0.0%	0.3%	0.0	11
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	4.5%	3.6%	1.3	44	0.0%	3.8%	0.0	10
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0



Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>								
<b>I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	3'920	*	*	*	860
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	1'019	*	*	*	235
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	4.8%	0.0	47	0.0%	3.6%	0.0	12
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	2.2%	1.9%	1.1	279	1.6%	1.4%	1.2	61
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	8.6%	4.8%	1.8	58	5.3%	4.8%	1.1	19
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	52	0.0%	0.0%	*	11
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	577	0.0%	0.0%	*	110
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.3%	0.0%	5.5	382	0.0%	0.0%	0.0	70
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.5%	0.3%	2.0	189	0.0%	0.3%	0.0	28
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	0.5%	0.1%	6.3	565	0.0%	0.3%	0.0	13
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	678	0.5%	0.0%	15.5	204
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.3%	0.3%	1.0	365	0.0%	0.3%	0.0	103
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	0.8%	1.8%	0.5	748	0.4%	1.1%	0.4	240
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	7	*	*	*	1
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	895	*	*	*	71
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	871	*	*	*	139
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	4.8%	3.7%	1.3	353	4.2%	3.4%	1.2	72
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	40	*	*	*	3
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	2.7%	0.9%	3.0	37	0.0%	0.4%	0.0	11
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	1.4%	1.8%	0.8	74	6.7%	0.8%	8.6	15
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	2.9%	3.4%	0.8	69	0.0%	2.6%	0.0	14
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	5.6%	5.2%	1.1	72	0.0%	4.8%	0.0	16
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	14.8%	8.5%	1.7	61	15.4%	8.6%	1.8	13
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.6%	3.7%	1.5	431	3.8%	3.3%	1.2	80
<b>I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	332	*	*	*	42
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	32.6%	25.9%	1.3	1'741	28.0%	26.9%	1.0	357
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	33.2%	25.7%	1.3	1'191	31.6%	26.8%	1.2	256
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	31.0%	23.7%	1.3	1'078	27.1%	25.7%	1.1	210
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	35.1%	28.8%	1.2	663	29.3%	28.3%	1.0	147
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	144.9	*	*	1'741	162.6	*	*	357
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	43.1%	41.9%	*	200	39.8%	42.4%	*	35
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	56	*	*	*	23
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	33.3%	22.0%	1.5	1'080	21.7%	16.0%	1.4	337
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	33.8%	22.9%	1.5	1'060	50.5%	32.7%	1.5	93
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	10.0%	7.5%	1.3	20	10.7%	10.1%	1.1	244
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	13.9%	10.6%	1.3	2'697	26.6%	22.1%	1.2	139
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	44.2%	35.1%	1.3	443	43.6%	38.0%	1.1	39

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.3 Komplexe Konstellationen</b>								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	2.8%	3.9%	*	329	6.8%	7.5%	*	138
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	244	*	*	*	60
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	130	*	*	*	32
<b>K Hautkrankheiten</b>								
<b>K.1 Hautkrankheiten</b>								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	273	*	*	*	45
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	109	*	*	*	17
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	23	*	*	*	3
<b>L Hochspezialisierte Medizin</b>								
<b>L.1 Herztransplantationen</b>								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.2 Lungentransplantationen</b>								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.3 Lebertransplantationen</b>								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.4 Pankreastretransplantationen</b>								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.5 Nierentransplantationen</b>								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.6.F Nieren-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen</b>								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	193	*	*	*	44
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	113	*	*	*	44
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	113	*	*	*	44
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.7 Hypertherme Chemotherapie</b>								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	6	*	*	*	1
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2014–2018				2019			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>M Palliativmedizin</b>								
<b>M.1 Palliativmedizin</b>								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	0	*	*	*	0
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ-Dienst (intern und extern)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>Z Zusatzinformationen</b>								
<b>Z.1 Aufenthaltsdauer</b>								
	Aufenthaltsdauer (Tage)		Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)		Fallzahl		
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.9		3'146	4.6		641		
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.0		3'080	7.4		770		
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	5.1		1'101	4.6		238		
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	3.1		1'657	3.1		327		
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	9.2		175	7.6		49		
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	3.8		1'042	3.4		224		
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.7		1'131	4.0		248		
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.7		606	6.7		122		
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.5		553	6.9		121		
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	5.5		1'249	3.6		233		
<b>Z.2 Verlegungsraten</b>								
	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl		
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	35.4%	28.2%	1'062	32.1%	27.7%	197		
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	9.7%	6.2%	135	15.3%	6.0%	48		
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	36.3%	25.8%	1'038	32.7%	21.5%	191		
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	9.5%	6.6%	234	10.7%	6.8%	30		
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	0	*	*	0		
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0		
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0		
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	12.8%	18.0%	448	12.5%	19.2%	109		
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	11.7%	14.4%	336	13.7%	15.3%	100		
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	5.3%	3.8%	56	12.0%	3.7%	24		
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	6.2%	3.9%	38	12.2%	3.9%	19		
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	1.6%	2.5%	13	*	*	4		
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	*	*	1	0.0%	3.4%	0		
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	2.7%	4.6%	16	*	*	2		
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	*	*	1	0.0%	0.5%	0		
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	13.8%	18.7%	162	13.2%	18.1%	34		
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	13.3%	12.6%	96	12.5%	11.4%	33		