

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.0%	4.3%	1.1	4'139	4.4%	4.0%	1.1	800
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	163	0.0%	1.4%	0.0	22
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.6%	1.7%	0.9	1'566	1.4%	1.8%	0.8	345
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	6.0%	4.8%	1.2	2'045	5.1%	4.7%	1.1	373
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	15.9%	14.2%	1.1	365	18.3%	13.1%	1.4	60
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	7.6%	6.1%	1.2	2'242	5.3%	5.6%	1.0	469
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.7%	2.9%	0.9	1'250	4.0%	2.6%	1.5	252
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	86.3%	62.9%	*	3'570	87.8%	67.0%	*	702
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	83.4%	59.5%	*	2'410	86.3%	63.3%	*	473
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	92.8%	73.5%	*	1'160	90.9%	80.0%	*	229
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	83.4%	60.0%	*	2'410	86.3%	63.6%	*	473
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	0.4%	1.7%	*	17	*	*	*	7
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.5%	5.9%	1.1	1'636	6.5%	5.8%	1.1	337
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	39.5%	41.1%	*	1'636	42.1%	41.8%	*	337
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	3.6%	2.7%	1.3	2'477	1.8%	2.1%	0.8	456
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	15.2%	14.2%	1.1	1'058	15.8%	15.5%	1.0	215
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	8.1%	7.6%	1.1	2'383	8.4%	6.9%	1.2	561
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	11.1%	3.5%	3.2	18	*	*	*	4
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.2%	2.9%	1.4	238	2.9%	2.4%	1.2	70
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.3%	6.5%	1.0	1'309	6.7%	6.3%	1.1	315
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	12.2%	11.0%	1.1	818	13.4%	9.9%	1.4	172
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	54.7%	56.0%	*	607	37.3%	54.4%	*	78
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	12'402	*	*	*	2'256
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.3%	2.9%	0.8	3'562	1.6%	2.9%	0.5	702
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.3%	2.1%	0.6	1'156	0.4%	1.8%	0.2	229
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	21.1%	27.0%	0.8	19	21.7%	34.2%	0.6	23
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	7.7%	1.5%	5.0	26	0.0%	1.7%	0.0	10
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	2
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	12.5%	1.1%	11.0	16	*	*	*	9
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.1%	1.1%	1.0	2'967	0.8%	1.2%	0.7	594
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	33.8%	42.5%	*	2'967	38.4%	47.2%	*	594
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.3%	3.2%	0.4	76	16.7%	6.7%	2.5	12
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	5
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.7%	0.6%	1.2	2'873	0.5%	0.7%	0.7	575
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	16	*	*	*	2
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	3'261	*	*	*	666

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	1'615	*	*	*	333
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	531	*	*	*	128
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	1'274	*	*	*	276
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.2%	0.1%	2.3	608	0.0%	0.0%	0.0	136
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	*	*	*	6	*	*	*	4
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	186	*	*	*	44
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	11	*	*	*	7
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	175	*	*	*	37
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	6	*	*	*	2
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	7
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	8.6%	7.7%	1.1	4'165	8.8%	6.9%	1.3	909
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	2.7%	3.1%	0.9	183	4.3%	2.6%	1.7	46
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	5.2%	3.8%	1.4	1'037	5.0%	3.2%	1.6	220
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	8.2%	7.5%	1.1	2'244	8.4%	6.9%	1.2	491
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	16.5%	15.4%	1.1	701	17.1%	13.8%	1.2	152
B.1.19.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Direktaufnahmen	61.5%	42.8%	*	1'996	64.2%	46.7%	*	443
B.1.20.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Zuverlegungen	70.1%	35.6%	*	643	67.6%	45.1%	*	148
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	5.4%	5.2%	1.0	3'381	5.6%	4.5%	1.2	772
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	5.8%	5.3%	1.1	2'685	5.6%	4.5%	1.3	585
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.7%	4.7%	0.8	696	5.3%	4.9%	1.1	187
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	0.0%	3.1%	*	0	0.0%	3.0%	*	0
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	0.0%	7.9%	*	0	0.0%	9.6%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	6.8%	7.6%	0.9	604	5.4%	6.2%	0.9	148
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	17.9%	12.8%	*	604	19.2%	12.9%	*	148
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	8.7%	11.4%	0.8	392	15.2%	11.7%	1.3	105
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	11.6%	6.1%	*	392	13.6%	7.7%	*	105
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	19.9%	20.5%	1.0	226	30.9%	21.5%	1.4	55
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	6.7%	7.3%	*	226	7.1%	7.3%	*	55
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	26.2%	22.4%	1.2	515	27.1%	21.5%	1.3	96
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	14.6%	13.4%	1.1	239	26.8%	16.1%	1.7	41
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	26.7%	11.1%	2.4	30	*	*	*	0
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	0.7%	4.3%	*	30	0.0%	3.1%	*	0
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.1%	0.1%	1.0	1'004	0.5%	0.1%	6.4	203
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	45.1%	33.8%	*	453	46.3%	42.1%	*	94
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	535	*	*	*	95
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	1.1%	1.1%	1.0	274	2.4%	1.0%	2.3	41
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	1'223	*	*	*	241
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	45	*	*	*	15
B.5 Multiple Sklerose								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	202	*	*	*	22

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
C Altersmedizin								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	3.3%	2.2%	*	1'397	4.1%	2.5%	*	320
C.2 Mangelernährung bei Älteren								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	1.3%	1.8%	*	826	2.7%	2.8%	*	324
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	22.2%	15.6%	*	183	18.8%	15.7%	*	61
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.4%	5.3%	1.2	2'412	14.6%	9.0%	1.6	1'084
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	11	*	*	*	3
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.8%	0.6%	2.9	218	0.0%	0.9%	0.0	69
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	3.3%	2.3%	1.4	511	5.6%	2.4%	2.3	323
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	6.4%	5.3%	1.2	1'210	19.1%	10.9%	1.8	540
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	12.1%	11.2%	1.1	462	24.8%	20.6%	1.2	149
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	2
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.6%	3.6%	1.3	1'815	12.1%	7.3%	1.7	791
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.7%	0.3%	5.3	181	0.0%	0.3%	0.0	55
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.6%	0.8%	1.9	375	3.2%	1.1%	2.9	248
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.7%	3.1%	1.2	889	15.2%	8.8%	1.7	374
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	11.4%	8.9%	1.3	370	27.2%	19.3%	1.4	114
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	17.1%	17.1%	1.0	158	20.3%	20.9%	1.0	59
D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	3.8%	3.3%	1.1	1'370	7.7%	3.7%	2.1	182
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	6.2%	5.7%	1.1	449	10.2%	5.8%	1.7	49
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	1.7%	2.6%	0.6	484	4.9%	3.0%	1.6	82
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	3.8%	1.5%	2.6	235	12.5%	2.6%	4.9	32
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	3.0%	2.3%	1.3	33	*	*	*	3
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	3.6%	3.4%	1.0	169	6.2%	4.4%	1.4	16
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	12.3%	21.5%	*	169	8.8%	18.7%	*	16
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	2'894	*	*	*	503
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.6%	1.9%	1.4	877	1.4%	1.9%	0.7	140
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	3.7%	6.3%	0.6	27	*	*	*	2
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	5.6%	5.3%	*	27	*	*	*	2
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.1%	1.6%	0.7	458	1.1%	1.8%	0.6	90
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	3.9%	6.5%	*	19	*	*	*	7
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	5.0%	5.5%	0.9	161	11.9%	6.4%	1.8	42

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.2%	0.1%	1.1	1'916	0.0%	0.1%	0.0	354
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	91.9%	96.5%	*	1'760	93.5%	97.0%	*	331
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	2.0	3'172	0.0%	0.1%	0.0	399
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	4.2%	3.7%	1.1	119	9.1%	3.3%	2.8	22
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	100.0%	22.6%	*	25	*	*	*	0
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	98.6%	96.8%	*	1'953	99.0%	98.3%	*	203
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	1'379	*	*	*	310
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	4	0.0%	0.3%	*	0
E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse	*	*	*	266	*	*	*	54
E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse	*	*	*	1'045	*	*	*	235
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	408	*	*	*	89
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom	*	*	*	1'662	*	*	*	281
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)	*	*	*	1'341	*	*	*	245
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.0%	4.4%	0.9	1'922	6.4%	4.1%	1.6	343
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	2.6%	2.2%	1.2	423	3.2%	2.5%	1.3	62
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	9.4%	6.2%	1.5	85	4.2%	6.1%	0.7	24
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	2.7%	2.2%	1.2	257	5.4%	1.9%	2.8	56
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	226	0.0%	0.0%	*	26
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	3.9%	3.9%	1.0	259	6.9%	3.2%	2.2	58
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	21.4%	36.3%	0.6	70	21.4%	24.9%	0.9	28
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	98	16.7%	8.0%	2.1	12
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	6.1%	6.1%	1.0	413	5.2%	4.9%	1.1	77
E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	4.0%	3.3%	*	34	*	*	*	6
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	7.5%	6.5%	1.2	67	*	*	*	7
E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	6.1%	5.7%	*	67	*	*	*	7
E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	9.1%	5.9%	1.5	22	*	*	*	2
E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	12.3%	9.5%	*	22	*	*	*	2
E.5 Erkrankungen des Magens								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom	*	*	*	474	*	*	*	83
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	5.7%	3.5%	1.6	474	2.8%	3.0%	0.9	106
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	1'072	*	*	*	187
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	2.0%	3.7%	0.5	99	0.0%	3.6%	0.0	21
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	2.5%	4.8%	0.5	79	20.0%	4.4%	4.5	10
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	1.3%	0.8%	1.7	894	0.0%	1.1%	0.0	156
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	5.0%	5.0%	1.0	121	13.6%	5.4%	2.5	22
E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	4.7%	5.1%	0.9	404	5.5%	3.8%	1.4	73
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	6.3%	5.4%	1.2	175	0.0%	2.2%	0.0	30
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	2.4%	5.5%	0.4	124	10.7%	4.9%	2.2	28
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	1.0%	2.7%	0.4	103	3.6%	3.1%	1.1	28
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	2.2%	3.2%	0.7	45	0.0%	2.4%	0.0	12
E.8 Bariatrische Eingriffe								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	740	0.0%	0.0%	*	128

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnersorgenden Arterien								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	0.5%	0.6%	0.8	424	1.0%	0.7%	1.5	98
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	2.9%	4.2%	0.7	205	5.3%	3.5%	1.5	57
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	4.3%	6.7%	0.6	139	5.4%	5.6%	1.0	37
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	63	0.0%	0.0%	*	17
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	3
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	35.3%	16.3%	2.2	17	*	*	*	1
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	11.4%	6.6%	1.7	35	8.3%	10.3%	0.8	12
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	298	*	*	*	54
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	431	*	*	*	109
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	408	*	*	*	106
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	0.6%	3.3%	0.2	171	0.0%	2.2%	0.0	42
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	91	0.0%	0.5%	0.0	18
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	3.0%	4.2%	0.7	101	0.0%	0.0%	*	23
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	20.0%	2.0%	10.1	10	0.0%	0.9%	0.0	12
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	23	*	*	*	3
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	0.0%	4.9%	0.0	11	*	*	*	3
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	46.9%	37.1%	1.3	96	23.8%	31.1%	0.8	21
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	17.9%	22.8%	0.8	39	9.1%	25.0%	0.4	11
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	3.8%	3.8%	1.0	1'074	2.8%	4.3%	0.7	213
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	0.4%	0.5%	0.8	223	0.0%	0.5%	0.0	43
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	5.0%	2.3%	2.1	40	*	*	*	6
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	9.2%	3.8%	2.4	65	*	*	*	7
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	4.9%	6.1%	0.8	182	6.5%	9.2%	0.7	46
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	3.5%	4.9%	0.7	141	8.6%	4.3%	2.0	35
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	1.6%	1.0%	1.6	122	0.0%	1.1%	0.0	14
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	226	*	*	*	52
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	75	*	*	*	10
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.7%	2.6%	1.0	333	0.0%	2.0%	0.0	61
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	15.4%	11.1%	1.4	91	0.0%	7.5%	0.0	22
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	3.5%	2.3%	1.5	1'890	3.8%	2.6%	1.4	450
F.5.4.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.4%	0.2%	1.7	493	0.0%	0.2%	0.0	89
F.5.5.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.8%	0.7%	1.1	119	5.6%	1.5%	3.8	18
F.5.6.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	5.4%	2.8%	2.0	332	1.3%	2.3%	0.6	75
F.5.7.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	4.8%	3.9%	1.2	946	5.6%	4.1%	1.4	268
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	274	*	*	*	63
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	122	*	*	*	14
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	168	*	*	*	40

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	9'217	*	*	*	1'988
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.9%	2.9%	*	173	3.7%	2.8%	*	48
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	16.7%	16.7%	*	982	10.6%	11.8%	*	138
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	36.2%	32.4%	*	3'332	34.2%	32.2%	*	680
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	27.9%	27.1%	*	2'086	26.0%	27.3%	*	421
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	25.8%	24.2%	*	1'484	22.8%	24.1%	*	284
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	35.0%	34.6%	*	602	36.4%	34.9%	*	137
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	211	*	*	*	39
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	2	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	19	*	*	*	6
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	43	*	*	*	10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	76	*	*	*	10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	73	*	*	*	13
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	109	*	*	*	14
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	887	*	*	*	202
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	8'458	*	*	*	1'822
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	736	0.0%	0.0%	*	122
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	82.9%	84.4%	*	607	81.1%	87.9%	*	99
G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	22.8%	38.2%	*	167	19.7%	30.5%	*	24
G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	60.1%	46.3%	*	440	61.5%	57.4%	*	75
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	10.7%	8.8%	*	32	*	*	*	3
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	31.0%	34.3%	*	88	27.0%	38.2%	*	10
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	1'353	*	*	*	216
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	2'182	*	*	*	395
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	335	*	*	*	74
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	114	0.0%	0.9%	0.0	25
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	384	*	*	*	80
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.5%	0.3%	1.5	190	0.0%	0.4%	0.0	41
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'317	*	*	*	190
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	983	*	*	*	133
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	76.8%	73.7%	*	755	78.2%	73.8%	*	104
G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau								
G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt	*	*	*	595	*	*	*	89
G.6.2.F OP bei Genitalprolaps	*	*	*	502	*	*	*	75
G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps	*	*	*	77	*	*	*	13
G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose	*	*	*	16	*	*	*	1

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	111	0.0%	0.0%	*	25
<i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	39.9%	39.6%	*	111	40.3%	42.8%	*	25
<i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	29.7%	53.5%	*	33	68.0%	58.6%	*	17
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	28	0.0%	0.0%	*	10
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	1.2%	1.1%	1.1	167	0.0%	2.4%	0.0	37
<i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	19.8%	33.7%	*	33	*	*	*	9
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	62	0.0%	0.0%	*	11
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	2'573	*	*	*	441
<i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i>	49.4%	49.3%	*	1'272	52.6%	50.8%	*	232
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	1'035	*	*	*	227
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	739	*	*	*	168
<i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i>	*	*	*	570	*	*	*	116
<i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i>	16.3%	15.1%	*	93	28.4%	16.6%	*	33
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	2.3%	3.5%	0.7	87	0.0%	1.5%	0.0	26
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	3.7%	2.5%	1.5	27	*	*	*	8
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
<i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i>	3.7%	2.6%	*	27	*	*	*	6
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.2%	0.1%	2.7	527	0.0%	0.1%	0.0	161
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.5%	0.4%	1.3	201	1.5%	0.6%	2.3	68
H.5 Prostatakarzinom								
<i>H.5.1.F HD Prostatakarzinom</i>	*	*	*	949	*	*	*	228
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	294	0.0%	0.1%	0.0	77

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.4%	0.1%	5.4	1'089	0.0%	0.1%	0.0	177
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	2.6%	3.9%	0.7	496	2.0%	4.3%	0.5	98
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	3.5%	2.4%	1.5	199	3.0%	2.4%	1.3	33
<i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	2.6%	1.4%	*	28	*	*	*	3
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	1.2%	0.5%	2.5	171	4.0%	0.3%	12.3	25
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	0
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	8.8%	3.1%	2.9	91	0.0%	2.4%	0.0	23
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.1%	0.0%	4.2	704	1.0%	0.0%	30.8	98
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	1.2%	0.1%	11.1	83	0.0%	0.3%	0.0	10
<i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	2.6%	1.3%	*	18	*	*	*	2
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	151	0.0%	0.1%	0.0	12
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	2
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	3.8%	1.6%	2.4	53	0.0%	1.5%	0.0	20
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	4.4%	3.6%	1.2	137	0.0%	3.7%	0.0	28
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
<i>I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i>	*	*	*	5'394	*	*	*	872
<i>I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i>	*	*	*	954	*	*	*	201
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	3.4%	4.6%	0.7	119	10.6%	5.4%	2.0	47
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	1.8%	1.6%	1.1	446	0.9%	1.4%	0.7	108
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	5.3%	5.7%	0.9	76	0.0%	3.8%	0.0	15
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	1.2%	0.2%	6.2	80	0.0%	0.4%	0.0	24
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	563	0.0%	0.0%	0.0	95
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	316	2.1%	0.1%	18.1	48
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.5%	0.2%	2.2	201	2.5%	0.3%	8.9	40
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	0.1%	0.1%	1.0	979	0.0%	0.0%	*	94
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	1'478	0.0%	0.0%	0.0	190
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	311	0.0%	0.3%	0.0	28
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	2.7%	1.3%	2.0	865	4.0%	0.9%	4.4	199
<i>I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)</i>	1.2%	0.6%	*	20	*	*	*	1
<i>I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule</i>	*	*	*	891	*	*	*	146
<i>I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule</i>	*	*	*	1'219	*	*	*	191
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.0%	3.5%	0.8	705	2.8%	3.7%	0.7	144
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	68	0.0%	0.1%	0.0	21
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	1.5%	0.7%	2.0	66	*	*	*	9
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	1.2%	1.8%	0.7	161	0.0%	1.9%	0.0	24
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	4.6%	3.1%	1.5	130	3.0%	3.6%	0.9	33
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	3.5%	4.5%	0.8	141	4.2%	4.6%	0.9	24
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	5.0%	7.9%	0.6	139	6.1%	7.5%	0.8	33
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	3.9%	3.5%	1.1	694	6.3%	3.6%	1.8	111
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
<i>I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen</i>	*	*	*	447	*	*	*	74

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	29.5%	26.2%	1.1	2'426	35.8%	27.9%	1.3	453
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	29.9%	26.0%	1.2	1'740	38.2%	28.1%	1.4	296
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	29.0%	24.2%	1.2	1'517	31.8%	26.0%	1.2	242
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	30.3%	29.1%	1.0	909	40.3%	29.5%	1.4	211
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	140.8	*	*	2'426	169.0	*	*	453
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	42.0%	41.9%	*	261	40.4%	43.0%	*	46
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	133	*	*	*	13
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	62	*	*	*	22
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	21.2%	19.9%	1.1	1'342	24.3%	18.2%	1.3	259
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	24.8%	23.2%	1.1	998	42.9%	36.7%	1.2	84
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	10.5%	9.7%	1.1	344	15.4%	12.1%	1.3	175
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	15.4%	11.0%	1.4	2'807	28.2%	26.3%	1.1	202
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	42.4%	34.8%	1.2	498	45.9%	41.8%	1.1	61
J.3 Komplexe Konstellationen								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	4.6%	5.2%	*	863	6.6%	8.2%	*	256
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	345	*	*	*	95
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	224	*	*	*	62
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	253	*	*	*	66
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	222	*	*	*	47
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	36	*	*	*	14

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
L Hochspezialisierte Medizin								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.4 Pankreastransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	104	*	*	*	12
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogene, syngene	*	*	*	36	*	*	*	3
L.5.3.F Nierentransplantation, allogene, Leichenniere	*	*	*	58	*	*	*	8
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	188	*	*	*	48
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	8	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	8	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	153	*	*	*	48
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	153	*	*	*	48
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7 Hypertherme Chemotherapie								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	52	*	*	*	10
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	0	*	*	*	0
M Palliativmedizin								
M.1 Palliativmedizin								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	1'756	*	*	*	503
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern)	*	*	*	1'283	*	*	*	385

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
Y COVID–19								
Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion								
Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19	*	...	12.1%	16.0%	*	2'509
Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labordiagnostischer Virusnachweis	*	...	32.3%	22.2%	*	810
Y.2 COVID–19 – Überblick								
Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität	14.2%	6.7%	2.1	120
Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung	*	...	0.3%	0.3%	*	120
Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Mortalität	19.2%	11.4%	1.7	927
Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis	*	...	2.7%	2.8%	*	927
Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität	*	*	*	3
Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	58
Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität	7.0%	3.1%	2.3	284
Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität	25.9%	14.7%	1.8	482
Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität	33.0%	26.0%	1.3	100
Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität	22.1%	13.4%	1.7	732
Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen	*	...	79.0%	72.9%	*	732
Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität	22.7%	13.8%	1.6	715
Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen	*	...	77.1%	72.6%	*	715
Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung								
Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	34.6%	25.2%	1.4	185
Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung	*	...	20.0%	12.8%	*	185
Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden)	...	*	*	...	227.2	*	*	185
Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	15.4%	9.3%	1.6	742
Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität	46.0%	31.7%	1.4	124
Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19	...	*	*	...	254.4	*	*	124
Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität	15.1%	9.2%	1.6	803
Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz								
Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	42.1%	25.2%	1.7	19
Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	46.2%	50.0%	0.9	13
Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	5
Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	8
Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität	*	*	*	5
Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität	*	*	*	1
Y.5 COVID–19 – Komplikationen								
Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität	51.9%	31.4%	1.7	81
Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND)	*	...	8.7%	8.7%	*	81
Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND)	*	...	4.7%	7.9%	*	44
Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität	7.5%	4.4%	1.7	187
Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis	*	...	*	*	*	2

Krankheitsgruppe	2015–2019			2020		
Z Zusatzinformationen						
Z.1 Aufenthaltsdauer	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl		Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	5.5	4'139		5.3	800	
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.5	3'381		7.9	772	
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.8	1'916		4.3	354	
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	3.5	3'172		3.7	399	
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	9.6	424		8.2	98	
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	4.5	736		4.5	122	
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.4	728		5.7	229	
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.9	1'089		8.0	177	
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	10.2	704		8.9	98	
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	3.1	881		3.4	119	
Z.2 Verlegungsraten	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	35.0%	28.0%	1'377	24.4%	25.6%	187
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	13.3%	6.1%	291	11.1%	5.9%	57
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	36.5%	24.4%	1'269	25.6%	17.7%	177
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	*	*	2	*	*	1
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	20.2%	18.4%	770	15.1%	18.3%	125
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	20.6%	14.7%	659	14.8%	15.0%	108
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	9.0%	3.8%	155	9.8%	7.4%	68
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	8.3%	3.9%	109	6.0%	3.9%	10
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	9.4%	2.4%	174	8.4%	2.4%	27
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	5.0%	2.5%	13	*	*	4
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	7.6%	4.7%	79	5.3%	4.8%	11
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	5.3%	0.6%	57	7.3%	0.5%	13
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	28.2%	18.5%	482	28.9%	20.7%	84
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	21.9%	12.2%	232	24.5%	12.6%	48