

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.1 Herzinfarkt | | | | | | | | |
| A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 6.2% | 0.0 | 10 | * | * | * | 4 |
| A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 1 |
| A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 2 |
| A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 1 |
| A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 |
| A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefäße (Alter >19) | 0.0% | 62.9% | * | 0 | * | * | * | 2 |
| A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefäße (Alter >19), Direktaufnahmen | 0.0% | 59.5% | * | 0 | * | * | * | 2 |
| A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefäße (Alter >19), Zuverlegungen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen | 0.0% | 60.0% | * | 0 | * | * | * | 2 |
| A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19) | * | * | * | 1 | 0.0% | 1.7% | * | 0 |
| A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 5 | * | * | * | 2 |
| A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | * | 5 | * | * | * | 2 |
| A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 2 |
| A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 2 |
| A.2 Herzinsuffizienz | | | | | | | | |
| A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität | 10.3% | 8.9% | 1.2 | 29 | * | * | * | 8 |
| A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität | 9.1% | 7.3% | 1.2 | 11 | * | * | * | 4 |
| A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität | 13.3% | 11.0% | 1.2 | 15 | * | * | * | 4 |
| A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19) | * | * | * | 4 | * | * | * | 4 |
| A.3 Herzkatheter | | | | | | | | |
| A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefäße (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 3 |
| A.3.2.M Katheter der Koronargefäße bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 2 |
| A.3.9.M Katheter der Koronargefäße bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.10.M Katheter der Koronargefäße bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 1 |
| A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 1 |
| A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19) | * | * | * | 0 | 0.0% | 47.2% | * | 0 |
| A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.4 Herzrhythmusstörungen | | | | | | | | |
| A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen | * | * | * | 16 | * | * | * | 3 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| A Erkrankungen des Herzens | | | | | | | | |
| A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator | | | | | | | | |
| A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.6 Ablative Therapie | | | | | | | | |
| A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7 Operationen am Herzen | | | | | | | | |
| A.7.1.F OP am Herzen insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.2.F OP an Herzklappen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.3.F OP an Koronargefässen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.4.F Andere OP am Herzen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke) | | | | | | | | |
| B.1 Schlaganfall | | | | | | | | |
| B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität | 20.0% | 10.9% | 1.8 | 10 | * | * | * | 2 |
| B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |
| B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität | * | * | * | 5 | * | * | * | 1 |
| B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 0 |
| B.1.19.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Direktaufnahmen | 0.0% | 42.8% | * | 0 | 0.0% | 46.7% | * | 0 |
| B.1.20.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Zuverlegungen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 2 |
| B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 2 |
| B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen | 0.0% | 3.1% | * | 0 | 0.0% | 3.0% | * | 0 |
| B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse | 0.0% | 12.8% | * | 0 | 0.0% | 12.9% | * | 0 |
| B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie | 0.0% | 6.1% | * | 0 | 0.0% | 7.7% | * | 0 |
| B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie | 0.0% | 7.3% | * | 0 | 0.0% | 7.3% | * | 0 |
| B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 6 | * | * | * | 0 |
| B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19) | * | * | * | 6 | 0.0% | 3.1% | * | 0 |
| B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA) | | | | | | | | |
| B.2.1.M TIA, Mortalität | * | * | * | 7 | * | * | * | 3 |
| B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung | 0.0% | 33.8% | * | 0 | 0.0% | 42.1% | * | 0 |
| B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute | | | | | | | | |
| B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| B.4 Epilepsie | | | | | | | | |
| B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19) | * | * | * | 6 | * | * | * | 0 |
| B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20) | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| B.5 Multiple Sklerose | | | | | | | | |
| B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| C Altersmedizin | | | | | | | | |
| C.1 Geriatrische Frührehabilitation | | | | | | | | |
| C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59 | 0.0% | 2.2% | * | 0 | * | * | * | 0 |
| C.2 Mangelernährung bei Älteren | | | | | | | | |
| C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64 | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 |
| C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64 | 0.0% | 15.6% | * | 0 | 0.0% | 15.7% | * | 0 |
| D Erkrankungen der Lunge | | | | | | | | |
| D.1 Lungenentzündung (Pneumonie) | | | | | | | | |
| D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität | 5.7% | 6.9% | 0.8 | 35 | 0.0% | 13.0% | 0.0 | 12 |
| D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 0 |
| D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 2 |
| D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität | 7.7% | 5.1% | 1.5 | 13 | * | * | * | 6 |
| D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität | 6.7% | 11.2% | 0.6 | 15 | * | * | * | 4 |
| D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 6.5% | 4.9% | 1.3 | 31 | 0.0% | 12.2% | 0.0 | 10 |
| D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 0 |
| D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 1 |
| D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 7.7% | 3.0% | 2.6 | 13 | * | * | * | 6 |
| D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität | 8.3% | 9.1% | 0.9 | 12 | * | * | * | 3 |
| D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 2 |
| D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | | | | | | | | |
| D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 4.7% | 0.0 | 15 | * | * | * | 4 |
| D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 2 |
| D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 4 | * | * | * | 1 |
| D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 6 | * | * | * | 0 |
| D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 1 |
| D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19) | * | * | * | 3 | * | * | * | 1 |
| D.3 Lungenkrebs | | | | | | | | |
| D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| D.4 Operationen an der Lunge | | | | | | | | |
| D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| E Erkrankungen der Bauchorgane | | | | | | | | |
| E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) | | | | | | | | |
| E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.2 Hernienoperationen | | | | | | | | |
| E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19 | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19 | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.3 Eingriffe an der Schilddrüse | | | | | | | | |
| E.3.1.F Resektion der Schilddrüse | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.3.3.F Radiojodtherapie | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm | | | | | | | | |
| E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND) | * | * | * | 7 | * | * | * | 1 |
| E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.5 Erkrankungen des Magens | | | | | | | | |
| E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 1 |
| E.5.1.F Magenresektionen insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.6 Operationen am Ösophagus | | | | | | | | |
| E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber | | | | | | | | |
| E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| E.8 Bariatrische Eingriffe | | | | | | | | |
| E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| F Gefässerkrankungen | | | | | | | | |
| F.1 Eingriffe an den hirnersorgenden Arterien | | | | | | | | |
| F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | – | * | * | * | – |
| F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2 Erkrankungen der Aorta | | | | | | | | |
| F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien | | | | | | | | |
| F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.4 Amputationen | | | | | | | | |
| F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA) | | | | | | | | |
| F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5.4.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5.5.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5.6.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5.7.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| F.6 Arteriovenöser Shunt | | | | | | | | |
| F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| G Geburtshilfe und Frauenheilkunde | | | | | | | | |
| G.1 Geburten | | | | | | | | |
| <i>G.1.1.F Stationäre Geburten</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.2 Neugeborene | | | | | | | | |
| <i>G.2.1.F Neugeborene <1250 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.3.F Neugeborene <500 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.4.F Neugeborene 500–749 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.5.F Neugeborene 750–999 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie) | | | | | | | | |
| <i>G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovariektomie</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovariektomie</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| <i>G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane</i> | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |
| <i>G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 1 |
| <i>G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus</i> | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| <i>G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.5 Eingriffe an der Brust | | | | | | | | |
| <i>G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau | | | | | | | | |
| <i>G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.6.2.F OP bei Genitalprolaps</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | |
| H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie) | | | | | | | | |
| H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.2 Nierensteine | | | | | | | | |
| H.2.1.F HD Nierensteine | * | * | * | 3 | * | * | * | 0 |
| <i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i> | 0.0% | 49.3% | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.3 Eingriffe an der Harnblase | | | | | | | | |
| H.3.1.F HD Malignom der Blase | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.3.2.F TUR der Blase insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR) | | | | | | | | |
| <i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| H.5 Prostatakarzinom | | | | | | | | |
| <i>H.5.1.F HD Prostatakarzinom</i> | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | | | | | | | | |
| I.1 Gelenkersatz, Endoprothese | | | | | | | | |
| I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark | | | | | | | | |
| <i>I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule</i> | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| <i>I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule</i> | * | * | * | 19 | * | * | * | 5 |
| I.3 Hüftgelenknahe Frakturen | | | | | | | | |
| I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 2.9% | 0.0 | 10 | * | * | * | 1 |
| I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 1 |
| I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität | 0.0% | 2.5% | 0.0 | 11 | * | * | * | 2 |
| I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe | | | | | | | | |
| <i>I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen</i> | * | * | * | 4 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review) | | | | | | | | |
| J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren | | | | | | | | |
| J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| J.2 Sepsis | | | | | | | | |
| J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität | * | * | * | 4 | 20.0% | 22.3% | 0.9 | 10 |
| J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität | * | * | * | 3 | * | * | * | 2 |
| J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität | * | * | * | 1 | * | * | * | 8 |
| J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität | 6.7% | 12.4% | 0.5 | 45 | * | * | * | 1 |
| J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| J.3 Komplexe Konstellationen | | | | | | | | |
| J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | 0.0% | 5.2% | * | 0 | 0.0% | 8.2% | * | 0 |
| J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 |
| J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| K Hautkrankheiten | | | | | | | | |
| K.1 Hautkrankheiten | | | | | | | | |
| K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem | * | * | * | 2 | * | * | * | 0 |
| K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|--|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| L Hochspezialisierte Medizin | | | | | | | | |
| L.1 Herztransplantationen | | | | | | | | |
| L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.1.3.F Herztransplantation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.2 Lungentransplantationen | | | | | | | | |
| L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.2.2.F Lungentransplantation | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3 Lebertransplantationen | | | | | | | | |
| L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3.2.F Lebertransplantation, komplett | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.4 Pankreastransplantationen | | | | | | | | |
| L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5 Nierentransplantationen | | | | | | | | |
| L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogene, syngene | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.3.F Nierentransplantation, allogene, Leichenniere | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen | | | | | | | | |
| L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.6.8.F Andere Stammzelltherapien | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.7 Hypertherme Chemotherapie | | | | | | | | |
| L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC] | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| M Palliativmedizin | | | | | | | | |
| M.1 Palliativmedizin | | | | | | | | |
| M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |
| M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern) | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------|-----|----------|
| | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | SMR | Fallzahl |
| Y COVID–19 | | | | | | | | |
| Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion | | | | | | | | |
| Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19 | ... | ... | * | ... | 25.7% | 16.0% | * | 38 |
| Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labordiagnostischer Virusnachweis | ... | ... | * | ... | 36.8% | 22.2% | * | 14 |
| Y.2 COVID–19 – Überblick | | | | | | | | |
| Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 4 |
| Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung | ... | ... | * | ... | * | * | * | 4 |
| Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 5.9% | 15.6% | 0.4 | 17 |
| Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis | ... | ... | * | ... | 6.6% | 2.8% | * | 17 |
| Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 2 |
| Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 9.1% | 15.9% | 0.6 | 11 |
| Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 4 |
| Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 5 |
| Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen | ... | ... | * | ... | * | * | * | 5 |
| Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 6.7% | 16.7% | 0.4 | 15 |
| Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen | ... | ... | * | ... | 88.2% | 72.6% | * | 15 |
| Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung | | | | | | | | |
| Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung | ... | ... | * | ... | 0.0% | 12.8% | * | 0 |
| Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden) | ... | * | * | ... | * | * | * | 0 |
| Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 5.9% | 12.8% | 0.5 | 17 |
| Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19 | ... | * | * | ... | * | * | * | 0 |
| Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 5.9% | 13.0% | 0.5 | 17 |
| Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz | | | | | | | | |
| Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.5 COVID–19 – Komplikationen | | | | | | | | |
| Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität | ... | ... | ... | ... | * | * | * | 0 |
| Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND) | ... | ... | * | ... | 0.0% | 8.7% | * | 0 |
| Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND) | ... | ... | * | ... | * | * | * | 2 |
| Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität | ... | ... | ... | ... | 0.0% | 4.9% | 0.0 | 11 |
| Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis | ... | ... | * | ... | 0.0% | 1.2% | * | 0 |

| Krankheitsgruppe | 2015–2019 | | | 2020 | | |
|--|-------------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|----------|
| Z Zusatzinformationen | | | | | | |
| Z.1 Aufenthaltsdauer | Aufenthaltsdauer (Tage) | Fallzahl | | Aufenthaltsdauer (Tage) | Fallzahl | |
| A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | 4.5 | 10 | | * | 4 | |
| B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | * | 4 | | * | 2 | |
| E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer | * | 0 | | * | 0 | |
| Z.2 Verlegungsraten | beobacht. Rate | erwart. Rate | Fallzahl | beobacht. Rate | erwart. Rate | Fallzahl |
| A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | 7 | * | * | 1 |
| A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19) | 0.0% | 6.1% | 0 | 0.0% | 5.9% | 0 |
| A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19) | * | * | 0 | 0.0% | 17.7% | 0 |
| A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19) | * | * | 0 | 0.0% | 7.1% | 0 |
| A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19) | * | * | 0 | * | * | 0 |
| A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | 0 | * | * | 0 |
| A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19) | * | * | 0 | * | * | 0 |
| B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19) | * | * | 2 | 0.0% | 18.3% | 0 |
| B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) | * | * | 1 | 0.0% | 15.0% | 0 |
| D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen | * | * | 1 | 0.0% | 7.4% | 0 |
| D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19) | * | * | 1 | 0.0% | 3.9% | 0 |
| E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt | * | * | 0 | * | * | 0 |
| F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert | * | * | 0 | * | * | 0 |
| F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt | * | * | 0 | * | * | 0 |
| I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis | * | * | 0 | * | * | 0 |
| J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene) | * | * | 0 | * | * | 0 |
| J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis | * | * | 1 | 0.0% | 12.6% | 0 |