

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.1%	5.0%	1.2	2'464	6.4%	4.9%	1.3	534
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	101	0.0%	0.8%	0.0	28
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	2.4%	1.7%	1.4	878	1.2%	1.8%	0.7	161
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	6.4%	5.1%	1.2	1'163	7.5%	5.0%	1.5	281
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	17.4%	15.1%	1.2	322	17.2%	14.2%	1.2	64
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	6.8%	6.8%	1.0	2'174	7.2%	6.5%	1.1	473
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	6.6%	3.4%	1.9	61	0.0%	3.4%	0.0	10
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	78.8%	62.9%	*	1'941	77.7%	67.0%	*	415
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	80.0%	59.5%	*	1'922	79.2%	63.3%	*	415
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	31.1%	73.5%	*	19	0.0%	80.0%	*	0
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	80.0%	60.0%	*	1'922	79.2%	63.6%	*	415
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	2.4%	1.7%	*	60	*	*	*	9
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	8.2%	6.4%	1.3	833	9.3%	6.9%	1.4	193
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	33.8%	41.1%	*	833	36.1%	41.8%	*	193
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	3.9%	3.3%	1.2	1'561	3.6%	2.8%	1.3	331
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	13.4%	14.9%	0.9	868	15.6%	15.5%	1.0	243
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	8.3%	8.0%	1.0	2'792	9.7%	7.6%	1.3	601
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	2.6%	0.0	21	*	*	*	3
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	2.1%	3.1%	0.7	193	0.0%	2.4%	0.0	47
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	7.2%	6.4%	1.1	1'437	8.2%	6.3%	1.3	281
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	11.0%	10.9%	1.0	1'141	13.0%	9.9%	1.3	270
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	53.6%	56.0%	*	547	48.4%	54.4%	*	162
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	3'129	*	*	*	593
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.4%	3.2%	1.1	1'940	4.6%	3.5%	1.3	415
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	5.3%	3.2%	1.6	19	*	*	*	0
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	3
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.4%	1.5%	1.6	806	2.9%	2.0%	1.4	104
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	11	*	*	*	0
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	3
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	2.2%	1.2%	1.9	670	3.6%	1.5%	2.3	84
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.6%	1.3%	2.1	266	8.2%	1.4%	5.9	49
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	22.8%	42.5%	*	266	28.2%	47.2%	*	49
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	2.5%	0.8%	3.2	197	7.9%	0.8%	9.5	38
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	5	*	*	*	2
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	2'173	*	*	*	511

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	1'083	*	*	*	171
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	139	*	*	*	37
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	115	*	*	*	209
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	17	0.0%	0.0%	0.0	91
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	0.0%	0.5%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	21	*	*	*	3
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	1	*	*	*	1
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	19	*	*	*	2
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	8.0%	8.4%	0.9	2'226	7.2%	7.9%	0.9	402
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.2%	0.0	50	0.0%	2.9%	0.0	15
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	1.2%	3.8%	0.3	484	1.7%	3.2%	0.5	58
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	6.4%	7.7%	0.8	1'210	4.3%	7.0%	0.6	233
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	19.3%	15.5%	1.2	482	18.8%	13.8%	1.4	96
B.1.19.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Direktaufnahmen	20.9%	42.8%	*	370	19.9%	46.7%	*	76
B.1.20.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19), Zuverlegungen	*	*	*	4	*	*	*	1
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	5.7%	5.5%	1.0	1'647	6.5%	5.2%	1.2	321
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	6.6%	5.5%	1.2	1'305	6.5%	5.0%	1.3	306
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.3%	5.7%	0.4	342	6.7%	6.5%	1.0	15
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	3.4%	3.1%	*	45	10.8%	3.0%	*	33
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	*	*	*	7	*	*	*	2
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	8.4%	8.2%	1.0	154	6.5%	7.3%	0.9	31
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	9.4%	12.8%	*	154	9.7%	12.9%	*	31
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	2
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	*	*	*	1	*	*	*	2
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	32.9%	22.3%	1.5	82	31.2%	22.1%	1.4	16
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	5.0%	7.3%	*	82	5.0%	7.3%	*	16
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	25.5%	25.2%	1.0	243	11.1%	22.0%	0.5	36
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	1.4%	12.9%	0.1	74	15.4%	17.7%	0.9	13
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	7.6%	7.6%	1.0	262	6.2%	7.7%	0.8	32
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	11.8%	4.3%	*	262	8.0%	3.1%	*	32
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	576	0.0%	0.1%	0.0	133
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	17.0%	33.8%	*	98	13.5%	42.1%	*	18
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	146	*	*	*	25
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	796	*	*	*	132
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	31	*	*	*	5
B.5 Multiple Sklerose								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	137	*	*	*	16

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
C Altersmedizin								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	3'629	*	*	*	1'596
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	85.9%	70.5%	*	3'117	98.5%	84.0%	*	1'572
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	54.8	*	*	3'117	54.7	*	*	1'572
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	1.8%	17.2%	*	65	*	*	*	2
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	70.6	*	*	65	*	*	*	2
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	3.2%	2.2%	*	808	3.0%	2.5%	*	139
C.2 Mangelernährung bei Älteren								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	1.6%	1.8%	*	957	2.6%	2.8%	*	321
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	9.1%	15.6%	*	87	8.1%	15.7%	*	26
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.5%	5.8%	1.1	2'877	8.2%	9.4%	0.9	1'026
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	24	*	*	*	5
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.0%	0.6%	1.7	197	1.1%	0.9%	1.3	88
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.8%	2.3%	1.2	541	1.1%	2.2%	0.5	270
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.9%	5.4%	1.1	1'399	8.9%	10.5%	0.8	461
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	12.2%	11.0%	1.1	716	19.3%	20.1%	1.0	202
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	20	*	*	*	3
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.2%	4.0%	1.1	2'285	6.0%	7.5%	0.8	845
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.5%	0.3%	1.8	184	0.0%	0.3%	0.0	78
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.4%	0.8%	0.5	449	0.0%	1.1%	0.0	238
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.0%	3.3%	0.9	1'070	7.2%	8.5%	0.9	374
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	10.5%	8.8%	1.2	582	15.5%	18.9%	0.8	155
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	17.8%	18.7%	1.0	202	23.0%	21.5%	1.1	61
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	5.3%	3.7%	1.4	1'284	6.3%	4.1%	1.5	237
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	10.9%	6.3%	1.7	311	8.9%	7.1%	1.3	56
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	3.8%	2.8%	1.3	371	7.5%	3.6%	2.1	67
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	3.0%	1.9%	1.6	266	3.7%	2.7%	1.4	54
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	48	*	*	*	5
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	4.2%	3.3%	1.3	288	5.5%	3.2%	1.7	55
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	22.4%	21.5%	*	288	23.2%	18.7%	*	55
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	954	*	*	*	189
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.2%	1.8%	1.2	312	4.9%	1.9%	2.6	41
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	2
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	7	*	*	*	2
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.8%	1.5%	1.2	164	8.7%	2.1%	4.1	23
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	7.6%	6.5%	*	13	*	*	*	5
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	1.0%	5.4%	0.2	103	8.3%	4.7%	1.8	24

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.2%	0.2%	0.9	1'995	0.0%	0.2%	0.0	505
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	96.9%	96.5%	*	1'934	98.2%	97.0%	*	496
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.9	2'399	0.4%	0.1%	4.5	456
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	4.9%	4.4%	1.1	61	0.0%	1.5%	0.0	19
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	81.0%	22.6%	*	17	*	*	*	4
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	96.6%	96.8%	*	1'464	99.6%	98.3%	*	254
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	537	*	*	*	112
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	5	0.0%	0.3%	*	0
E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse	*	*	*	103	*	*	*	24
E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse	*	*	*	416	*	*	*	85
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	87	*	*	*	18
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom	*	*	*	915	*	*	*	237
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)	*	*	*	884	*	*	*	228
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.2%	5.0%	0.8	908	4.5%	4.7%	1.0	268
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	1.6%	2.7%	0.6	250	2.8%	2.2%	1.2	72
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	6.4%	8.0%	0.8	47	11.8%	4.3%	2.7	17
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.0%	2.5%	0.4	97	0.0%	2.0%	0.0	31
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	89	4.3%	0.8%	5.2	23
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	4.2%	3.9%	1.1	120	0.0%	3.7%	0.0	41
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	18.5%	36.4%	0.5	27	*	*	*	4
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	30	0.0%	4.7%	0.0	12
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	8.8%	6.8%	1.3	227	8.8%	5.9%	1.5	68
E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	9	*	*	*	3
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	0.0%	9.4%	0.0	26	*	*	*	9
E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	4.8%	5.7%	*	26	*	*	*	9
E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	1
E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	*	*	*	7	*	*	*	1
E.5 Erkrankungen des Magens								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom	*	*	*	216	*	*	*	62
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	6.1%	3.9%	1.6	442	2.4%	3.4%	0.7	82
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	802	*	*	*	196
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	2.3%	3.5%	0.6	44	0.0%	2.8%	0.0	15
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	0.4%	0.4%	1.1	758	0.0%	0.2%	0.0	181
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	6.7%	5.8%	1.2	75	0.0%	3.3%	0.0	34
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	8.6%	5.4%	1.6	35	0.0%	3.4%	0.0	14
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	3.8%	6.5%	0.6	26	*	*	*	6
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
E.8 Bariatrische Eingriffe								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.1%	0.1%	2.2	669	0.0%	0.0%	*	159

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnersorgenden Arterien								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	62	2.4%	1.3%	1.9	41
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	2
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	103	*	*	*	40
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	99	*	*	*	33
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	2.3%	3.6%	0.6	43	18.2%	3.0%	6.0	11
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	35	0.0%	0.7%	0.0	13
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	4
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	4	*	*	*	7
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	2
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	4
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	45.5%	36.3%	1.3	55	60.0%	39.0%	1.5	15
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	43.8%	23.8%	1.8	16	*	*	*	5
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	1.8%	4.1%	0.5	327	8.5%	4.8%	1.8	94
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	59	0.0%	0.7%	0.0	19
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	30	*	*	*	2
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	0.0%	3.3%	0.0	43	*	*	*	7
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	4.2%	5.6%	0.7	72	6.5%	9.4%	0.7	31
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	0.0%	4.7%	0.0	27	*	*	*	4
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	38	0.0%	1.9%	0.0	11
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	14	*	*	*	9
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	44	*	*	*	11
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.7%	2.7%	1.0	407	3.8%	2.4%	1.6	79
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	8.8%	11.3%	0.8	91	27.3%	10.1%	2.7	11
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	3.5%	2.7%	1.3	479	4.1%	2.9%	1.4	121
F.5.4.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	3.6%	0.4%	8.2	55	0.0%	0.1%	0.0	12
F.5.5.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	17	*	*	*	9
F.5.6.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	3.7%	2.6%	1.4	135	3.3%	2.9%	1.2	30
F.5.7.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	3.7%	4.4%	0.8	272	5.7%	4.4%	1.3	70
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	65	*	*	*	15
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	38	*	*	*	11
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	37	*	*	*	16

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	7'974	*	*	*	1'593
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	*	*	*	1	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.8%	2.9%	*	208	4.0%	2.8%	*	45
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	15.7%	16.7%	*	855	14.7%	11.8%	*	164
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	31.5%	32.4%	*	2'512	30.0%	32.2%	*	478
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	27.8%	27.1%	*	1'999	25.6%	27.3%	*	369
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	26.0%	24.2%	*	1'457	23.7%	24.1%	*	266
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	34.3%	34.6%	*	542	32.4%	34.9%	*	103
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	13	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	11	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	2	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	1	*	*	*	1
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	254	*	*	*	35
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	7'806	*	*	*	1'578
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	784	0.0%	0.0%	0.0	116
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	81.8%	84.4%	*	641	87.8%	87.9%	*	101
G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	22.8%	38.2%	*	179	14.8%	30.5%	*	17
G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	58.9%	46.3%	*	462	73.0%	57.4%	*	84
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	10.4%	8.8%	*	24	*	*	*	5
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	18.5%	34.3%	*	45	*	*	*	9
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	1'149	*	*	*	226
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	1'601	*	*	*	301
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	148	*	*	*	29
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	2.1%	0.7%	2.9	48	*	*	*	8
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	261	*	*	*	39
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	94	0.0%	0.4%	0.0	21
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'060	*	*	*	211
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	867	*	*	*	178
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	79.5%	73.7%	*	689	75.8%	73.8%	*	135
G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau								
G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt	*	*	*	312	*	*	*	34
G.6.2.F OP bei Genitalprolaps	*	*	*	193	*	*	*	21
G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps	*	*	*	106	*	*	*	11
G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose	*	*	*	13	*	*	*	2

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	35	*	*	*	6
<i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	33.0%	39.6%	*	35	*	*	*	6
<i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	37.1%	53.5%	*	13	*	*	*	2
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	0.0%	*	10	*	*	*	1
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	71	0.0%	1.8%	0.0	26
<i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	38.0%	33.7%	*	27	46.2%	37.7%	*	12
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	34	*	*	*	7
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	2'735	*	*	*	640
<i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i>	48.4%	49.3%	*	1'323	53.1%	50.8%	*	340
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	955	*	*	*	255
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	903	*	*	*	238
<i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i>	*	*	*	740	*	*	*	201
<i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i>	33.8%	15.1%	*	250	19.4%	16.6%	*	39
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	0.0%	3.8%	0.0	30	0.0%	1.8%	0.0	11
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
<i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i>	2.3%	2.6%	*	16	*	*	*	3
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	523	0.0%	0.1%	0.0	95
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.5%	0.4%	1.3	183	0.0%	0.8%	0.0	37
H.5 Prostatakarzinom								
<i>H.5.1.F HD Prostatakarzinom</i>	*	*	*	536	*	*	*	118
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	81	0.0%	0.0%	0.0	28

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	2'093	0.0%	0.0%	0.0	265
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	4.5%	3.7%	1.2	693	5.1%	4.3%	1.2	136
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	4.7%	2.7%	1.7	169	2.9%	2.6%	1.1	35
<i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	2.0%	1.4%	*	41	*	*	*	4
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	189	4.0%	0.3%	15.0	25
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	5.2%	3.6%	1.4	116	10.0%	4.0%	2.5	20
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.1%	0.0%	2.9	1'895	0.0%	0.0%	0.0	230
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	150	0.0%	0.1%	0.0	16
<i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	1.8%	1.3%	*	34	*	*	*	5
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	152	0.0%	0.0%	0.0	32
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	8.1%	4.4%	1.8	37	0.0%	1.5%	0.0	12
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	3.6%	4.3%	0.8	83	5.0%	5.2%	1.0	20
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
<i>I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i>	*	*	*	2'667	*	*	*	608
<i>I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie</i>	*	*	*	158	*	*	*	29
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	7.0%	5.1%	1.4	43	*	*	*	2
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.5%	1.8%	0.3	184	3.1%	1.4%	2.2	32
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	2.4%	5.7%	0.4	41	*	*	*	5
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.3%	0.1%	3.3	378	0.0%	0.0%	0.0	68
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	188	0.0%	0.2%	0.0	27
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.5%	0.3%	1.9	183	0.0%	0.3%	0.0	26
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	0.4%	0.1%	3.3	258	0.0%	0.0%	*	39
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	451	0.8%	0.0%	21.8	131
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.3%	0.3%	1.0	679	1.1%	0.4%	2.9	179
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	2.3%	1.5%	1.5	260	3.0%	1.0%	3.1	99
<i>I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)</i>	*	*	*	5	*	*	*	1
<i>I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule</i>	*	*	*	908	*	*	*	171
<i>I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule</i>	*	*	*	1'483	*	*	*	242
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	5.1%	3.7%	1.4	936	4.2%	3.9%	1.1	190
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	71	0.0%	0.1%	0.0	13
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	1.2%	0.7%	1.8	84	0.0%	1.1%	0.0	23
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	3.1%	1.8%	1.7	195	0.0%	1.9%	0.0	34
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	3.9%	3.0%	1.3	178	2.5%	3.0%	0.8	40
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	7.9%	4.6%	1.7	227	5.3%	3.8%	1.4	38
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	8.8%	7.9%	1.1	181	11.9%	9.1%	1.3	42
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.2%	3.6%	1.4	868	5.0%	4.3%	1.2	179
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
<i>I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen</i>	*	*	*	79	*	*	*	14

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	21.6%	27.9%	0.8	1'216	25.3%	29.3%	0.9	265
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	21.7%	28.1%	0.8	1'108	24.8%	29.2%	0.8	246
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	18.7%	26.5%	0.7	519	28.0%	30.0%	0.9	82
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	23.8%	29.9%	0.8	697	24.0%	29.4%	0.8	183
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	132.0	*	*	1'216	173.8	*	*	265
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	42.1%	41.9%	*	133	41.2%	43.0%	*	28
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	0	*	*	*	0
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	5	*	*	*	0
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	13.8%	21.8%	0.6	3'156	12.3%	20.1%	0.6	568
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	16.3%	25.2%	0.6	2'007	37.1%	38.2%	1.0	70
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	9.6%	11.1%	0.9	1'149	8.8%	14.1%	0.6	498
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	8.1%	11.7%	0.7	5'940	22.8%	28.2%	0.8	180
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	25.5%	36.9%	0.7	564	35.0%	41.7%	0.8	40
J.3 Komplexe Konstellationen								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	7.0%	5.2%	*	305	9.2%	8.2%	*	99
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	137	*	*	*	26
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	75	*	*	*	14
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	111	*	*	*	21
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	108	*	*	*	24
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	5	*	*	*	1

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
L Hochspezialisierte Medizin								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.4 Pankreastransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogene, syngene	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogene, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7 Hypertherme Chemotherapie								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	0	*	*	*	0
M Palliativmedizin								
M.1 Palliativmedizin								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	612	*	*	*	233
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern)	*	*	*	535	*	*	*	227

Krankheitsgruppe	2015–2019				2020			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
Y COVID–19								
Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion								
Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19	*	...	12.3%	16.0%	*	2'294
Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labordiagnostischer Virusnachweis	*	...	28.6%	22.2%	*	655
Y.2 COVID–19 – Überblick								
Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität	6.3%	6.1%	1.0	63
Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung	*	...	0.2%	0.3%	*	63
Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Mortalität	9.3%	11.2%	0.8	751
Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis	*	...	2.5%	2.8%	*	751
Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität	*	*	*	3
Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	62
Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität	1.4%	3.0%	0.5	222
Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität	9.2%	13.5%	0.7	336
Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität	28.1%	24.8%	1.1	128
Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität	10.6%	13.2%	0.8	605
Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen	*	...	80.6%	72.9%	*	605
Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität	10.4%	14.0%	0.7	556
Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen	*	...	74.0%	72.6%	*	556
Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung								
Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	18.5%	23.7%	0.8	92
Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung	*	...	12.3%	12.8%	*	92
Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden)	...	*	*	...	264.0	*	*	92
Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	8.0%	9.3%	0.9	659
Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität	21.6%	29.8%	0.7	74
Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19	...	*	*	...	274.5	*	*	74
Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität	8.0%	9.3%	0.9	677
Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz								
Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	*	*	*	0
Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	*	*	*	0
Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	0
Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	0
Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität	*	*	*	0
Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität	*	*	*	0
Y.5 COVID–19 – Komplikationen								
Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität	26.8%	31.0%	0.9	41
Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND)	*	...	5.5%	8.7%	*	41
Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND)	*	...	4.9%	7.9%	*	37
Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität	2.2%	4.7%	0.5	137
Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis	*	...	*	*	*	2

Krankheitsgruppe	2015–2019			2020		
Z Zusatzinformationen						
Z.1 Aufenthaltsdauer	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl		Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	5.8	2'442		4.7	516	
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	12.6	1'595		6.3	286	
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.5	1'995		4.1	505	
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.8	2'399		2.7	456	
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.3	60		6.1	41	
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	3.8	784		3.2	116	
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.8	703		4.1	132	
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.8	2'037		5.5	254	
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.4	1'850		6.6	221	
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	3.0	1'670		2.5	200	
Z.2 Verlegungsraten	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	10.4%	28.0%	240	10.2%	25.6%	51
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	2.4%	6.1%	62	2.2%	5.9%	12
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	5.7%	24.4%	107	4.0%	17.7%	16
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	6.9%	6.7%	54	*	*	8
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	0.0%	6.9%	0	*	*	0
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	13.1%	18.4%	269	15.3%	18.3%	57
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	8.0%	14.7%	125	10.0%	15.0%	30
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	1.7%	3.8%	37	3.1%	7.4%	25
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	1.4%	3.9%	17	*	*	4
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	*	*	7	*	*	3
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	0.0%	2.5%	0	0.0%	2.5%	0
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	2	*	*	1
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	*	*	4	0.0%	0.5%	0
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	9.3%	18.5%	89	7.1%	20.7%	14
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	4.6%	12.2%	125	5.6%	12.6%	28