

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.0%	3.9%	1.0	4'811	3.1%	3.7%	0.8	940
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	210	0.0%	1.2%	0.0	55
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.4%	1.7%	0.8	2'024	1.3%	1.7%	0.8	393
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	4.7%	4.6%	1.0	2'186	3.1%	4.4%	0.7	414
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	15.3%	13.1%	1.2	391	14.1%	12.8%	1.1	78
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	5.5%	4.5%	1.2	2'450	4.3%	4.0%	1.1	483
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.4%	2.7%	0.9	2'361	1.8%	3.1%	0.6	457
A.1.18.M HD Herzinfarkt (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	32.1%	37.6%	0.9	53	27.3%	29.2%	0.9	22
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	94.3%	65.1%	*	4'536	92.0%	67.1%	*	865
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	91.6%	61.7%	*	2'245	88.8%	64.2%	*	429
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	97.0%	76.7%	*	2'291	95.4%	77.9%	*	436
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	92.4%	62.0%	*	2'264	92.5%	64.7%	*	447
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	0.8%	1.7%	*	38	*	*	*	1
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.7%	5.7%	1.0	2'207	4.2%	5.7%	0.7	430
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	46.0%	41.7%	*	2'207	45.8%	41.9%	*	430
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.2%	2.2%	1.0	2'557	2.2%	2.0%	1.1	508
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	16.9%	14.5%	1.2	835	11.7%	13.6%	0.9	179
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	8.3%	7.3%	1.1	2'405	9.0%	7.3%	1.2	520
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	20	*	*	*	8
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	3.7%	2.6%	1.5	241	3.8%	2.9%	1.3	52
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	7.2%	6.2%	1.2	1'230	7.3%	5.9%	1.2	274
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	11.1%	10.2%	1.1	914	13.4%	11.0%	1.2	186
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	58.8%	55.5%	*	533	50.9%	57.1%	*	110
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	11'030	*	*	*	1'955
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.2%	3.0%	0.7	4'265	1.7%	2.9%	0.6	814
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.6%	2.1%	0.8	2'143	1.0%	2.5%	0.4	408
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	26.1%	32.7%	0.8	46	22.2%	25.4%	0.9	18
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.4%	1.8%	0.8	2'463	3.0%	1.8%	1.7	331
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.4%	2.9%	0.5	570	2.0%	2.4%	0.8	102
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	25.0%	41.0%	0.6	20	*	*	*	4
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.2%	1.4%	0.8	2'208	2.1%	1.4%	1.5	283
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.9%	1.1%	0.8	2'742	0.0%	1.1%	0.0	528
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	50.2%	45.7%	*	2'742	59.5%	49.7%	*	528
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.0%	4.3%	0.7	164	0.0%	6.3%	0.0	24
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	1
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.7%	0.9	2'657	0.0%	0.6%	0.0	514
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	6	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	2'962	*	*	*	782

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	1'571	*	*	*	361
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	409	*	*	*	72
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	1'249	*	*	*	386
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.2%	0.1%	3.5	856	0.0%	0.0%	0.0	276
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	*	*	*	7	*	*	*	1
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	244	*	*	*	86
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	3'278	*	*	*	903
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	1'714	*	*	*	515
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	1'401	*	*	*	375
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	921	*	*	*	217
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	681	*	*	*	188
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	2	*	*	*	1
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	615	*	*	*	122
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.9%	1.1%	1.8	209	9.1%	2.4%	3.8	22
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	2
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	1.5%	0.9%	1.7	203	10.0%	2.0%	5.0	20
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.4%	0.7%	2.2	207	4.8%	1.1%	4.3	21
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	20.0%	8.1%	2.5	10	*	*	*	2
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.5%	3.9%	0.9	396	3.1%	4.4%	0.7	98
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	2.1%	2.0%	1.1	467	0.8%	1.9%	0.4	125
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	1.7%	1.9%	0.9	420	0.0%	1.9%	0.0	112
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	6.4%	6.1%	1.1	47	7.7%	2.6%	3.0	13
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	0.0%	3.5%	0.0	48	0.0%	1.5%	0.0	19
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.8%	2.2%	0.8	273	1.4%	1.9%	0.7	71
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	0.4%	1.1%	0.4	231	0.0%	0.6%	0.0	68
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.5%	1.1%	1.4	741	0.0%	0.9%	0.0	203
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	44	*	*	*	5
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	165	0.0%	0.3%	0.0	50
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	1.4%	1.0%	1.5	276	0.0%	0.7%	0.0	80
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	1.8%	1.5%	1.2	227	0.0%	0.9%	0.0	58
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	10.3%	3.2%	3.2	29	0.0%	5.3%	0.0	10
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	8.0%	5.9%	1.4	387	4.0%	4.0%	1.0	101
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	7.0%	7.8%	*	52	*	*	*	8
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	0.0%	0.2%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	3	0.0%	0.8%	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	5.4%	8.0%	0.7	1'510	4.3%	8.0%	0.5	368
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	64	0.0%	3.1%	0.0	19
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	1.3%	3.5%	0.4	297	1.6%	3.6%	0.5	61
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	3.4%	7.1%	0.5	787	3.1%	6.8%	0.5	196
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	13.8%	14.7%	0.9	362	9.8%	14.6%	0.7	92
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	4.4%	5.3%	0.8	1'353	4.6%	5.4%	0.9	346
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	4.3%	5.4%	0.8	1'183	4.3%	5.4%	0.8	282
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	5.3%	4.8%	1.1	170	6.2%	5.4%	1.2	64
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	0.0%	3.1%	*	0	0.0%	3.2%	*	0
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	0.0%	9.3%	*	0	0.0%	6.9%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	2.4%	7.3%	0.3	167	3.0%	6.5%	0.5	33
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	12.3%	12.9%	*	167	9.5%	14.6%	*	33
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	0.0%	7.3%	*	0	0.0%	8.9%	*	0
B.1.21.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 20–69) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.22.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 70–79) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.23.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 80–89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.24.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	17.7%	23.1%	0.8	79	18.8%	21.2%	0.9	16
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	5.8%	6.8%	*	79	4.6%	6.5%	*	16
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	13.3%	24.2%	0.5	113	0.0%	26.7%	0.0	18
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	8.6%	18.0%	0.5	35	*	*	*	4
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	0
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	*	*	*	9	0.0%	3.5%	*	0
B.1.25.M TIA, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	491	0.0%	0.1%	0.0	169
B.2 Behandlung auf Stroke Unit								
B.2.3.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit)	*	*	*	1'749	*	*	*	400
B.2.4.P Anteil Hirninfarkt mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	84.1%	51.2%	*	1'138	71.4%	53.6%	*	247
B.2.2.P Anteil TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	77.6%	39.1%	*	381	69.2%	41.5%	*	117
B.2.5.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Direktaufnahmen	82.4%	48.1%	*	1'353	68.2%	50.1%	*	298
B.2.6.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Zuverlegungen	81.8%	49.8%	*	166	84.6%	54.9%	*	66
B.2.7.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei anderen Diagnosen oder Alter <20	*	*	*	230	*	*	*	36
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	43	*	*	*	8
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	311	*	*	*	78
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	60	*	*	*	13
B.5 Multiple Sklerose								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	44	*	*	*	12

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
C Altersmedizin								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des motorischen Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.7.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit erweitertem Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.8.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit kognitivem FIM	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.9.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit MMSE	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	3.8%	2.3%	*	1'055	4.2%	2.4%	*	262
C.2 Mangelernährung bei Älteren								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	1.8%	2.3%	*	765	1.4%	2.9%	*	127
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	22.0%	15.5%	*	168	27.6%	14.5%	*	35

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	7.3%	6.6%	1.1	2'880	6.7%	6.6%	1.0	570
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.4%	0.3%	1.3	268	0.0%	0.3%	0.0	61
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.8%	0.6%	1.3	250	2.6%	1.2%	2.2	39
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.1%	2.3%	0.9	666	4.4%	3.0%	1.4	91
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	8.2%	7.9%	1.0	1'119	6.6%	7.3%	0.9	259
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	17.5%	14.8%	1.2	577	13.3%	12.7%	1.0	120
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	210	0.0%	0.2%	0.0	47
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.0%	5.6%	1.1	1'998	6.1%	5.6%	1.1	395
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	204	0.0%	0.5%	0.0	34
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.4%	1.0%	0.4	540	1.4%	1.4%	1.0	71
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.8%	5.8%	1.0	806	4.6%	5.3%	0.9	195
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	15.8%	13.0%	1.2	448	14.7%	11.3%	1.3	95
D.1.15.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor, Mukoviszidose oder COVID–19, Direktaufnahmen, Mortalität	5.4%	4.1%	1.3	1'316	4.0%	3.9%	1.0	248
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	16.7%	19.7%	0.8	228	10.0%	20.0%	0.5	40
D.1.14.M HD Bronchitis/Bronchiolitis, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	2.0%	0.7%	3.1	98	4.5%	0.9%	5.2	22
D.1.16.M Nosokomiale Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	17.8%	19.0%	0.9	90	7.2%	15.8%	0.5	69
D.1.17.M Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	36.0%	31.0%	1.2	25	14.3%	22.9%	0.6	21
D.1.17.P Anteil Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	27.8%	29.5%	*	25	30.4%	23.7%	*	21
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	4.7%	3.7%	1.3	815	6.0%	4.7%	1.3	166
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	5.9%	6.3%	0.9	169	2.7%	7.4%	0.4	37
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	6.0%	3.0%	2.0	266	11.6%	4.8%	2.4	43
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	2.6%	1.8%	1.5	190	2.9%	2.7%	1.1	34
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	3.2%	1.4%	2.3	31	*	*	*	7
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	3.8%	2.9%	1.3	159	6.7%	3.4%	1.9	45
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	19.5%	20.3%	*	159	27.1%	22.6%	*	45
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	1'057	*	*	*	194
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.5%	1.7%	0.9	595	0.0%	1.2%	0.0	132
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	15.4%	7.0%	2.2	13	*	*	*	3
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	3.9%	4.4%	*	13	*	*	*	3
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.6%	1.5%	1.1	317	0.0%	1.0%	0.0	78
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	5.8%	6.7%	*	19	*	*	*	5
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	3.1%	4.9%	0.6	96	6.9%	4.2%	1.6	29

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.2%	0.2%	0.9	1'308	0.0%	0.2%	0.0	314
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	98.2%	97.1%	*	1'284	98.4%	97.5%	*	309
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	2.7	2'016	0.5%	0.1%	4.5	429
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	15.6%	5.7%	2.7	32	*	*	*	6
<i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>	92.9%	18.8%	*	13	*	*	*	3
<i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19</i>	98.4%	98.2%	*	1'255	98.7%	98.7%	*	227
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
<i>E.3.1.F Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	601	*	*	*	162
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	*	*	*	1	0.0%	0.2%	*	0
<i>E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse</i>	*	*	*	154	*	*	*	34
<i>E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse</i>	*	*	*	434	*	*	*	125
<i>E.3.3.F Radiojodtherapie</i>	*	*	*	539	*	*	*	87
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
<i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	1'014	*	*	*	182
<i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>	*	*	*	610	*	*	*	112
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	5.4%	4.5%	1.2	926	1.5%	3.7%	0.4	202
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	0.4%	2.2%	0.2	242	0.0%	2.3%	0.0	45
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	9.9%	7.6%	1.3	71	6.7%	7.3%	0.9	15
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	3.1%	2.2%	1.5	127	3.3%	1.7%	1.9	30
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	96	0.0%	0.0%	*	24
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	1.9%	3.4%	0.6	103	0.0%	1.8%	0.0	23
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	42.9%	34.1%	1.3	42	*	*	*	8
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	2.9%	2.3%	1.3	34	0.0%	0.8%	0.0	13
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	8.1%	5.8%	1.4	209	0.0%	4.1%	0.0	44
<i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>	2.5%	3.3%	*	11	*	*	*	1
<i>E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität</i>	0.0%	8.5%	0.0	40	*	*	*	6
<i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>	7.2%	5.4%	*	40	*	*	*	6
E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	0.0%	2.6%	0.0	16	*	*	*	2
<i>E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>	17.0%	9.1%	*	16	*	*	*	2
E.5 Erkrankungen des Magens								
<i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>	*	*	*	298	*	*	*	60
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	2.7%	3.5%	0.8	336	9.0%	4.1%	2.2	67
<i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>	*	*	*	378	*	*	*	100
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	3.4%	0.0	50	0.0%	1.7%	0.0	12
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	1.6%	3.3%	0.5	64	*	*	*	3
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	0.8%	1.2%	0.7	264	0.0%	0.1%	0.0	85
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	3.2%	3.9%	0.8	94	0.0%	4.1%	0.0	13
E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	2.8%	4.7%	0.6	283	3.3%	2.9%	1.1	61
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	3.1%	3.9%	0.8	194	5.9%	2.1%	2.9	34
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	2.6%	5.9%	0.4	38	0.0%	5.5%	0.0	11
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	1.3%	3.8%	0.3	78	0.0%	2.9%	0.0	13
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	1.8%	4.9%	0.4	55	0.0%	3.3%	0.0	12
E.8 Bariatrische Eingriffe								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	230	0.0%	0.0%	*	82

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.8%	0.8	172	0.0%	0.5%	0.0	34
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	0.0%	4.1%	0.0	53	8.3%	3.4%	2.5	12
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	3
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	46	*	*	*	8
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	0.0%	7.0%	0.0	12	*	*	*	2
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	610	*	*	*	162
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	216	*	*	*	44
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	4.9%	3.5%	1.4	61	0.0%	1.8%	0.0	14
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.8%	0.7%	1.2	119	5.0%	1.8%	2.7	20
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	2
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	3
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	394	*	*	*	118
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	7.5%	5.0%	1.5	93	6.2%	3.8%	1.7	32
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	5.5%	5.7%	1.0	254	0.0%	3.3%	0.0	71
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	13.6%	9.6%	1.4	22	*	*	*	4
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	44.4%	36.8%	1.2	81	48.0%	36.6%	1.3	25
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	11.9%	24.5%	0.5	42	25.0%	25.5%	1.0	16
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	2.7%	4.0%	0.7	410	1.3%	3.2%	0.4	75
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	75	0.0%	0.1%	0.0	28
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	25	*	*	*	7
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	5.9%	2.3%	2.6	34	*	*	*	3
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	2.4%	6.8%	0.4	124	0.0%	3.0%	0.0	14
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	3.6%	4.1%	0.9	56	*	*	*	5
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	52	*	*	*	7
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	21	*	*	*	4
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	23	*	*	*	7
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.8%	2.2%	1.3	141	0.0%	2.1%	0.0	15
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	0.0%	9.8%	0.0	27	*	*	*	2
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	3.5%	2.6%	1.4	772	2.3%	2.6%	0.9	131
F.5.4.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.8%	0.3%	3.2	124	0.0%	0.5%	0.0	25
F.5.5.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	49	*	*	*	9
F.5.6.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	6.0%	2.6%	2.3	149	0.0%	2.5%	0.0	22
F.5.7.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	3.8%	4.0%	0.9	450	4.0%	4.1%	1.0	75
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	78	*	*	*	6
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	52	*	*	*	7
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	44	*	*	*	11

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	10'910	*	*	*	2'201
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.4%	2.8%	*	234	3.0%	2.8%	*	40
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	15.9%	13.6%	*	1'091	9.1%	10.1%	*	122
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	37.1%	32.2%	*	4'046	39.4%	32.8%	*	867
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	32.1%	27.0%	*	3'110	34.6%	27.9%	*	675
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	28.6%	24.0%	*	1'732	31.8%	24.8%	*	379
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	38.0%	34.3%	*	1'378	38.9%	34.9%	*	296
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	9	*	*	*	5
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	2	*	*	*	1
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	4	*	*	*	1
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	3	*	*	*	3
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	2	*	*	*	1
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	29	*	*	*	1
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	746	*	*	*	133
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	11'208	*	*	*	2'281
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	559	0.8%	0.0%	17.6	133
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	69.9%	87.0%	*	391	65.4%	90.2%	*	87
G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	17.7%	33.6%	*	99	19.5%	29.3%	*	26
G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	52.2%	53.5%	*	292	45.9%	60.8%	*	61
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	9.6%	7.9%	*	21	*	*	*	7
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	40.6%	36.3%	*	73	33.3%	38.2%	*	15
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	720	*	*	*	100
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	1'336	*	*	*	245
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	208	*	*	*	51
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	97	0.0%	0.4%	0.0	27
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	322	*	*	*	68
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.7%	0.2%	2.8	149	0.0%	0.4%	0.0	30
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	728	*	*	*	138
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	587	*	*	*	94
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	72.1%	73.9%	*	423	78.7%	74.3%	*	74
G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau								
G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt	*	*	*	297	*	*	*	79
G.6.2.F OP bei Genitalprolaps	*	*	*	158	*	*	*	53
G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps	*	*	*	131	*	*	*	23
G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose	*	*	*	8	*	*	*	3

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	74	0.0%	0.1%	0.0	21
<i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	45.4%	42.1%	*	74	52.5%	45.1%	*	21
<i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	83.8%	58.4%	*	62	90.5%	62.2%	*	19
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	0.0%	*	30	*	*	*	3
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	89	0.0%	1.0%	0.0	19
<i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	71.9%	36.7%	*	64	73.7%	38.1%	*	14
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	1.8%	0.0	30	*	*	*	7
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	2'002	*	*	*	330
<i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i>	52.1%	50.4%	*	1'043	53.6%	51.9%	*	177
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	827	*	*	*	154
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	704	*	*	*	129
<i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i>	*	*	*	539	*	*	*	101
<i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i>	11.3%	16.2%	*	61	11.9%	17.4%	*	12
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	6.8%	2.4%	2.8	73	3.6%	4.3%	0.8	28
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	1
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
<i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i>	3.4%	2.5%	*	23	*	*	*	3
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	516	0.0%	0.0%	0.0	96
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	151	0.0%	0.2%	0.0	29
H.5 Prostatakarzinom								
<i>H.5.1.F HD Prostatakarzinom</i>	*	*	*	912	*	*	*	164
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.3%	0.1%	4.3	340	0.0%	0.1%	0.0	82
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	446	0.0%	0.1%	0.0	155
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	3.3%	3.9%	0.8	336	10.1%	4.2%	2.4	79
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	2.4%	3.5%	0.7	83	0.0%	3.7%	0.0	22
<i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	*	*	*	9	*	*	*	2
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	55	*	*	*	9
<i>I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	20	*	*	*	2
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	439	0.0%	0.0%	0.0	219
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	32	0.0%	0.0%	0.0	18
<i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	3.2%	1.3%	*	14	*	*	*	2
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	14	*	*	*	5
<i>I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	2
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	5.6%	4.2%	1.3	36	*	*	*	7
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	1'925	*	*	*	422
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	364	*	*	*	64
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	20	*	*	*	5
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.9%	2.1%	0.4	107	0.0%	1.1%	0.0	36
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	3.7%	3.6%	1.0	27	*	*	*	9
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	18	*	*	*	3
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	380	0.0%	0.2%	0.0	83
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.5%	0.1%	5.6	209	0.0%	0.1%	0.0	48
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	94	0.0%	0.5%	0.0	23
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	313	0.0%	0.2%	0.0	28
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	402	0.0%	0.0%	*	80
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	56	0.0%	0.4%	0.0	15
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	1.0%	1.2%	0.8	299	0.0%	0.8%	0.0	92
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	3	0.0%	0.4%	*	0
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	378	*	*	*	45
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	1'143	*	*	*	102
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.9.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	3.0%	3.4%	0.9	397	8.7%	4.0%	2.2	92
I.3.10.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	3.3%	3.9%	0.9	330	10.1%	4.2%	2.4	79
I.3.11.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	1.5%	1.0%	1.6	67	0.0%	4.6%	0.0	13
I.3.12.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme– oder Folgetag	73.3%	56.6%	*	291	90.2%	66.9%	*	83
I.3.13.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	0.0%	9.1%	*	0	0.0%	9.9%	*	0
I.3.14.M Petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	4.6%	3.5%	1.3	437	2.6%	4.1%	0.6	77
I.3.15.M Petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
I.3.16.M Petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	4.6%	3.4%	1.3	431	2.6%	4.1%	0.6	77
I.3.17.P Anteil petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme– oder Folgetag	80.8%	65.8%	*	353	93.5%	76.3%	*	72
I.3.18.P Anteil petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	0.0%	11.0%	*	0	0.0%	12.8%	*	0
I.3.19.M Konservative Versorgung bei petrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	4.4%	2.8%	1.6	90	4.5%	2.0%	2.3	44
I.3.20.M Konservative Versorgung bei petrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	3
I.3.21.M Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur bei Tumor, Hüftfraktur oder Sonderprothese (Alter >19), Mortalität	3.6%	5.2%	0.7	140	3.2%	5.0%	0.7	31
I.3.22.F Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur gemäss G–BA Richtlinie (Alter >17)	*	*	*	1'033	*	*	*	220
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	131	*	*	*	22
I.5 Endoprothese am Schulter–/Ellenbogengelenk								
I.5.1.F Endoprothese am Schulter–/Ellenbogengelenk	*	*	*	90	*	*	*	19
I.6 Polytraumen								
I.6.1.F Polytrauma im Sinne der DRG–Definition	*	*	*	127	*	*	*	21

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	26.6%	28.0%	0.9	1'381	26.6%	28.8%	0.9	244
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	26.3%	28.3%	0.9	1'031	28.4%	29.2%	1.0	162
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	25.3%	26.5%	1.0	805	20.0%	25.8%	0.8	155
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	28.3%	29.2%	1.0	576	38.2%	32.2%	1.2	89
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	153.6	*	*	1'381	171.9	*	*	244
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	42.3%	42.4%	*	141	35.4%	41.6%	*	23
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	176	*	*	*	32
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	46	*	*	*	7
J.1.9.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene, ohne COVID–19), Mortalität	26.8%	27.9%	1.0	1'240	25.4%	28.8%	0.9	213
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	25.6%	18.6%	1.4	853	25.6%	18.0%	1.4	195
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	27.0%	20.6%	1.3	784	28.1%	20.5%	1.4	171
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	8.7%	7.4%	1.2	69	8.3%	7.9%	1.1	24
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	18.6%	16.2%	1.1	1'199	25.0%	30.3%	0.8	140
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	26.1%	25.9%	1.0	744	28.2%	33.8%	0.8	124
J.2.6.M SIRS ohne Organkomplikationen, Mortalität	5.0%	4.5%	1.1	60	*	*	*	1
J.3 Komplexe Konstellationen								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	6.9%	8.0%	*	992	7.1%	9.8%	*	314
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	130	*	*	*	25
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	74	*	*	*	17
J.3.4.P Anteil Transfusionen gesamt	10.1%	10.5%	*	4'972	4.4%	4.1%	*	1'098
J.3.5.P Anteil Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation)	8.1%	4.9%	*	403	8.6%	4.6%	*	94
J.3.6.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), konservativ versorgt, Mortalität	29.2%	43.8%	0.7	24	40.0%	50.8%	0.8	10
J.3.7.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), operativ versorgt, Mortalität	28.8%	29.0%	1.0	379	27.4%	27.4%	1.0	84
J.3.8.M ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP, Mortalität	18.7%	14.8%	1.3	428	15.3%	16.2%	0.9	98
J.3.8.P Anteil ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP	0.5%	0.5%	*	428	0.5%	0.6%	*	98
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	30	*	*	*	4
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	47	*	*	*	6
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	8	*	*	*	2
L Hochspezialisierte Medizin								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
L Hochspezialisierte Medizin								
L.4 Pankreastretransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogren, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogren, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	60	*	*	*	15
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	59	*	*	*	15
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	59	*	*	*	15
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7 Hypertherme Chemotherapie								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	12	*	*	*	5
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	1	*	*	*	0
M Palliativmedizin								
M.1 Palliativmedizin								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	219	*	*	*	2
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern)	*	*	*	1	*	*	*	0
N Roboterassistierte Eingriffe								
N.1 Roboterassistierte Eingriffe								
N.1.1.F Roboterchirurgie bei urologischen Index–Eingriffen	*	*	*	547	*	*	*	151
Y COVID–19								
Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion								
Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19	10.5%	23.3%	*	4'155	18.8%	24.7%	*	4'641
Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labordiagnostischer Virusnachweis	24.8%	13.5%	*	1'032	20.0%	20.1%	*	927
Y.2 COVID–19 – Überblick								
Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität	2.2%	4.3%	0.5	46	*	*	*	3
Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung	0.1%	0.2%	*	46	*	*	*	3
Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Mortalität	9.6%	9.4%	1.0	1'191	5.6%	5.6%	1.0	927
Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis	2.4%	2.9%	*	1'191	3.7%	5.0%	*	927
Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	23	0.0%	0.3%	0.0	38
Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	165	1.0%	0.6%	1.8	96
Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität	3.6%	3.1%	1.2	388	3.7%	3.4%	1.1	161
Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität	13.9%	13.5%	1.0	467	6.8%	6.3%	1.1	428
Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität	23.6%	24.3%	1.0	148	7.8%	9.1%	0.9	204
Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität	10.6%	11.4%	0.9	951	13.5%	10.5%	1.3	259
Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen	79.8%	73.1%	*	951	27.9%	32.0%	*	259
Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität	13.2%	12.9%	1.0	768	7.1%	6.9%	1.0	663
Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen	64.5%	68.8%	*	768	71.5%	70.6%	*	663

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
Y COVID–19								
Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung								
Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	20.7%	22.1%	0.9	213	17.0%	16.2%	1.1	100
Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung	17.9%	14.4%	*	213	10.8%	9.7%	*	100
Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden)	277.5	*	*	213	170.8	*	*	100
Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	7.2%	7.4%	1.0	978	4.2%	4.4%	1.0	827
Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität	24.4%	27.4%	0.9	160	26.9%	25.4%	1.1	52
Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19	277.9	*	*	160	224.8	*	*	52
Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität	7.3%	7.4%	1.0	1'031	4.3%	4.6%	0.9	875
Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz								
Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	39.5%	23.7%	1.7	43	20.0%	13.6%	1.5	10
Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	40.0%	44.1%	0.9	15	*	*	*	5
Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität	33.3%	35.3%	0.9	12	*	*	*	4
Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität	35.3%	37.8%	0.9	17	*	*	*	1
Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität	45.5%	17.4%	2.6	11	*	*	*	4
Y.5 COVID–19 – Komplikationen								
Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität	25.9%	24.8%	1.0	116	52.4%	30.3%	1.7	21
Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND)	9.7%	10.1%	*	116	2.3%	2.2%	*	21
Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND)	5.8%	7.8%	*	69	3.9%	4.5%	*	36
Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität	3.9%	3.4%	1.1	233	1.8%	2.7%	0.7	655
Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis	*	*	*	2	2.1%	1.8%	*	14
Y.5.5.M Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI, Mortalität	17.5%	20.4%	0.9	189	17.5%	15.1%	1.2	80
Y.5.5.P Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI	19.9%	21.5%	*	189	30.9%	27.5%	*	80
Y.5.6.M Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19	13.9%	11.5%	1.2	1'520	13.6%	12.5%	1.1	206
Y.5.6.P Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19, Mortalität	24.9%	23.6%	*	1'520	21.1%	22.5%	*	206
Y.6 Post–COVID–19 – Überblick								
Y.6.1.M Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9), Mortalität	7.4%	4.0%	1.9	27	0.0%	2.7%	0.0	18
Y.6.1.P Anteil Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9)	0.1%	0.1%	*	27	0.1%	0.3%	*	18
Y.6.2.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.3.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter >21, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
Y.6.4.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.5.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter >21, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
Y.6.6.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9), Mortalität	3.4%	2.6%	1.3	59	3.5%	2.8%	1.3	57
Y.6.6.P Anteil Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9)	0.1%	0.3%	*	59	0.2%	0.8%	*	57
Y.6.7.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese ohne akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	3.5%	2.4%	1.4	57	2.0%	2.5%	0.8	49
Y.6.8.M Fälle ohne COVID–19 in Eigenanamnese, akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	1.9%	1.9%	1.0	120'949	1.7%	1.8%	0.9	23'749
Y.7 COVID–19 – Impfreaktionen								
Y.7.1.M Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	24	*	*	*	6
Y.7.1.P Anteil Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen	0.1%	0.1%	*	24	*	*	*	6

Krankheitsgruppe	2017–2021			2022		
Z Zusatzinformationen						
Z.1 Aufenthaltsdauer	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl		
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.1	4'811	4.1	940		
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.5	1'353	6.6	346		
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.3	1'308	3.6	314		
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.8	2'016	2.8	429		
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.8	172	6.3	34		
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	4.1	559	3.6	133		
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.8	667	4.2	125		
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.3	446	5.5	155		
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.7	439	6.2	219		
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	*	1	*	0		
Z.2 Verlegungsraten	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	30.8%	26.7%	1'424	25.8%	25.5%	235
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	9.4%	6.0%	207	10.8%	6.6%	51
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	33.3%	20.6%	1'389	28.0%	17.6%	224
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	12.5%	6.7%	303	11.5%	6.4%	37
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	3	*	*	1
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	5	*	*	3
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	9	*	*	3
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	16.0%	18.5%	229	17.3%	20.7%	61
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	12.5%	14.9%	161	14.8%	16.8%	49
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	8.5%	5.6%	159	11.6%	6.2%	43
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	4.8%	3.8%	37	14.7%	5.6%	23
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	7.1%	2.3%	62	8.5%	2.6%	17
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	6.8%	2.4%	12	0.0%	1.7%	0
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	9.5%	4.8%	38	*	*	6
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	4.0%	0.5%	18	*	*	3
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	25.6%	19.4%	260	27.9%	21.2%	50
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	24.3%	12.3%	154	31.0%	13.5%	45
Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)		Fallzahl		Fallzahl		
Z.4.1.F Dermatologische Onkologie		33		1		
Z.4.2.F Cochlea Implantate (IVHSM)		0		0		
Z.4.3.F Schild- und Nebenschilddrüsenchirurgie		700		193		
Z.4.4.F Spezialisierte Neurochirurgie		16		5		
Z.4.5.F Behandlungen von vaskulären Erkrankungen des ZNS ohne die komplexen vaskulären Anomalien (IVHSM)		4		1		
Z.4.6.F Behandlungen von komplexen vaskulären Anomalien des ZNS (IVHSM)		0		0		
Z.4.7.F Stereotaktische funktionelle Neurochirurgie (IVHSM)		0		0		
Z.4.8.F Epilepsiechirurgie (IVHSM)		0		0		
Z.4.9.F Primäre und sekundäre intramedulläre Raumforderungen (IVHSM)		0		0		
Z.4.10.F Zerebrovaskuläre Störungen im Stroke Center (IVHSM)		0		0		

Krankheitsgruppe	2017–2021	2022
Z Zusatzinformationen		
Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl	Fallzahl
Z.4.11.F Epileptologie: Komplex–Diagnostik	1	0
Z.4.12.F Epileptologie: Komplex–Behandlung	0	0
Z.4.13.F Grosse Pankreaseingriffe (IVHSM)	248	52
Z.4.14.F Grosse Lebereingriffe (IVHSM)	140	24
Z.4.15.F Oesophaguschirurgie (IVHSM)	95	13
Z.4.16.F Spezialisierte Bariatrische Chirurgie (IVHSM)	10	3
Z.4.17.F Tiefe Rektumeingriffe (IVHSM)	118	31
Z.4.18.F Hoch–aggressive Lymphome und akute Leukämien mit kurativer Chemotherapie	2	0
Z.4.19.F Autologe Blutstammzelltransplantation	59	15
Z.4.20.F Allogene Blutstammzelltransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.21.F Gefässchirurgie periphere Gefässe (arteriell)	439	82
Z.4.22.F Interventionen und Gefässchirurgie intraabdominale Gefässe	534	156
Z.4.23.F Gefässchirurgie Carotis	199	39
Z.4.24.F Interventionen Carotis und extrakranielle Gefässe	62	16
Z.4.25.F Koronarchirurgie (CABG)	1'399	375
Z.4.26.F Komplexe kongenitale Herzchirurgie	0	0
Z.4.27.F Interventionelle Kardiologie (Spezialeingriffe)	1'434	264
Z.4.28.F Radikale Prostatektomie	340	82
Z.4.29.F Radikale Zystektomie	81	29
Z.4.30.F Komplexe Chirurgie der Niere (Tumornephrektomie und Nierenteilsektion)	177	32
Z.4.31.F Maligne Neoplasien des Atmungssystems (kurative Resektion durch Lobektomie / Pneumonektomie)	280	63
Z.4.32.F Herztransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.33.F Lungentransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.34.F Lebertransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.35.F Pankreastransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.36.F Nierentransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.37.F Erstprothese Hüfte	526	185
Z.4.38.F Erstprothese Knie	440	247
Z.4.39.F Spezialisierte Wirbelsäulen Chirurgie	48	3
Z.4.40.F Knochentumore	0	0
Z.4.41.F Plexuschirurgie	3	0
Z.4.42.F Gynäkologische Tumore	222	65
Z.4.43.F Anerkanntes zertifiziertes Brustzentrum	576	93
Z.4.44.F Geburtshilfe (ab GA 32 0/7 SSW und GG 1250g)	62	16
Z.4.45.F Ausgedehnte Verbrennungen (IVHSM)	10	3