

Indikationen und Arzneimittel nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a
(Stand 1. April 2020)**Allgemeine Bemerkungen:**

- Abgabe ohne Rezept /vorgängige ärztliche Konsultation unter Berücksichtigung der Angaben der Arzneimittel-Fachinformation (FI), insbesondere der Alterslimite und weiterer Einschränkungen (siehe Spalte «Zusätzliche Bemerkungen»).
- Für Kombinationspräparate gelten die Einschränkungen der einzelnen Wirkstoffe.
- Packungsgrösse beschränkt auf die Therapiedauer gemäss Tabelle oder Angaben der Arzneimittel-Fachinformation.
- Abgabe bei Frauen während der Schwangerschaft und Stillzeit ausgeschlossen.
- Präparate, die mit (*) gekennzeichnet sind, befinden sich auch auf der Liste nach Artikel 45 Abs. 3 VAM.

1. Saisonale allergische Rhinitis

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen	
Cetirizin-dihydrochlorid	Tabletten Tropfen	Oral	10 mg 10 mg/ml	1 Monat	Kinder über 6 Jahre	
Levocetirizin-dihydrochlorid	Tabletten Tropfen	Oral	5 mg 5 mg/ml			
Loratadin	Tabletten	Oral	10 mg			
Desloratadin	Tabletten Lösung	Oral	5 mg 0.5 mg/ml			
Bilastin	Tabletten	Oral	20 mg			
Fexofenadin-hydrochlorid	Tabletten	Oral	120 mg			
Azelastin-hydrochlorid	Nasenspray	Lokal	0.14 mg/ Sprühstoss			
Ketotifen	Tabletten	Oral	1 mg			
*Mometason-Furoat	Nasenspray	Lokal	50 µg/ Sprühstoss			Nur an Erwachsene
Fluticason-Furoat	Nasenspray	Lokal	27.5 µg/ Sprühstoss			
*Triamcinolon-acetonid	Nasenspray	Lokal	55 µg/ Sprühstoss	Gemäss FI		

2. Augen-Erkrankungen

a. Saisonale allergische Konjunktivitis

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Azelastinhydrochlorid	Augentropfen	Lokal	0.5 mg/ml	1 Monat	Kinder über 6 Jahre
Epinastinhydrochlorid	Augentropfen	Lokal	0.5 mg/ml		
Ketotifen	Augentropfen	Lokal	0.25 mg/ml		
Olopatadin	Augentropfen	Lokal	1 mg/ml		

b. Bakterielle Konjunktivitis

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
* Hexamidin diisethionat	Augentropfen	Lokal	1 mg/ml	Gemäss FI	

c. Trockene Augen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Hyaluronsäure	Augengel	Lokal	0.092 mg/0.65 ml	Gemäss FI	

3. Akute Atemwegserkrankungen

a. Rhinitis

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Pseudoephedrinhydrochlorid	Retard-Kapseln	Oral	120 mg	Gemäss FI	

b. Bronchospasmen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Salbutamol	Dosieraerosol	Lokal	100 µg/ Sprühstoss	2 Wochen	Kinder über 6 Jahre Die Abgabe muss die aktuellen Guidelines zur Behandlung von Asthma und COPD befolgen
Terbutalin sulfat	Inhalationspulver	Lokal	500 µg/ Sprühstoss		

c. Andere

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Oxychinolin Kaliumsulfat Cineol Terpinhydrat	Suppositorien	Lokal	5 mg 80 mg 15 mg	Gemäss FI	

d. Husten

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Dihydrocodein thiocyanat	Tropfen	Oral	10 mg/ml	Gemäss FI	
*Codeinphosphat hemihydrat Diphenhydraminhydrochlorid	Sirup	Oral	5.7 mg/5 ml 14 mg/5 ml		
*Codeinphosphat hemihydrat Guaifenesin	Tropfen	Oral	10 mg/ml 100 mg/ml		
*Codeinphosphat Noscapin Methylephedrinhydrochlorid Codeinphosphat Noscapin Diphenhydraminhydrochlorid	Tag-Kapseln Nacht-Kapseln	Oral	20 mg 30 mg 30 mg 20 mg 30 mg 50 mg		
*Dihydrocodein-thiocyanat Belladonna-Tinktur Sonnentau-Extrakt Guaifenesin	Tropfen	Oral	10 mg/ml 10 mg/ml 10 mg/ml 92.5 mg/ml		
*Dextromethorphan	Sirup	Oral	12.5 mg/5 ml		
*Oxomemazin	Sirup	Oral	1.65 mg/5 ml		
*Pholcodin Tolubalsam	Sirup	Oral	6 mg/10 ml 7.3 mg/10 ml		

4. Magendarm-Erkrankungen

a. Übelkeit, Erbrechen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Domperidon	Suspension	Oral	1 mg/ml	Max. 1 Woche	Kinder über 6 Jahre
*Domperidon	Schmelztabletten	Oral	10 mg	Gemäss FI	

b. Refluxsymptome

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Esomeprazol	Granulat zur oralen Suspension Kapseln Tabletten	Oral	20 mg	Max. 2 Wochen	Nur an Erwachsene
Lansoprazol	Kapseln	Oral	15 mg		
Omeprazol	Kapseln Tabletten	Oral	10 mg 20 mg		
Pantoprazol	Tabletten	Oral	20 mg		
Rabeprazol natrium	Tabletten	Oral	10 mg		

c. Funktionelle Darmbeschwerden

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Mebeverin hydrochlorid	Retard-Kapseln	Oral	200 mg	Max. 2 Wochen	Nur an Erwachsene

d. Durchfall

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Loperamid hydrochlorid	Sirup	Oral	0.2 mg/ml	Therapiedauer gemäss Entscheid des Apothekers/der Apothekerin	Kinder über 6 Jahre

e. Obstipation

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Macrogol 3350 Natriumhydrogen carbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid	Pulver, oder Trinklösung	Oral	13.125 g 178.6 mg 350.8 mg 50.2 mg	Therapiedauer gemäss Entscheid des Apothekers/der Apothekerin	Nur an Erwachsene
Macrogol 3350 Natriumhydrogen carbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid	Pulver	Oral	13.125 g 178.5 mg 350.7 mg 46.6 mg		
Macrogol 3350 Natriumhydrogen carbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid	Pulver	Oral	6.563 g 89.3 mg 175.4 mg 23.3 mg		Kinder über 6 Jahre
Macrogol 3350 Natriumhydrogen carbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid	Pulver	Oral	6.563 g 89.3 mg 175.4 mg 25.1 mg		
Phenolphthalein Agar Paraffin	Emulsion	Oral	65 mg/5 ml 15 mg/5 ml 2 g/5 ml		
Natriumpicosulfat	Tropfen	Oral	7.5 mg/ml		

f. Akute Behandlung von Hämorrhoiden

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Policresulen Cinchocainhydrochlorid	Salbe	Lokal	50 mg/g 10 mg/g	Max. 1 Woche	Nur an Erwachsene
Policresulen Cinchocainhydrochlorid	Suppositorien	Lokal	100 mg 2.5 mg	Max. 1 Woche	
Calciumdobesilat Lidocainhydrochlorid Dexamethasonacetat	Salbe	Lokal	40 mg/g 20 mg/g 0,25 mg/g	Max. 3 Tage	

g. Übergewicht

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Orlistat	Kapseln	Oral	120 mg	12 Wochen	Nur an Erwachsene

5. Dermatosen

a. Bakterielle Hautinfektionen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Silbersulfadiazin Natriumhyaluronat	Creme	Lokal	10 mg/g 2mg/g		

b. Virale Hautinfektionen

1. Herpes

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Aciclovir	Creme	Lokal	50 mg/g		

2. Warzen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Tretinoin Harnstoff Dexpanthenol	Creme	Lokal	0.3 mg/g 120 mg/g 10 mg/g		
Monochloressigsäure	Lösung		500 mg/g		

c. Parasitärer Befall - Skabies

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Permethrin	Creme	Lokal	50 mg/g		
*Crotamiton	Creme Lotion	Lokal	100 mg/g		Gemäss FI

d. Akne vulgaris

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Tretinoin	Creme Lotion	lokal	0.5 mg/g	Therapiedauer gemäss Entscheid des Apothekers/ der Apothekerin	Eine Bestätigung, dass keine Schwangerschaft besteht sowie Information zum Risiko bei einer Schwangerschaft sind zu dokumentieren
Isotretinoin	Gel		0.5 mg/g		
Adapalen	Gel Creme		1 mg/g		

e. Rosacea

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Ivermectin	Creme	Lokal	10 mg/g		

f. Dermatomykosen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Nystatin Zinkoxid	Paste	Lokal	100'000 U.I./g 200 mg/g	Therapiedauer gemäss Entscheid des Apothekers/der Apothekerin	Jugendliche ab 12 Jahre
Miconazolnitrat	Shampoo		20 mg/g		
Ketoconazol	Creme Shampoo		20 mg/g		
Isoconazol nitrat	Creme		10 mg/g		
Ciclopirox olamin	Shampoo Lösung Creme		15 mg/g 10 mg/ml 10 mg/g		

g. Mykosen und bakterielle Infektionen der Haut, entzündliche Dermatomykosen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Clotrimazol Hexamidin-diisethionat	Creme	Lokal	10 mg/g	Max. 2 Wochen	
Clomitrazol Hexamidin-diisethionat Prednisolonacetat	Creme		2.5 mg/g		
			10 mg/g 2.5 mg/g 5 mg/g		

h. Nagelmykosen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Amorolfin	Nagellack	Lokal	50 mg/ml	Therapiedauer gemäss Entscheid des Apothekers/der Apothekerin	
Ciclopirox	Nagellack		80 mg/g		

i. Dermatitis und Ekzeme nicht infizierte

Bemerkungen

- Periokuläre, axilläre und perigenitale Anwendungen sind aufgrund der Nebenwirkungen (Hautatrophie) ausgeschlossen.
- Nur die kleinste Verpackung darf abgegeben werden.

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Prednisolonacetat	Salbe	Lokal	2.5 mg/g	Max. 3 Wochen 1 Mal täglich	
Hydrocortison-acetas	Creme Fettcreme		25 mg/g		
Clobetason-17-Butyrat	Creme Salbe		0.5 mg/g		
Hydrocortison-17-butytrat	Scalp Lotion Lipocreme Crelo Emulsion Creme		1 mg/ml 1 mg/g 1 mg/g 1 mg/g		
Flumetason-21-pivalat	Creme Salbe		0.2 mg/g		
Desonid	Creme		1 mg/g		
Triamcinolon-acetonid Salicylsäure	Tinktur		2 mg/g 20 mg/g		Anwendung am Ohr ausgeschlossen

j. Urtikaria und Erythem

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Cetirizin-dihydrochlorid	Tabletten Tropfen	Oral	10 mg 10 mg/ml	1 Monat	Kinder über 6 Jahre
Levocetirizin-dihydrochlorid	Tabletten Tropfen	Oral	5 mg 5 mg/ml		
Loratadin	Tabletten	Oral	10 mg		
Desloratadin	Tabletten Lösung	Oral	5 mg 0.5 mg/ml		
Bilastin	Tabletten	Oral	20 mg		
Fexofenadinhydrochlorid	Tabletten	Oral	120 mg		
Ketotifen	Tabletten	Oral	1 mg		

k. Androgenetische Alopezie

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Finasterid	Tabletten	Oral	1 mg	Therapiedauer gemäss Entscheid des Apothekers/der Apothekerin	Aktiver Hinweis auf Nebenwirkungen bei jeder Abgabe

l. Topische Anästhesie

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Lidocain Prilocain	Creme Patch	Lokal	25 mg/g bzw /Patch		Abgabe nur Kleinste Verpackung

6. Urogenitale-Erkrankungen

a. Vaginale Mykosen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
Ciclopirox olamin	Vaginalcreme	Lokal	10 mg/g	Keine wiederholte Abgabe innerhalb eines Quartals.	Abgabe nur bei dem der Patientin bekannten Beschwerdebild. Nicht während Schwangerschaft und Stillzeit. Nicht bei Kindern vor der Menarche.
	Ovula		100 mg		
Econazolnitrat	Vaginalovula		50 mg		
	Vaginalovula		150 mg		
	Vaginalcreme		10 mg/g		
	Vaginalcreme + Ovula		10 mg/g 150 mg		
Povidon-Iod	Vaginal-Ovula		200 mg		

b. Wiederherstellung der physiologischen Vaginalflora

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Packungsgrösse	Zusätzliche Bemerkungen
Lactobacillus acidophilus Estriol	Vaginaltabletten	Lokal	10 Mio 0.03 mg	6 Tabletten	Aktiver Hinweis auf Kontraindikationen bei jeder Abgabe

c. Behandlung und Prophylaxe von Infekten durch Blasenkatheter

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Packungsgrösse	Zusätzliche Bemerkungen
*Chlorhexidinacetat	Lösung	Lokal	0.020g/100ml		Gemäss FI

d. Erektile Dysfunktion

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Packungsgrösse	Zusätzliche Bemerkungen
Sildenafil	Tabletten Schmelztabletten	Oral	25 mg	4 Tabletten	Aktiver Hinweis auf Kontraindikationen bei jeder Abgabe

7. Vitamin- und Mineralienmangel

Kaliummangel

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Kaliumchlorid	Dragee Retard	Oral	745.5 mg (10 mmol Kalium)	Gemäss FI	
	Retard Tabletten		600 mg (8 mmol Kalium)		
*Kaliumcitrat *Kalium-Hydrogenkarbonat	Brausetabl.	Oral	1700 mg 1440 mg (30 mmol Kalium)	Gemäss FI	

8. Einschlafstörungen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Doxylamin-succinat	Tropfen	Oral	10 mg/ml	Gemäss FI	

9. Hypotone Kreislaufregulationsstörungen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Etilefrin-hydrochlorid	Lösung	Oral	7.5 mg/g	Gemäss FI	

10. Reisekrankheit und Gleichgewichtsstörungen

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Cinnarizin	Tabletten Tropfen	Oral	25 mg 75 mg/g	Gemäss FI	

11. Notfallkontrazeption

Wirkstoff	Darreichungsform	Applikationsweg	Wirkstoffmenge pro Einheit	Therapiedauer	Zusätzliche Bemerkungen
*Levonorgestrel	Tabletten	Oral	1.5 mg	Gemäss FI	