



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Ausgabe vom 20. Januar 2025

BAG-Bulletin

Woche

4/2025

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

Vorgehen nach Kontakt mit einem Fall einer invasiven Meningokokken-
Erkrankung (IME): Zusammenfassung der Empfehlungen, S. 10

Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

LAYOUT UND DRUCK

Cavelti AG
Wilerstrasse 73
CH-9201 Gossau
Telefon 071 388 81 81

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 50 00
Fax 058 465 50 58
verkauf.abo@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:
www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella-Statistik	7
Wöchentliche Übersicht zu respiratorischen Viren	7
Vorgehen nach Kontakt mit einem Fall einer invasiven Meningokokken-Erkrankung (IME): Zusammenfassung der Empfehlungen	10
Vorgehen nach Kontakt mit einem Fall einer invasiven Meningokokken-Erkrankung (IME): Indikationen für eine postexpositionelle Chemoprophylaxe und Impfung	12
Rezeptsperrung	19

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 2. Woche (13.01.2025)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.

^c Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen

^d Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.

^e Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie.

Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 2. Woche (13.01.2025)^a

	Woche 2			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	5 2.9	6 3.5	5 2.9	16 2.3	29 4.2	20 2.9	151 1.7	143 1.6	134 1.5	11 3.2	18 5.2	10 2.9
Influenzavirus- Infektion, saisonale Typen und Subtypen	https://idd.bag.admin.ch											
Legionellose	11 6.4	7 4	15 8.7	26 3.8	38 5.5	63 9.1	584 6.5	616 6.8	696 7.7	18 5.2	14 4	39 11.3
Masern	5 2.9			6 0.9			104 1.2	42 0.5	1 0.01	5 1.4		
Meningokokken: invasive Erkrankung		1 0.6		2 0.3	2 0.3	3 0.4	35 0.4	34 0.4	18 0.2	2 0.6	2 0.6	1 0.3
Pneumokokken: invasive Erkrankung	31 17.9	50 28.9	31 17.9	129 18.6	144 20.8	194 28	1048 11.6	889 9.9	865 9.6	77 22.2	92 26.6	126 36.4
Röteln^b												
Röteln, materno-foetal^c												
Tuberkulose	4 2.3	4 2.3	4 2.3	17 2.4	29 4.2	21 3	417 4.6	419 4.6	355 3.9	6 1.7	12 3.5	10 2.9
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	https://idd.bag.admin.ch											
Enterohämorrhagische E. coli-Infektion	https://idd.bag.admin.ch											
Hepatitis A	https://idd.bag.admin.ch											
Hepatitis E	https://idd.bag.admin.ch											
Listeriose	2 1.2		1 0.6	7 1	2 0.3	3 0.4	52 0.6	73 0.8	77 0.9	3 0.9	1 0.3	2 0.6
Salmonellose, S. typhi/paratyphi					1 0.1	2 0.3	42 0.5	18 0.2	12 0.1			1 0.3
Salmonellose, übrige	https://idd.bag.admin.ch											
Shigellose	https://idd.bag.admin.ch											


	Woche 2			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids	1 0.6		1 0.6	8 1.2	3 0.4	1 0.1	49 0.5	41 0.5	42 0.5	3 0.9	2 0.6	1 0.3
Chlamydiose	132 76.2	249 143.8	254 146.7	635 91.7	860 124.2	810 117	12739 141.5	12642 140.4	13164 146.2	213 61.5	381 110	447 129.1
Gonorrhoe	82 47.4	122 70.5	84 48.5	384 55.4	451 65.1	341 49.2	6834 75.9	6152 68.3	5254 58.4	151 43.6	232 67	183 52.8
Hepatitis B, akut		1 0.6	1 0.6		3 0.4	2 0.3	14 0.2	18 0.2	14 0.2		2 0.6	1 0.3
Hepatitis B, total Meldungen	6	21	24	42	74	84	1213	1135	1113	14	43	40
Hepatitis C, akut					3 0.4		19 0.2	17 0.2	11 0.1		3 0.9	
Hepatitis C, total Meldungen	12	15	18	58	83	71	1068	1054	1040	22	41	32
HIV-Infektion		10 5.8	6 3.5	11 1.6	31 4.5	34 4.9	319 3.5	358 4	348 3.9		23 6.6	14 4
Syphilis, Frühstadien ^d	5 2.9	14 8.1	13 7.5	21 3	58 8.4	62 9	759 8.4	783 8.7	833 9.2	5 1.4	21 6.1	38 11
Syphilis, total	7 4	18 10.4	15 8.7	26 3.8	78 11.3	77 11.1	1016 11.3	1091 12.1	1086 12.1	7 2	27 7.8	43 12.4
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose						1 0.1	4 0.04	7 0.08	6 0.07			
Chikungunya-Fieber					2 0.3		20 0.2	32 0.4	5 0.06		1 0.3	
Dengue-Fieber		10 5.8	9 5.2	7 1	39 5.6	13 1.9	409 4.5	310 3.4	118 1.3	1 0.3	19 5.5	10 2.9
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion												
Malaria	1 0.6	8 4.6	6 3.5	14 2	21 3	23 3.3	297 3.3	345 3.8	319 3.5	2 0.6	13 3.8	15 4.3
Q-Fieber		5 2.9	2 1.2	10 1.4	8 1.2	6 0.9	152 1.7	133 1.5	90 1	1 0.3	6 1.7	2 0.6
Trichinellose								1 0.01	4 0.04			
Tularämie							https://idd.bag.admin.ch					
West-Nil-Fieber							1 0.01	1 0.01				
Zeckenzephalitis							https://idd.bag.admin.ch					
Zika-Virus-Infektion		1 0.6			2 0.3		8 0.09	6 0.07			2 0.6	
Andere Meldungen												
Mpox		1 0.6		3 0.4	1 0.1		35 0.4	14 0.2	551 6.1	2 0.6	1 0.3	
Botulismus								1 0.01	1 0.01			
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		1 0.6			1 0.1		15 0.2	29 0.3	21 0.2		1 0.3	
Diphtherie ^e			1 0.6			7 1	5 0.06	25 0.3	97 1.1			3 0.9
Tetanus												



READY!

FÜR ZU MIR.

Dazu gehört dein Safer-Sex-Check:



Sentinella-Statistik

Provisorische Daten

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 12.1.2025 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
 Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	51		52		1		2		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertussis	3	0.2	1	0.3	0	0	1	0.1	1.3	0.2
Zeckenstiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herpes Zoster	12	0.9	5	1.3	6	1.7	9	0.8	8	1.2
Post-Zoster-Neuralgie	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.3	0
Meldende Ärzte	162		106		95		153		129	

Lyme Borreliose: <https://idd.bag.admin.ch>

Wöchentliche Übersicht zu respiratorischen Viren

Das BAG-Infoportal übertragbare Krankheiten informiert regelmässig über Infektions- und Erkrankungsfälle in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, die durch verschiedene respiratorische Erreger ausgelöst werden.

<https://idd.bag.admin.ch/>

Die Aktualisierung der Daten erfolgt jeweils am Mittwoch um 12.00 Uhr.



Organspende?

- entscheiden
- mitteilen
- festhalten

leben-ist-
teilen.ch

Machs
dir zuliebe.



Bestimme selbst, was mit deinem Körper passiert, im Leben und darüber hinaus.
Halte deshalb deinen Willen zur Organspende fest und informiere auch deine Liebsten darüber.



«Mehr Informationen haben, heisst besser helfen können.»

Das EPD wirkt.



EPD
elektronisches
Patientendossier



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eine Partnerkampagne des
Bundesamtes für Gesundheit BAG
und der Kantone.

Jeremy de Mooij,
Verantwortlicher Apotheker FPH,
pharmacieplus dr. c. repond Bulle,
Vizepräsident CLPh,
Präsident FApG



Schliessen Sie sich jetzt dem
elektronischen Patientendossier an:
patientendossier.ch

Vorgehen nach Kontakt mit einem Fall einer invasiven Meningokokken-Erkrankung (IME): Zusammenfassung der Empfehlungen

Der vollständige Empfehlungstext ist im Anschluss publiziert. Diese Publikation wird in Deutsch, Französisch und Italienisch auf der BAG-Webseite unter [Meningokokken-Erkrankungen \(admin.ch\)](#) publiziert.

Dieses Dokument entspricht der Publikation von Mai 2022 und wurde an spezifischen Stellen an die neuen Impfempfehlungen 2024 angepasst. Dies betrifft insbesondere die Impfschemata auf Seite 1 sowie Abbildung 1 und den Text in Kapitel II.3

POSTEXPOSITIONS-CHEMOPROPHYLAXE (PEP)

- Personen mit engem Kontakt zu einer Person mit invasiver Meningokokken-Erkrankung (IME) im Zeitraum zwischen 7 Tagen vor Krankheitsausbruch und 24 Stunden nach Therapiebeginn qualifizieren unabhängig von ihrem Meningokokken-Impfstatus für eine PEP (Infobox: Definition enge Kontakte). Dies gilt sowohl für IME-Einzelfällen wie auch für IME-Häufungen und -Ausbrüche.
- Reine räumliche Nähe zu einem IME-Fall (z. B. im Flugzeug, Zug, Auto, Zimmer) gilt nicht als enger Kontakt und ist per se keine Indikation für eine PEP. Dies gilt auch für diejenigen Personen, die in die medizinische Erstversorgung des Indexfalles involviert waren (sofern kein ungeschützter Kontakt mit Körpersekreten stattgefunden hat).
- In Kinderkrippen, anderen vorschulischen Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten soll aufgrund der erschwerten Differenzierung enger Kontakte die ganze Betreuungsgruppe als enger Kontakt definiert werden.
- Bei Einzelfällen in Schulen ist keine PEP indiziert, es sei denn, die Kriterien eines engen Kontaktes gemäss Infobox sind erfüllt. Ist die Differenzierung enger Kontaktpersonen auch hier erschwert, so können die Gesundheitsbehörden im Individualfall die gesamte Schulklasse als engen Kontakt definieren.
- Ciprofloxacin, Ceftriaxon und Rifampicin sind grundsätzlich geeignet für eine PEP, die Empfehlung variiert je nach Zielgruppe (Abb. 3).
- Falls die initiale Behandlung nicht mit einem Cephalosporin der dritten Generation erfolgt ist, sollten behandelte IME-Patienten/IME-Patientinnen vor Entlassung aus dem Spital ebenfalls eine PEP erhalten (Penicillin führt nicht zu einer Eradikation der Meningokokken aus dem Nasen-Rachen-Raum).

IMPfung

- Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person sollten möglichst früh (auch ohne Vorliegen der Serogruppentypisierung) idealerweise gleichzeitig mit der PEP mit einem Konjugatimpfstoff gegen die Serogruppen A, C, W, Y (MCV-ACWY) geimpft werden, sofern keine MCV-ACWY-Impfung in den letzten 12 Monaten verabreicht wurde. Ist der Indexpatient/die Indexpatientin an einer durch Serogruppe B ausgelösten IME erkrankt, so entfällt die Impfempfehlung mit MCV-ACWY.
 - **Impfschema MCV-ACWY:**
 - Alter 2–6 Monate: Insgesamt 4 Dosen: 3 Dosen im Abstand von jeweils mindestens 2 Monaten, 4. Dosis im Alter von 12 bis 16 Monaten minimal 6 Monate nach 3. Dosis
 - Alter 7–11 Monate: 2 Dosen im Abstand von mind. 2 Monaten (2. Dosis idealerweise ab dem Alter von ≥ 12 Monaten)
 - Alter ≥ 12 Monate: 1 bzw. 2 Dosen gemäss Zulassung des verwendeten Impfstoffes
- Bei IME-Ausbrüchen oder Häufungen durch Serogruppe B soll eine erweiterte postexpositionelle Impfempfehlung mit 4CMenB (Bexsero®) durch die zuständigen Gesundheitsbehörden evaluiert werden.
 - **Impfschema 4CMenB (Bexsero®) (off label > 24 Jahre):**
 - Alter 2–11 Monate: Insgesamt 3 Dosen: 2 Dosen im Abstand von 2 Monaten im ersten Lebensjahr, 3. Dosis im zweiten Lebensjahr minimal 6 Monate nach 2. Dosis
 - Prophylaktische Gabe von Paracetamol (20 mg/kg) unmittelbar nach der Impfung sowie 6 und 12 Stunden danach empfohlen
 - Alter 12–23 Monate: Insgesamt 3 Dosen: 1. und 2. Dosis im Abstand von 2 Monaten, 3. Dosis 12 Monate nach 2. Dosis

- Alter ≥ 24 Monate: 2 Dosen im Abstand von 2 Monaten (minimal 1 Monat)
- Nicht geimpfte IME-Patienten/IME-Patientinnen sollten nach Genesung sowohl mit MCV-ACWY als auch mit 4CMenB (Bexsero®) geimpft werden.

ALLGEMEIN

- Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person sollen über Frühsymptome einer IME informiert werden sowie darüber, dass bei deren Auftreten ein Arzt/eine Ärztin konsultiert werden muss. Frühsymptome können Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Petechien und Hautausschlägen sein. Auch atypische Symptome wie gastrointestinale Beschwerden können Frühsymptome einer IME sein.

Vorgehen nach Kontakt mit einem Fall einer invasiven Meningokokken-Erkrankung (IME): Indikationen für eine postexpositionelle Chemoprophylaxe und Impfung

ZIEL DES DOKUMENTES

Dieses Dokument beschreibt die aktuell in der Schweiz empfohlenen Massnahmen zur Verhinderung von Sekundärfällen nach einem sicheren, wahrscheinlichen oder möglichen Fall einer invasiven Meningokokken-Erkrankung (IME) (Fallklassifikationen siehe Abb. 2). Dabei wurden die aktuelle wissenschaftliche Evidenz sowie die Empfehlungen vergleichbarer Länder berücksichtigt. Es soll den verantwortlichen Personen im Gesundheitsbereich, insbesondere auch den Kantonsärztinnen und -ärzten, Informationen zum Vorgehen zur Verfügung stellen.

I. Allgemeine Informationen zu Besiedelung und Kontagiosität

Eine Infektion mit Meningokokken (*Neisseria meningitidis*) kann innerhalb kurzer Zeit zu einer schweren Erkrankung in Form einer IME führen. Personen mit bestimmten Erkrankungen des Immunsystems (unter anderem Asplenie oder Immundefizite wie Defekte im Komplementsystem) haben ein höheres Risiko an einer IME zu erkranken. Rauchen sowie aktuelle virale Infektionen scheinen ebenfalls zu einem erhöhten Risiko für eine IME beizutragen. Es gibt aber auch schwere Krankheitsverläufe bei gesunden Personen ohne ersichtliche Risikofaktoren. IME treten zwar selten auf (in der Schweiz über die letzten 10 Jahre durchschnittlich ca. 48 Fälle pro Jahr, Inzidenz 0,6/100 000 Einwohner), können jedoch innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich werden. Die Letalität einer IME beträgt 5–15 % [1, 2].

Neisseria meningitidis sind ausschliesslich humanpathogene Bakterien. Sie besiedeln bei einem Teil der Bevölkerung den oberen Respirationstrakt, ohne Symptome auszulösen. Eine Übertragung kann bei engem Kontakt erfolgen (Infobox). Der Anteil asymptomatischer Träger ist je nach Altersgruppe unterschiedlich. Gemäss Zahlen aus Europa und den USA liegt die Besiedelungsrate in der Bevölkerung bei 10–15 % (Range 5–30 %), und ist bei Adoleszenten und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren am höchsten [3–5]. Die Dauer einer Besiedelung ist variabel und kann von kurzdauernd (einige Monate) bis chronisch (wenige Jahre) reichen [3]. Die Besiedelung des Nasopharynx mit *N. meningitidis* oder verwandten Bakterien spielt eine Rolle beim Aufbau einer spezifischen Immunantwort [2, 6–8]. Für eine umfassende Immunität sind jedoch verschiedene Faktoren relevant. Passieren die Meningokokken die Schleimhaut, ohne dass das Immunsystem die Bakterien eliminiert, besteht das Risiko für Infektionen mit mögli-

chen schwerwiegenden Folgen wie Meningitis oder Sepsis [9]. Bei neu auftretenden IME-Fällen geht man davon aus, dass die Besiedelung erst kürzlich stattgefunden hat und noch keine spezifische Immunität aufgebaut worden ist [2].

97 % der IME-Fälle treten sporadisch auf, das heisst ohne Verbindung zu einem bekannten Fall [6]. Die Übertragung von Meningokokken erfolgt hauptsächlich durch Personen mit asymptomatischem Trägertum. Bei weniger als 3 % aller IME-Fälle handelt es sich somit um sekundäre Fälle [10]. Das höchste Erkrankungsrisiko für Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person (Definition siehe Infobox) besteht in den ersten 7 Tagen nach Erkrankung einer

Definition und Abgrenzung eines engen Kontaktes mit einer an IME erkrankten Person

(möglicher, wahrscheinlicher oder sicherer/bestätigter IME-Fall)

Enger Kontakt

- Im selben Haushalt (z. B. Familie, Wohngemeinschaft) oder in vergleichbarer Situation lebend (z. B. Internate, Wohnheime, Kasernen, Gefängnisse, Ferienlager) [6, 12, 17]
- Intensiver Kontakt mit Nasen-Rachen-Sekret, wie intensive Küsse, Reanimationsmassnahmen ohne entsprechenden Schutz (Mund-zu-Mund-Beatmung, Atemwegskontrolle/Freihalten der Atemwege, Intubation), Kontakt mit Erbrochenem [6, 11–13, 15]
- Direkte Partner bei Sportarten mit sehr engem Gesichtskontakt (z. B. Kampfsportarten) [17]
- Betreuungspersonen und Kinder derselben Betreuungsgruppe einer Kinderkrippe, vorschulischen Kinderbetreuungseinrichtung oder eines Kindergartens aufgrund erschwerter Differenzierung des engen Kontakts

Kein enger Kontakt

- Räumliche Nähe ohne oben genannte Kriterien [2, 6]
- Post-Mortem-Kontakt inkl. Einbalsamierung [6]
- Besuch der gleichen Klasse einer Grund- oder fortführenden Schule ohne Erfüllung oben genannter Kriterien für einen engen Kontakt

Person an IME, insbesondere innerhalb der ersten 48 Stunden. Danach nimmt das Risiko für sekundäre Fälle rasch ab [6, 11]. Die Inkubationszeit einer IME beträgt in der Regel 3 bis 4 Tage und kann zwischen 2 und 10 Tagen liegen [12, 13]. Die Zeitdauer der Kontagiosität wird allgemein von 7 Tagen vor Auftreten der Symptome bis 24 Stunden nach Beginn der Antibiotikatherapie festgelegt [12, 13], auch wenn nicht abschliessend bekannt ist, ob Erkrankte vor Auftreten von Symptomen ansteckend sind [13]. Die für eine Übertragung relevanten Zeitfenster einer IME sind in Abbildung 1 zusammengefasst.

II. Vorgehen bei einem einzelnen IME-Fall

1. Generelle Massnahmen

Bei Verdacht auf eine IME muss eine sofortige Spitaleinweisung erfolgen [6, 2]. Personen mit Verdacht auf eine IME müssen sofort behandelt werden, ohne auf eine Laborbestätigung zu warten [11]. Eine IME gehört zu den meldepflichtigen Krankheiten und muss bei Verdacht vom Arzt oder von der Ärztin und vom Labor innerhalb von 24 Stunden an das Kantonsarztamt beziehungsweise das BAG gemeldet werden (siehe Leitfaden zur Meldepflicht) [14]. Sowohl bei einem möglichen, einem wahrscheinlichen wie einem sicheren/bestätigten IME-Fall (siehe Abb. 2) soll mit den notwendigen Abklärungen im Umfeld sowie mit den postexpositionellen Massnahmen unverzüglich begonnen werden. Falls jedoch vor Abgabe eines Antibiotikums und/oder einer Impfung an eine Kontaktperson die Diagnose mit einem Laborresultat entweder

bestätigt oder entkräftet werden kann, wird dieses Resultat für die Planung des weiteren Vorgehens berücksichtigt. Patientinnen und Patienten müssen bis zu 24 Stunden nach Beginn einer spezifischen Therapie isoliert werden. Danach gilt die betroffene Person nicht mehr als infektiös. Während dieser 24 Stunden sind vom betreuenden Pflegepersonal und von den behandelnden Ärzten/Ärztinnen die von der jeweils zuständigen Institution vorgeschriebenen Schutzmassnahmen einzuhalten. Andere Personen, die mit (potenziell) infektiösem Material in Kontakt kommen, zum Beispiel bei spezifischen Labortätigkeiten, halten sich an die dort empfohlenen Schutzmassnahmen [15].

2. Postexpositions-Chemoprophylaxe (PEP) nach einem IME-Einzelfall

2.1 Indikationen für eine PEP

Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person sollten eine PEP erhalten.

Das Ziel einer PEP besteht darin, bei Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person (Definition gemäss Infobox) die Besiedelung des Nasen-Rachen-Raums mit Meningokokken zu eliminieren und so die weitere Übertragung und Erkrankung zu verhindern [6, 16]. Wenn keine Chemoprophylaxe erfolgt, ist das Erkrankungsrisiko bei diesen Personen gegenüber der Allgemeinbevölkerung um das 400- bis 1200-Fache erhöht [12, 13]. Die Chemoprophylaxe reduziert einerseits das Erkrankungsrisiko derjenigen Kontaktpersonen, die neu zu Trägern geworden sind, andererseits verhindert sie,

Abbildung 1
Zeitfenster für post-expositionelle Massnahmen bei IME




Abbildung 2

Fallklassifikationen IME [14]	
Sicherer/bestätigter Fall	<p>Jede Person, die mindestens eines der folgenden Laborkriterien erfüllt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolierung (kultureller Nachweis) von <i>N. meningitidis</i> oder Nachweis von <i>N. meningitidis</i> Nukleinsäure aus einer normalerweise sterilen Probe (inkl. Hautblutungen) • Nachweis von <i>N. meningitidis</i>-Antigen im Liquor • Nachweis von gramnegativ gefärbten Diplokokken im Liquor
Wahrscheinlicher Fall	<p>Jede Person, die mindestens eines der folgenden klinischen Kriterien erfüllt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningitis • Purpura (Petechien, hämorrhagisches Exanthem) • Sepsis (Septischer Schock) • Waterhouse-Friderichsen-Syndrom • Septische Arthritis <p>UND</p> <p>einen epidemiologischen Zusammenhang zu einem laborbestätigten (sicheren) Fall hat.</p>
Möglicher Fall	Jede Person mit klinischem Verdacht (siehe Kriterien oben), bevor eine Laborbestätigung eingetroffen ist

das asymptotische Träger weitere Fälle verursachen [2]. Gemäss primär retrospektiven Studien reduziert die PEP das Risiko von Sekundärfällen bei Haushaltskontakten im ersten Monat nach Exposition um bis zu 89 % (95 % CI, 42–98 %, Systematic Review 2004) [6, 18, 19]. Die *Number Needed to Treat* (NNT), das heisst die Anzahl Personen mit engen Kontakten, die eine Chemoprophylaxe bekommen müssen, um einen IME-Fall zu verhindern, wird auf 218 geschätzt (95 % CI, 121– 1135) [6, 18, 19].

Alle Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person sollten, unabhängig von ihrem Meningokokkenimpfstatus¹, eine PEP erhalten [6, 11–13, 17].

Zeitpunkt der PEP: Die PEP soll möglichst bald, idealerweise innerhalb der ersten 24 Stunden nach Diagnose beim Indexfall, erfolgen (Abb. 1). Sie soll denjenigen Personen angeboten werden, die 7 Tage vor Krankheitsausbruch und bis 24 Stunden nach Therapiebeginn engen Kontakt mit dem Indexfall hatten (Definition enger Kontakt siehe Infobox) [2, 12, 13]. Die Chemoprophylaxe ist nur indiziert, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Exposition begonnen werden kann (Abb. 1). [12, 13].

Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person sollen auch über Frühsymptome einer IME informiert werden, bei denen unbedingt ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden muss, insbesondere im Zeitfenster der ersten 10 Tage nach Kontakt (Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Petechien und Hautausschläge. Atypische Symptome wie gastrointestinale Beschwerden sind ebenfalls mögliche Frühsymptome) [12].

¹ Personen mit engem Kontakt haben trotz einer Chemoprophylaxe im Jahr nach der Exposition ein um 100-fach erhöhtes Erkrankungsrisiko gegenüber der Allgemeinbevölkerung [12].

PEP in vorschulischen Institutionen: Obschon das Risiko von Sekundärfällen in vorschulischen Institutionen (Kinderkrippen, anderen vorschulischen Betreuungseinrichtungen und Kindergärten) gemäss Daten aus England und Wales klein ist (1 : 1500 innerhalb eines Monats) [6], sind Kinder und Betreuungspersonen innerhalb der Betreuungsgruppe des Indexpatienten aufgrund der erschwerten Differenzierung des Kontaktes als enge Kontaktpersonen definiert, und folglich ist eine PEP innerhalb der Betreuungsgruppe (nicht gesamte Institution) empfohlen [11–13].

PEP in Grund- und weiterführenden Schulen: Aufgrund des niedrigen Risikos für Sekundärfälle (gemäss Daten aus England und Wales 1 : 33 000 in weiterführenden Schulen innerhalb eines Monats) [6] ist bei Einzelfällen in Schulen grundsätzlich keine PEP indiziert, es sei denn, Kontakte erfüllen die Kriterien eines engen Kontaktes (Infobox) [6, 11]. Ist die Differenzierung von Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person innerhalb der Schulklasse erschwert, so können die Gesundheitsbehörden im Individualfall die gesamte Schulklasse als engen Kontakt definieren.

Räumliche Nähe zu einer an IME erkrankten Person ist nicht per se eine Indikation für eine PEP.

Rein räumliche Nähe zu einer an IME erkrankten Person ohne die Kriterien eines engen Kontaktes (z. B. im Flugzeug, Zug, Auto, Behandlungsraum) ist keine Indikation für eine PEP, da kein erhöhtes Risiko für eine Übertragung unter diesen Bedingungen besteht. Insbesondere beim Auftreten einer IME in einem Flugzeug gibt es bisher keine Evidenz, dass eine PEP bei Personen in rein räumlicher Nähe zu einer an IME erkrankten Person grundsätzlich Sekundärfälle im Rahmen des jeweiligen Fluges verhindern könnte [10, 13]. Dies gilt auch für diejenigen Personen, die in der medizinischen Erstversorgung des Patienten/der Patientin involviert waren, vorausgesetzt, es hat kein ungeschützter Kontakt mit Körpersekreten stattgefunden

Abbildung 3

Empfohlene PEP bei engem Kontakt mit an IME erkrankten Personen (PIGS und SGGG ¹)	
Erste Wahl	
Alter < 1 Monat	Ciprofloxacin 1 Dosis p. o. (20 mg/kg)
Alter ≥ 1 Monat (Kinder und Erwachsene) ²	Ciprofloxacin 1 Dosis p. o. (20 mg/kg, max. 500 mg)
Alternativen²	
Alter < 1 Monat	Rifampicin 5 mg/kg/Dosis p. o. alle 12 Stunden für 2 Tage (total 4 Dosen)
Alter ≥ 1 Monat (Kinder und Erwachsene) ²	Rifampicin 10 mg/kg/Dosis p. o. (max. 600 mg/Dosis) alle 12 Stunden für 2 Tage (total 4 Dosen)
Alter ≤ 12 Jahre	Ceftriaxon 125 mg, 1 Dosis i. m.
Schwangere³ (und Alternative für Personen > 12 Jahre)	Ceftriaxon 250 mg, 1 Dosis i. m.

¹ für Schwangere und stillende Frauen

² ausgenommen Schwangere

³ während der Stillzeit ist die PEP mit allen aufgeführten Medikamenten möglich

[6, 12, 15]. Eine PEP ist in diesen Situationen nur für Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person gemäss Infobox indiziert (insbesondere Kontakt zu Nasen-Rachen-Sekreten, z. B. Intubation, Absaugen) [6, 12, 13].

Ausserhalb von haushaltsähnlichen Situationen soll die Entscheidung über eine PEP bei möglichen engen Kontaktpersonen unter Einbezug des zuständigen Kantonsärztlichen Dienstes sowie bei Bedarf mit einem zuständigen Spezialisten/ einer zuständigen Spezialistin (FAe Infektiologie,) besprochen werden, da die Evidenz limitiert ist und verschiedene Faktoren abgewogen werden müssen [6, 20].

Eine PEP ist je nach Primärtherapie auch beim Indexfall indiziert.

Behandelte IME-Patientinnen und -Patienten sollen vor Entlassung aus dem Spital ebenfalls eine PEP erhalten, sofern die Behandlung mit Penicillin oder mit einem anderen Antibiotikum stattgefunden hat, welches keine Wirkung auf die Meningokokken-Kolonisierung hat. Als wirksam gegen die Besiedelung und geeignet als Therapie der ersten Wahl einer IME gelten i. v. und i. m. verabreichte Cephalosporine der dritten Generation [2, 6, 11–13, 21].

2.2 Empfohlene Antibiotika für eine PEP

Ciprofloxacin, Ceftriaxon und Rifampicin sind geeignet für eine PEP, da sie in 90–95 % zu einer Eradikation von *N. meningitidis* aus dem Nasen-Rachen-Raum führen [11]. Ciprofloxacin und Ceftriaxon können in einer einmaligen Dosis verabreicht werden.

Die in der Schweiz durch die Pediatric Infectious Disease Group of Switzerland (PIGS), die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) sowie die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie (SGInf) empfohlenen Medikamente für eine PEP sind in Abbildung 3 für die jeweiligen Indikationsgruppen zusammengefasst.

3. Impfung nach Exposition bei Einzelfällen

Die Meningokokken-Impfung (Konjugatimpfstoff MCV-ACWY) bei Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person kann dazu beitragen, Sekundärfälle zu verhindern, indem sie ab ca. 10 Tagen nach Impfung die Kolonisierung weiter reduziert [22, 4]. Dies trifft nicht nur bei Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person zu, sondern führt ab einer gewissen Durchimpfungsrate auch bei der nicht geimpften Bevölkerung zu einem indirekten Schutz [3, 4, 22, 23]. Ausserdem schützt eine Impfung vor jenen Sekundärfällen, die mehr als 14 Tage nach Erkrankung des Indexfalles auftreten können [6].

Grundsätzlich wird empfohlen, enge Kontaktpersonen einer an IME erkrankten Person im Alter von > 2 Monaten mit MCV-ACWY zu impfen, falls diese nicht innerhalb der letzten 12 Monate eine solche Impfung erhalten haben [2, 6, 12, 17]. Personen mit engem Kontakt zu einer an IME erkrankten Person haben trotz PEP ein erhöhtes Risiko für eine Meningokokken-Erkrankung im Jahr nach dem Kontakt [12, 24, 25]. Dies trifft insbesondere für Familienmitglieder zu. Damit sich die Immunantwort rasch entwickeln kann, soll die Impfung möglichst früh, am besten gleichzeitig mit der PEP, erfolgen [17, 24]. Für die Impfscheidung muss das Laborresultat der Meningokokken-Serotypisierung nicht abgewartet werden. Falls die Serotypisierung bereits vorliegt, wird diese für die Impfscheidung berücksichtigt, sodass im Falle einer Erkrankung des Indexpatienten an einer Serogruppe B die Impfeempfehlung entfällt. Ebenso sollten noch nicht geimpfte IME-Patienten/IME-Patientinnen nach Genesung mit MCV-ACWY geimpft werden [6].

Aktuell sind in der Schweiz zwei quadrivalente Konjugatimpfstoffe erhältlich: Menveo® ist im Rahmen einer Postexpositionsprophylaxe sowie nach durchgemachter IME für Personen ab einem Alter von 2 Monaten zugelassen und vergütet, Menquadfi ab dem Alter von 12 Monaten (gemäss KLV, ausgenommen sind Berufs- und Reiseindikationen).

Das Impfschema ist wie folgt:

- Alter 2–6 Monate: Insgesamt 4 Impfdosen: 3 Dosen im Abstand von jeweils mindestens 2 Monaten, 4. Dosis im Alter von 12 bis 16 Monaten minimal 6 Monate nach 3. Dosis
- Alter 7–11 Monate: 2 Dosen im Abstand von mind. 2 Monaten (2. Dosis idealerweise ab dem Alter von ≥ 12 Monaten)
- Alter ≥ 12 Monate: 1 bzw. 2 Dosen gemäss Zulassung des verwendeten Impfstoffes

Die generellen Impfpfehlungen gegen invasive Meningokokken-Erkrankungen für die Allgemeinbevölkerung sowie für Risikogruppen, unabhängig von einer postexpositionellen Situation, werden in separaten Dokumenten beschrieben [1, 26].

Die postexpositionelle Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe B bei IME-Einzelfällen ist aufgrund der hohen *Number Needed to Vaccinate* (Schutz erst nach 2 Dosen) und der zeitlichen Verzögerung bis zur Erlangung einer Immunität (insbesondere bei den am meisten gefährdeten Säuglingen) bei meist innerhalb weniger Tage auftretenden Sekundärfällen nicht generell empfohlen [6]. Bei Ausbrüchen oder gehäuften Fällen von IME durch Serogruppe B kann die Impfung aber durch den zuständigen Kantonsärztlichen Dienst, insbesondere bei fortbestehendem Expositionsrisiko erwogen werden, wie dies auch in anderen Ländern praktiziert wird [6, 27].

III. Vorgehen bei IME-Häufungen oder -Ausbrüchen

1. Definitionen

Wenn sich mehrere IME-Fälle in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang zueinander ereignen, spricht man von Häufungen oder Ausbrüchen. Häufungen oder Ausbrüche können sich im Haushaltsetting, in Institutionen, insbesondere Bildungs-/Betreuungseinrichtungen, sowie in grösseren geografischen Bezirken/Regionen ereignen [2, 6, 27, 28]. Das Vorgehen in diesen Situationen erfolgt immer in enger Rücksprache mit Spezialistinnen und Spezialisten und den zuständigen kantonalen und gegebenenfalls nationalen Gesundheitsbehörden (insbesondere bei interkantonalen Ausbrüchen).

Häufungen in Institutionen oder Haushalten werden definiert als mindestens 2 laborbestätigte Fälle der gleichen Serogruppe oder wahrscheinliche Fälle innerhalb von 4 Wochen mit epidemiologischem Zusammenhang.

Ein Ausbruch in einer geografischen Region oder einem Bezirk wird definiert als mindestens 3 laborbestätigte Fälle der gleichen Serogruppe oder wahrscheinliche Fälle innerhalb von 3 Monaten, zwischen denen kein epidemiologischer Zusammenhang im Sinne eines engen Kontaktes oder einer sonstigen gemeinsamen Zugehörigkeit (Besuch der gleichen Institutionen etc.) bestanden hat [27].

Eine allfällige Genotypisierung ermöglicht die Bestätigung eines Ausbruchs. Allerdings sollte mit den Public-Health-Massnahmen sofort begonnen und nicht auf die Genotypisierungsergebnisse gewartet werden.

2. Postexpositions-Chemoprophylaxe (PEP) bei IME-Häufungen und -Ausbrüchen

Bei Häufungen in Haushaltsettings, Institutionen mit engen Sozialkontakten und Bildungs-/Betreuungseinrichtungen mit Wohncharakter entspricht die Gabe einer PEP grundsätzlich dem Vorgehen bei Einzelfällen mit dem Ziel, Einzelpersonen oder Personengruppen zu definieren, für die eine PEP indiziert ist. Es soll in Absprache mit dem Kantonsarztamt eruiert werden, ob ggf. alle Personen in der Institution eine Prophylaxe erhalten sollen. In Bildungs-/Betreuungseinrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen soll(en) beim Auftreten mehrerer Fälle die gesamte(n) betroffene(n) Gruppe(n)/Klasse(n) inklusive Betreuungspersonal/Lehrer/Lehrerinnen eine PEP erhalten. Falls innerhalb von 28 Tagen in einer Gruppe enger Kontaktpersonen, die eine PEP erhalten haben, weitere Fälle auftreten, sollte in Absprache mit dem Kantonsarztamt eine erneute Prophylaxe mit einem anderen Antibiotikum erwogen werden [6, 27].

Bei Ausbrüchen in grösseren geografischen Regionen ohne epidemiologischen Zusammenhang zwischen den Fällen erfolgt die PEP bei jedem Fall entsprechend der Gabe bei Einzelfällen.

3. Postexpositionelle Impfung bei IME-Häufungen und -Ausbrüchen

Bei einer Häufung von IME-Fällen in Haushaltsettings, Institutionen mit engen Sozialkontakten und Bildungs-/Betreuungseinrichtungen sollen alle Personen, die für eine PEP qualifizieren, zusätzlich eine Impfung erhalten.

Übersteigt im Rahmen eines Ausbruchs in einer geografischen Region die Inzidenz einen Schwellenwert von 10 Fällen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von 3 Monaten (attack rate) [27] gilt es zu erwägen, ob eine Impfung für einen erweiterten Personenkreis zum Schutz der Bevölkerung empfohlen werden soll. Hierbei ist wichtig, die Region, in der die Fälle aufgetreten sind, genau abzugrenzen, um die Inzidenz berechnen zu können [6]. Zur Berechnung der attack rate werden alle sicheren Indexfälle der gleichen Serogruppe (und falls vorhanden, der Genotyp) und alle Verdachtsfälle (ohne epidemiologischen Link zueinander) berücksichtigt. Sekundäre Fälle werden nicht gezählt, und co-primäre Fälle werden als ein Fall gezählt. Weitere Informationen zur Berechnung wurden von Cohn et al. publiziert [28]. Die Indikation für eine regionale Impfpfehlung in einer solchen Situation obliegt der zuständigen kantonalen Gesundheitsbehörde (i. d. R. Kantonsarztamt), gegebenenfalls unter Einbezug des Bundesamtes für Gesundheit (insbesondere bei interkantonalen Ausbrüchen).

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

Bibliografie

- ¹ Bundesamt für Gesundheit. Ergänzende Impfpfehlungen zum Schutz vor invasiven Meningokokken-Erkrankungen. BAG Bull 2024; 3: 8–21.
- ² ECDC Guidance. Public health management of sporadic cases of invasive meningococcal disease and their contacts. 2010; ISBN 978-92-9193-220-7. doi 10.2900/34738.
- ³ Caugant DA, Maiden MCJ. Meningococcal carriage and disease – Population biology and evolution. *Vaccine*. 2009; 27S: B64–B70.
- ⁴ Maiden MCJ, Ibarz-Pavón AB, Urwin R et al. Impact of Meningococcal Serogroup C Conjugate Vaccines on Carriage and Herd Immunity. *JID*. 2008; 197: 737–43.
- ⁵ Claus H, Maiden MCJ, Wilson DJ, et al. Genetic Analysis of Meningococci Carried by Children and Young Adults. *JID*. 2005; 191: 1263–71.
- ⁶ Public Health England. Guidance for Public Health Management of Meningococcal Disease in the UK: Updated February 2018.
- ⁷ Mandell, Douglas and Bennett's. Principles and Practice of Infectious Diseases. Band II. Eighth Edition. Elsevier Saunders. 2425 ff.
- ⁸ Pollard JA, Frasch C. Development of natural immunity to *Neisseria meningitidis*. *Vaccine* 2001; 19:1327–1346.
- ⁹ Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA. Vaccines. Sixth Edition. Elsevier Saunders. 388ff.
- ¹⁰ Rachael T, Schubert K, Hellenbrand W, et al. Risk of transmitting meningococcal infection by transient contact on aircraft and other transport. *Epidemiol. Infect.* 2009; 137: 1057–1061.
- ¹¹ CDC. VPD Surveillance Manual. Chapter 8.1: Meningococcal Disease.
- ¹² Robert Koch-Institut. Meningokokken-Erkrankungen. RKI Ratgeber, Stand November 2018. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Meningokokken.html. Abgerufen März 2019.
- ¹³ ECDC Guidance. Risk assessment guidelines for diseases transmitted on aircraft (RAGIDA). PART 2: Operational guidelines for assisting in the evaluation of risk for transmission by disease. 2010.
- ¹⁴ Bundesamt für Gesundheit. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten und Erreger. Leitfaden zur Meldepflicht 2019. <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html>
- ¹⁵ Ricco M, Vezzosi L, Odone A, et al. Invasive meningococcal disease on the workplaces: a systematic review. *Acta Biomed.* 2017; 88(3): 337–351.
- ¹⁶ McNamara LA, MacNeil JR, Cohn AC, et al. Mass chemoprophylaxis for control of outbreaks of meningococcal disease. *Lancet Infect Dis*. 2018; 18: e272–81.
- ¹⁷ Ministère des solidarités et de la santé. Guide Pratique sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d'infection invasive à méningocoque. Juni 2018 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_Instruction_DGS_2014_301a.pdf. Abgerufen 2019.
- ¹⁸ Purcell B, Samuelsson S, Hahné SJM, et al. Effectiveness of antibiotics in preventing meningococcal disease after a case: systematic review. *BMJ* 2004; 328: 1339.
- ¹⁹ Telisingshe L, Waite TD, Gobin M, et al. Chemoprophylaxis and vaccination in preventing subsequent cases of meningococcal disease in household contacts of a case of meningococcal disease: a systematic review. *Epidemiol. Infect.* 2015; 143: 2259–2268.
- ²⁰ Boccia D, Andrews N, Samuelsson S, et al. Effectiveness of different policies in preventing meningococcal disease clusters following a single case in day-care and pre-school settings in Europe. *Epidemiol. Infect.* 2006; 134: 872–877.
- ²¹ National Reference Center for Meningococci. Annual Report of the Swiss National Reference Center for Meningococci, 2018. http://www.meningo.ch/index_DE.html. Abgerufen April 2019.
- ²² Dellicour S, Greenwood B. Systematic review: Impact of meningococcal vaccination on pharyngeal carriage of meningococci. *Tropical Medicine and International Health*. 2007; 12(12): 1409–1421.
- ²³ Ramsay ME, Andrews NJ, Trotter CL, et al. Herd immunity from meningococcal serogroup C conjugate vaccination in England: database analysis. *BMJ* 2003; 326: 365–6.
- ²⁴ Robert Koch-Institut. Mitteilung der Ständigen Impfkommision (STIKO) am Robert Koch-Institut: Empfehlung und Begründung einer postexpositionellen Meningokokken-Impfung. *Epidemiologisches Bulletin* 2009; 31: 314–317.
- ²⁵ Hoek M, Christensen H, Hellenbrand W et al. Effectiveness of vaccinating household contacts in addition to chemoprophylaxis after a case of meningococcal disease: a systematic review. *Epidemiology and Infection*. 2008; 136 (11): 1441–1447.
- ²⁶ Bundesamt für Gesundheit. Meningokokken-Impfung für Personen mit erhöhtem Risiko für eine invasive Erkrankung und Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko (Addendum zur ergänzenden Meningokokken-Impfpfehlung). BAG Bull 2024; 7: 8–12
- ²⁷ Burmaz T, Giucciardi S, Selle V, et al. Management of meningococcal outbreaks: are we using the same language? Comparison of the public health policies between high-income countries with low incidence of meningococcal disease. *Expert Review of Vaccines*. 2019; <https://doi.org/10.1080/14760584.2019.1595595>. Abgerufen 2019.
- ²⁸ Cohn CA, MacNeil SR, Clark TA, et al. Prevention and Control of Meningococcal Disease Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR* 2013; 62(2).



READY! FÜR DEN EX.

Dazu gehört dein Safer-Sex-Check: 



Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Freiburg		11473148
Graubünden		11456549
Tessin		11783405
Thurgau		11296351-11296375

BAG-Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

BAG-Bulletin

Woche

4/2025