



Informacije o vakcinaciji Covid-19

Najvažnije ukratko

- U proleće/leto 2023. godine se u suštini ne preporučuje vakcinacija protiv Covid-19.
- Osobe koje su posebno izložene riziku od teškog toka bolesti mogu dobiti vakcinaciju nakon individualne konsultacije sa svojim lekarom.

Da li se vakcinacija preporučuje u proleće/leto 2023?

U proleće/leto 2023. godine se u suštini ne preporučuje vakcinacija protiv Covid-19. Skoro svi u Švajcarskoj su vakcinisani i/ili su prošli kroz Covid-19. Vaš imuni sistem se shodno tome izborio sa virusom korona. U proleće/leto 2023. godine virus će verovatno manje cirkulisati. Trenutne varijante virusa takođe izazivaju prilično blage tokove bolesti. Preporuka za vakcinaciju će biti ponovo procenjena za jesen 2023. godine i shodno tome prilagođena.

Šta se odnosi na posebno ugrožene osobe?

Čak se i posebno ugroženim osobama trenutno ne preporučuje vakcinacija protiv Covid-19. Međutim, možete se vakcinisati nakon individualne konsultacije sa svojim lekarom. Vakcinacija može biti korisna u pojedinačnim slučajevima, jer poboljšava zaštitu od teške bolesti koja traje nekoliko meseci. Ovo važi bez obzira na ukupan broj vakcinacija koje ste već primili.

U posebno ugrožene osobe spadaju:

- Osobe preko 65 godina
- Osobe preko 16 godina sa hroničnom bolešću¹
- Osobe preko 16 godina sa trizomijom 21
- Trudnice

Ako bi u proleće/leto 2023. godine talas infekcije postao očigledan, preporuka za vakcinaciju bi bila prilagođena.

Ako vaš lekar preporučuje vakcinaciju protiv Covid-19, onda važi sledeće:

Vreme vakcinacije:

Vakcinacija protiv virusa Covid-19 može se dati 6 meseci nakon poslednje vakcinacije ili 6 meseci nakon poznate infekcije korona virusom. Druge vakcinacije sa inaktiviranim vakcinama mogu se davati istovremeno sa, pre ili posle vakcinacije protiv Covid-19.

Vakcina:

Preporučujemo po mogućnosti vakcinaciju sa varijanti prilagođenom (bivalentnom) mRNA-vakcinom ili protein vakcinom firme Novavax. Pri tome nije bitno koja je vakcina korišćena za prethodne vakcinacije.

Monovalentne mRNA-vaccine isto tako i dalje pružaju dobru zaštitu od teških tokova bolesti sa hospitalizacijom.

Važno: Trudnice i osobe koje doje, kao i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom treba da se vakcinišu mRNA vakcinom.

Alergije: Ako vam je potvrđeno da imate alergiju na komponente vakcine, potražite savet od alergologa.

Moguće nuspojave:

Bilo koja vakcinacija može izazvati nuspojave. Većinom su slabe do umerene i brzo prolaze.

Najčešće nuspojave uključuju reakcije na mestu injekcije, kao što su bol, crvenilo i otok, kao i glavobolja i umor. Pored toga, mogu se javiti bol u mišićima i zglobovima i opšti simptomi kao što su mrzlica, osećaj groznice ili groznica.

Ozbiljne nuspojave su veoma retke. Kod nekih osoba se odmah nakon vakcinacije pojavila teška alergijska reakcija. Na primer jak otok, crvenilo, svrab ili nedostatak vazduha. U veoma retkim slučajevima uočeno je zapaljenje srčanog mišića ili srčane kese u roku od 14 dana nakon vakcinacije, koje je uglavnom bilo blago i moglo se dobro lečiti. Tipični simptomi upale srčanog mišića su bol u grudima, nedostatak vazduha i snažno lupanje srca, većinom u roku od 2 nedelje nakon vakcinacije.

Ako imate ovakve simptome, odmah se obratite lekaru.

Troškovi:

Vakcinacija koju preporučuje Vaš lekar je besplatna za Vas i pokrivena je obaveznom zdravstvenim osiguranjem.

Daljnje informacije

Infoline Coronavirus: +41 58 463 00 00

- www.foph-coronavirus.ch/vaccination
- [How does the vaccination work?](#)
- [Frequently asked questions \(FAQs\) \(admin.ch\)](#)

¹ Detaljnu listu bolesti možete pronaći na: *Kategorije posebno ugroženih osoba*

