



COVID-19-IMPfung

**Checkliste Impfakt Covid-19 Vaccine Janssen®
(adenoviraler Vektor-Impfstoff Janssen-Cilag)****✓ Vor der Impfung****Administrative Klärung**

- Abklären, wie die zu impfende Person krankenversichert ist (OKP/Versichertenkarte)
- Die Identität der zu impfenden Person verifizieren

Abklärung Impfindikation

- Die Schweizer Covid-19 Impfstrategie basiert primär auf mRNA-Impfstoffen
- Impfung mit Covid-19 Vaccine Janssen®: Empfohlen für ungeimpfte Personen ab 18 Jahren, welche sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder Personen, die mRNA-Impfstoffe ablehnen.
- Kontraindikationen für mRNA-Impfstoffe:
 - Anaphylaxie oder schwere Allgemeinreaktion auf Inhaltsstoffe des Impfstoffs
 - Bekannte oder wahrscheinliche Sensibilisierung vom Soforttyp auf Polyethylenglykol (PEG, Macrogol) oder Tromethamin (Trometamol, TRIS)
 - Anaphylaxie nach der ersten Dosis eines mRNA-Impfstoffs (Cave: Es gibt keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei Gabe einer Impfdosis eines mRNA-Impfstoffes und einer Impfdosis COVID-19 Vaccine Janssen®)

➔ Abklärung und Beratung durch eine Fachärztin / einen Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie empfohlen

- Basierend auf der aktuellen Impfeempfehlung der EKIF/ des BAG
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen

Abklärung Kontraindikationen

- Bekannte Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe des Impfstoffes (z.B. Polysorbat 80).
- Personen mit St.n. Kapillarlecksyndrom (Capillary-Leak-Syndrome (CLS))

Impfung aktuell nicht empfohlen

1. Kinder und Jugendliche (<18 Jahre)
2. Schwangere und stillende Frauen

**Abklärung besonderer
Vorsichtsmassnahmen**

1. Generell bekannte Überempfindlichkeitsreaktionen/Allergien?
 2. Immundefizienz (angeboren, erworben, immunsuppressive Therapie einschliesslich Krebserkrankung unter Behandlung)
- Grundsätzlich wird immundefizienten Personen eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen empfohlen. Impfindikation mit COVID-19 Vaccine Janssen® nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung (Wirksamkeit, Verträglichkeit), insbesondere im Vergleich zu einer Impfung mit mRNA-Impfstoff, durch die betreuende Fachärztin resp. Facharzt und nach entsprechender Aufklärung. (Impfeempfehlung; Link: www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen)



✓ Durchführung der Impfung

Aktueller Gesundheitszustand/ Covid-19 Anamnese	<ul style="list-style-type: none"> • Generellen Gesundheitszustand abklären und entscheiden: Kann die Impfung heute erfolgen? • Akute fieberhafte Erkrankung? Impfung verschieben, bis die Symptome abgeklungen sind • Status nach bestätigter SARS-CoV-2 Infektion: Impfung mit einer Impfdosis zeitnah empfohlen ab 4 Wochen nach Infektion innerhalb von 3 Monaten. Aussagen und Konsequenzen verschiedener SARS-CoV-2-Tests und auf www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen - Covid-19 Testung
Aufklärung Klientin/Klient	<ul style="list-style-type: none"> • Hat die zu impfende Person Fragen? • Hat sie das Informationsmaterial gelesen? • Auf mögliche unerwünschte Impferscheinungen (UIE) hinweisen, insbesondere auf <ul style="list-style-type: none"> • mögliche allergische Reaktionen • Anzeichen für Thromboembolien und Thrombozytopenie: einige Tage bis 3 Wochen nach der Impfung Symptome wie starke oder anhaltende Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Verwirrtheit, Veränderung des Gemütszustandes, Krampfanfälle, Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Beinschwellungen, Schmerzen in den Beinen, anhaltende Bauchschmerzen, ungewöhnliche Hautblutungen, Petechien.
Einwilligung Klientin/Klient	<ul style="list-style-type: none"> • Mündliche Einwilligung der zu impfenden Person zur Impfung auf Basis einer informierten Entscheidung sowie zur elektronischen Erfassung der Impfung im Datenerfassungssystem einholen • Schriftlichen Vermerk zur Einwilligung zur Impfung im Impfdatenblatt/IT-Tool machen • Im Falle von Urteilsunfähigkeit muss die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung vorliegen
Ausfüllen Impfdatenblatt/ Erfassung im IT-Tool	<ul style="list-style-type: none"> • Eintragen der relevanten Daten der zu impfenden Person im IT-Tool
Aufbereitung Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Informationen Hersteller: www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.covid19vaccinejanssen.com • Die Impfstoffvials schwenken aber nicht schütteln, vorsichtige Handhabung • Der Stopfen sollte mit der Aufziehnadel möglichst nur einmal durchstochen und die Bewegung der Kanüle minimiert werden.
Applikation Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Informationen Hersteller: www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.covid19vaccinejanssen.com • Eine Impfdosis i.m. M. deltoideus • Bei antikoagulierten Patienten und Patientinnen: Die Impfung erfolgt ebenfalls i. m., wichtig ist eine gute anschliessende Kompression www.bag.admin.ch/impfplan

✓ Nach der Impfung

Aufklärung Verhalten bei unerwünschten Impferscheinungen (UIE)	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf hinweisen, dass schwerwiegende oder unerwartete UIE gemeldet werden sollen und Klientin resp. Klient sich bei Ärztin/Arzt/Apothekerin/ Apotheker/Impfstelle melden soll • Ggfs. Kontaktnummer mitgeben • Meldung über Link zum Meldesystem «ELViS» im IT-Tool www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/elvis.html
Aufklärung Verhalten generell nach Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • Der zu erwartende Impfschutz tritt 3 Wochen nach der Impfung ein • Weiterhin Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten. Ausnahme sind private Treffen zwischen vollständig geimpften Personen (Verzicht auf Maske und Abstand möglich) sowie Veranstaltungen mit Zertifikat (gemäss Hinweisen der Veranstalter). • Falls eine Boosterimpfung nötig wird, wird informiert • Bei Auftreten von Covid-19-kompatiblen Symptomen Test durchführen (Impfung nicht 100% wirksam) • Bei geimpften Personen kann nach der Impfung für einen Zeitraum von 12 Monaten auf eine Kontakt- und Reisequarantäne sowie gewisse andere grenzsanitarische Massnahmen verzichtet werden (gemäss kantonaler Weisung und Angaben BAG Webseite: Reisen (admin.ch)) • Kein Minimalabstand zu anderen Impfungen notwendig
Abgabe Impfnachweis	<ul style="list-style-type: none"> • Impfnachweis aus IT-Tool mitgeben bzw. Eintrag im Impfausweis machen • Falls möglich Stempel und Unterschrift der impfenden Person • LOT-Nummer in Impfnachweis einkleben/eintragen • Information zum Impfzertifikat geben (gültig ab dem 22. Tag nach Impfung) und auf Anfrage ausstellen: Covid-Zertifikat (admin.ch)
Beobachtungszeit nach Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • Für den Fall einer allergischen Reaktion muss geschultes Gesundheitspersonal und eine Notfallausrüstung inklusive Adrenalin zur Verfügung stehen • Insbesondere Personen überwachen, die bereits direkt nach der Impfung Probleme hatten, z. B. Kreislaufprobleme • Alle geimpften Personen sollen mindestens 15 Minuten nach der Impfung am Impfort verweilen