



COVID-19-IMPfung

Checkliste Impfakt

✓ spezifisch vor 1. Impfung

Administrative Klärung

- Abklären, wie die zu impfende Person krankenversichert ist (OKP/Versichertenkarte)
- Die Identität der zu impfenden Person verifizieren

Abklärung Impfindikation

Abklärung gemäss Impfstrategie / Impfpfempfehlung / aktueller Priorisierung

1. Besonders gefährdete Person: Personen ≥ 65 Jahre sowie Erwachsene < 65 Jahren mit chronischen Krankheiten.
Spezifizierungen siehe Impfpfempfehlung:
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen
2. Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen
3. Enge Kontakte der definierten besonders gefährdeten Personen (erwachsene Haushaltsmitglieder oder pflegende Angehörige)
4. Erwachsene < 65 Jahren in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko
5. Alle anderen erwachsenen Personen, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht

Abklärung Kontraindikationen

- Bekannte Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe des Impfstoffes (insbesondere Polyethylenglykol [PEG] resp. Makrogol)

Impfung aktuell nicht empfohlen

1. Aktuell keine generelle Empfehlung für schwangere Frauen.
2. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (für Comirnaty® unter 16 Jahren)

Abklärung besonderer Vorsichtsmassnahmen

1. Generell bekannte Überempfindlichkeitsreaktionen/Allergien?
2. Immunsuppression (angeboren, erworben, immunsuppressive Therapie einschliesslich Krebserkrankung unter Behandlung)
→ Impfindikation grosszügig nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch Spezialarzt resp. Spezialärztin und nach entsprechender Aufklärung
3. Schwangere Frauen mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung
→ Indikationsstellung nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch Spezialarzt resp. Spezialärztin und nach entsprechender Aufklärung, Einwilligung und Dokumentation
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen

✓ spezifisch vor 2. Impfung

Unerwünschte Impferscheinungen (UIE) nach erster Impfung?

- Dokumentation im IT-Tool erfassen
- Unerwartete und schwerwiegende UIE müssen von der impfenden Person an Swissmedic gemeldet werden
- Bei einer anaphylaktischen Reaktion nach der 1. Impfdosis sollte keine 2. Impfdosis gegeben werden. Siehe auch die Erläuterung in der Impfpfempfehlung:
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen

Meldung UIE Swissmedic

- Über Link zum Meldesystem «ELViS» im IT-Tool
www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/elvis.html



✓ Durchführung 1. Impfung / 2. Impfung

Aktueller Gesundheitszustand

- Generellen Gesundheitszustand abklären und entscheiden: Kann die Impfung heute erfolgen?
- Akute fieberhafte Erkrankung?
Impfung verschieben, bis die Symptome abgeklungen sind
- Aktuell Covid-19-Diagnose mit oder ohne Symptome?
→ Impfung um drei Monate verschieben, medizinisch nach Symptomende möglich

Aufklärung Klientin/Klient

- Hat die zu impfende Person Fragen?
- Hat sie das Informationsmaterial gelesen?
- Auf mögliche UIE hinweisen, insbesondere auf mögliche allergische Reaktionen

Einwilligung Klientin/Klient

- Mündliche Einwilligung der zu impfenden Person zur Impfung auf Basis einer informierten Entscheidung sowie zur elektronischen Erfassung der Impfung im Datenerfassungssystem einholen
- Für die Impfung einer schwangeren Frau muss eine schriftliche Einwilligung vorliegen
- Einverständnis für einen elektronischen Impfausweis in «myCovidVac» / «meine Impfungen» abklären und im Impfdatenblatt/IT-Tool vermerken. Bei Fragen spezifischen Flyer abgeben
- Schriftlichen Vermerk zur Einwilligung zur Impfung im Impfdatenblatt/IT-Tool machen
- Im Falle von Urteilsunfähigkeit muss die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung vorliegen

Ausfüllen Impfdatenblatt/ Erfassung im IT-Tool

- Eintragen der relevanten Daten der zu impfenden Person im IT-Tool

Aufbereitung Impfstoff

- siehe Merkblatt Hersteller: www.bbraun.ch/kit-covid19/ / www.comirnatyeducation.ch/ / www.modernacovid19global.com
- Nicht schütteln, nur mehrmals umdrehen, nicht unnötig bewegen

Applikation Impfstoff

- siehe Merkblatt Hersteller: www.bbraun.ch/kit-covid19/ / www.comirnatyeducation.ch/ / www.modernacovid19global.com
- i. m. M. deltoideus
- Beide Impfdosen mit gleichem Impfstoff, Abstand 28 Tage (Comirnaty®: mindestens 21 Tage)
- Bei antikoagulierten Patienten und Patientinnen: Die Impfung erfolgt ebenfalls i. m., wichtig ist eine gute anschliessende Kompression www.bag.admin.ch/impfplan

✓ Nach 1. Impfung / 2. Impfung

Aufklärung Verhalten bei UIE

- Darauf hinweisen, dass schwerwiegende und unerwartete UIE gemeldet werden sollen und Klientin resp. Klient sich bei Ärztin/Arzt/Apothekerin/Apotheker/Impfstelle melden soll
- Ggfs. Kontaktnummer mitgeben

Aufklärung Verhalten generell nach 1./2. Impfung

- Weiterhin Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten
- Falls nach 2. Impfung eine Boosterimpfung nötig wird, wird informiert
- Bei Auftreten von Covid-19-kompatiblen Symptomen Test durchführen (Impfung nicht 100% wirksam)
- Isolations- und Quarantäneregeln bis auf weiteres wie bisher einhalten
- Andere Impfungen sollen mit einem Abstand von mindestens 1 Woche verabreicht werden

Abgabe Impfnachweis

- Impfnachweis aus IT-Tool mitgeben bzw. Eintrag im Impfausweis machen
- Stempel und Unterschrift der impfenden Person
- LOT-Nummer in Impfnachweis einkleben/eintragen

Aufbieten 2. Termin

- Termin am gleichen Impfort mit gleichem Impfstoff, im IT-Tool vermerken
- ggfs. Terminkärtli mitgeben
- Merkblatt mit Angaben zum Verhalten nach der Impfung mitgeben

Beobachtungszeit nach 1./2. Impfung

- Für den Fall einer allergischen Reaktion muss geschultes Gesundheitspersonal und eine Notfallausrüstung inklusive Adrenalin zur Verfügung stehen
- Insbesondere Personen überwachen, die bereits direkt nach der Impfung Probleme hatten, z. B. Kreislaufprobleme
- Alle geimpften Personen sollen mindestens 15 Minuten nach der Impfung am Impfort verweilen. Wenn die 1. Dosis gut toleriert wurde, ist eine Überwachung von 5 Minuten nach der 2. Dosis ausreichend.