

# act-info - SAMBAD

## Ambulante Suchthilfe

### Ergebnisse der Erhebung 2019



Etienne Maffli

Lausanne, Februar 2021

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Klientinnen und Klienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebogen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

---

**Auskunft:** Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
E-Mail [emaffli@suchtschweiz.ch](mailto:emaffli@suchtschweiz.ch)

**Bearbeitung:** Etienne Maffli  
Sucht Schweiz

**Vertrieb:** Forschung, Sucht Schweiz, Av. Louis-Ruchonnet 14,  
1003 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,  
E-Mail [cgmel@suchtschweiz.ch](mailto:cgmel@suchtschweiz.ch)

**Originaltext:** Deutsch

**Graphik/Layout:** Sucht Schweiz

**Copyright:** © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

**Zitierhinweis:** Maffli, E. (2021). *act-info* – SAMBAD: Ambulante Suchthilfe:  
Ergebnisse der Erhebung 2019. Lausanne: Sucht Schweiz.

---

## Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	7
Hinweise zu den Tabellen.....	8

## EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2019)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2019)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2019)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2019)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2019)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2019), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2019), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2019), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2019)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2019)

## AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2019)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2019)

## TRENDS

- G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G4 Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019
- G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019

## act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Substitution (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Jahrerhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden seit dem Berichtsjahr 2018 alle von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

### act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Allerdings konnten nicht alle Einrichtungen die revidierten Fragebogen in ihre Systeme implementieren. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Dies erklärt zum Teil die relativ hohe Anzahl fehlender Angaben bei manchen Fragen.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die Klientinnen und Klienten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die sozio-demographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2019 beteiligten sich 64 Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich hauptsächlich um spezialisierte Alkohol- und /oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten. Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind im Rahmen einer umfassenden Erhebung zur Einschätzung der gesamten Behandlungsnachfrage in der Suchthilfe befragt worden. Die Ergebnisse dieser

Befragung werden im Gesamtbericht *act-info* (Jahresbericht 2019) berichtet, welcher ebenfalls Anfang 2021 publiziert wird.

## Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben des laufenden *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der Klientinnen und Klienten, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) Personen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Im letzten Teil werden die Trends 2013-2019 als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechtsverteilung und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opiode, Kokain oder Derivate, andere Stimulantien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa sowie Glücksspiel).



## T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Geschlecht*</b>																			
Männer	69.3			70.5			86.7			80.1			23.8			63.9		4 120	
Frauen	30.7			29.5			13.3			19.9			76.2			36.1		2 332	
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
<b>N**</b>	<b>1 931</b>	<b>857</b>	<b>2 788</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>420</b>	<b>927</b>	<b>230</b>	<b>1 157</b>	<b>257</b>	<b>825</b>	<b>1 082</b>	<b>4 120</b>	<b>2 332</b>	<b>6 452</b>	<b>6 452</b>
<b>Alter (in Jahren)*</b>																			
bis 14	0.2	0.0	0.1	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	4.3	9.6	5.4	2.4	0.5	0.9	2.2	1.8	2.1	133
15-19	1.9	1.6	1.8	2.8	3.4	3.0	2.7	8.9	3.6	62.0	57.8	61.2	3.2	2.1	2.3	17.7	10.0	15.0	962
20-24	3.3	2.0	2.9	5.7	8.5	6.5	13.7	19.6	14.5	12.3	14.8	12.8	5.6	4.4	4.7	7.4	5.8	6.8	440
25-29	7.5	4.3	6.5	10.6	16.9	12.5	22.0	25.0	22.4	7.4	4.3	6.8	6.0	6.3	6.2	9.2	6.7	8.3	536
30-34	10.4	7.5	9.5	14.2	13.6	14.0	19.2	16.1	18.8	5.0	5.7	5.1	5.2	8.5	7.7	9.8	8.3	9.3	598
35-39	12.7	11.1	12.2	12.8	13.6	13.0	18.7	14.3	18.1	3.9	2.6	3.6	7.2	11.2	10.2	10.4	10.2	10.3	665
40-44	12.6	11.7	12.3	17.7	15.3	17.0	11.0	5.4	10.2	2.3	2.2	2.2	8.4	12.8	11.7	9.6	10.1	9.8	628
45-49	13.2	13.1	13.2	14.2	8.5	12.5	6.0	3.6	5.7	1.6	1.7	1.6	14.0	17.1	16.3	9.3	12.1	10.3	662
50-54	13.0	16.1	14.0	14.9	15.3	15.0	4.9	5.4	5.0	0.5	0.9	0.6	17.2	15.2	15.7	8.7	12.8	10.2	655
55-59	10.9	13.7	11.7	4.3	0.0	3.0	1.4	1.8	1.4	0.1	0.0	0.1	12.0	9.4	10.0	6.6	9.1	7.5	482
60-64	6.3	7.1	6.6	2.1	1.7	2.0	0.3	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	8.4	5.9	6.5	4.0	5.4	4.5	289
65-69	4.9	5.7	5.2	0.7	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	4.8	3.2	3.6	2.8	3.9	3.2	207
70-74	2.1	4.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.7	1.3	2.5	1.7	109
75 und mehr	1.1	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	2.3	0.9	1.3	1.0	67
<b>N**</b>	<b>1 931</b>	<b>856</b>	<b>2 787</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>420</b>	<b>927</b>	<b>230</b>	<b>1 157</b>	<b>250</b>	<b>815</b>	<b>1 065</b>	<b>4 112</b>	<b>2 321</b>	<b>6 433</b>	<b>6 433</b>
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	17	8	11	19	19
<b>Alter</b>																			
Mittelwert	45.6	48.9	46.6	40.2	37.7	39.5	33.9	31.3	33.5	21.5	20.8	21.4	46.1	45.4	45.6	37.4	42.4	39.2	
Standardabweichung	13.2	13.1	13.3	10.9	11.6	11.1	9.0	9.8	9.2	8.4	8.2	8.4	16.4	13.4	14.1	15.9	15.9	16.1	
1. Quartil	35.8	39.6	36.9	31.3	29.0	30.6	27.2	24.2	26.8	16.6	16.0	16.4	35.7	36.4	36.1	23.3	30.4	25.7	
Medianwert	45.8	49.5	46.9	41.1	39.4	40.3	32.6	29.4	32.3	17.8	17.5	17.8	49.3	46.2	46.8	36.6	43.7	39.1	
3. Quartil	55.2	57.5	55.9	49.4	45.9	48.5	39.47	35.9	39.3	23.2	21.8	22.8	57.6	53.9	54.5	49.6	53.9	51.3	
<b>N**</b>	<b>1 931</b>	<b>856</b>	<b>2 787</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>420</b>	<b>927</b>	<b>230</b>	<b>1 157</b>	<b>256</b>	<b>818</b>	<b>1 074</b>	<b>4 118</b>	<b>2 324</b>	<b>6 442</b>	
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	2	8	10	

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Zivilstand*</b>																			
ledig	45.8	32.4	41.7	68.5	54.0	64.4	74.6	77.8	75.1	89.6	88.1	89.3	28.4	27.9	28.0	60.8	41.4	53.8	3 220
verheiratet	32.2	30.7	31.7	14.2	14.0	14.1	14.4	7.4	13.5	4.3	3.8	4.2	52.2	50.7	51.0	23.5	32.6	26.8	1 600
getrennt	3.1	4.3	3.5	3.1	2.0	2.8	3.5	1.9	3.2	1.4	2.4	1.6	2.2	4.5	4.0	2.6	4.1	3.1	187
geschieden	17.0	27.0	20.0	11.0	30.0	16.4	6.6	13.0	7.5	2.3	3.8	2.6	14.7	13.9	14.1	11.1	18.0	13.6	814
verwitwet	1.5	5.1	2.6	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4	2.1	1.7	2.1	2.0	1.6	3.1	2.1	127
reg. Partnerschaft	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.5	0.3	0.9	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	33
<b>N**</b>	<b>1 816</b>	<b>808</b>	<b>2 624</b>	<b>127</b>	<b>50</b>	<b>177</b>	<b>347</b>	<b>54</b>	<b>401</b>	<b>863</b>	<b>210</b>	<b>1 073</b>	<b>232</b>	<b>750</b>	<b>982</b>	<b>3 840</b>	<b>2 141</b>	<b>5 981</b>	<b>5 981</b>
fehlende Angaben	115	49	164	14	9	23	17	2	19	64	20	84	25	75	100	280	191	471	471
<b>Staatsangehörigkeit*</b>																			
CH/FL	80.1	83.7	81.2	67.4	76.8	70.2	73.2	78.6	74.0	80.4	86.3	81.6	84.4	86.9	86.3	79.3	85.6	81.6	4 916
EU	13.1	11.5	12.6	24.2	16.1	21.8	16.6	17.9	16.8	10.8	7.3	10.1	13.9	9.4	10.4	13.3	9.9	12.0	726
andere	6.7	4.8	6.1	8.3	7.1	8.0	10.1	3.6	9.2	8.8	6.4	8.3	1.7	3.8	3.3	7.4	4.5	6.4	384
<b>N**</b>	<b>1 767</b>	<b>798</b>	<b>2 565</b>	<b>132</b>	<b>56</b>	<b>188</b>	<b>355</b>	<b>56</b>	<b>411</b>	<b>873</b>	<b>219</b>	<b>1 092</b>	<b>237</b>	<b>770</b>	<b>1 007</b>	<b>3 829</b>	<b>2 197</b>	<b>6 026</b>	<b>6 026</b>
fehlende Angaben	164	59	223	9	3	12	9	0	9	54	11	65	20	55	75	291	135	426	426

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N	
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Urbanitätsgrad*</b>																				
Grossstadtzentren	10.4	8.1	9.7	3.0	0.0	2.1	3.4	0.0	2.9	1.2	1.3	1.2	14.4	10.3	11.3	6.6	6.7	6.6	418	
Umland der Grossstadtzentren	20.8	21.4	21.0	12.6	12.1	12.4	20.7	10.9	19.4	12.7	8.8	11.9	17.7	16.4	16.7	17.3	16.2	16.9	1 067	
Mittelzentren	12.6	14.7	13.3	14.1	12.1	13.5	19.0	14.5	18.4	22.4	19.0	21.8	15.6	23.0	21.3	16.4	18.9	17.3	1 090	
Kleinzentren	29.3	29.5	29.4	46.7	41.4	45.1	36.6	50.9	38.5	34.5	33.6	34.4	26.3	25.8	25.9	32.2	30.6	31.6	1 994	
rural	26.9	26.3	26.7	23.7	34.5	26.9	20.4	23.6	20.8	29.2	37.2	30.7	25.9	24.5	24.9	27.5	27.7	27.6	1 740	
<b>N**</b>	<b>1 902</b>	<b>841</b>	<b>2 743</b>	<b>135</b>	<b>58</b>	<b>193</b>	<b>358</b>	<b>55</b>	<b>413</b>	<b>909</b>	<b>226</b>	<b>1 135</b>	<b>243</b>	<b>787</b>	<b>1 030</b>	<b>4 039</b>	<b>2 270</b>	<b>6 309</b>	<b>6 309</b>	
fehlende Angaben	29	16	45	6	1	7	6	1	7	18	4	22	14	38	52	81	62	143	143	
<b>MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*</b>																				
allein	38.5	35.0	37.4	34.8	40.5	36.4	33.7	28.8	33.0	12.1	16.3	12.9	14.3	11.5	12.0	28.7	26.2	27.9	1 415	
mit Herkunftsfamilie	7.2	2.8	5.8	13.4	9.5	12.3	20.6	9.6	19.1	66.1	57.1	64.3	12.1	5.7	7.0	26.4	14.5	22.5	1 143	
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	43.5	53.4	46.6	26.8	38.1	29.9	33.0	40.4	34.1	8.8	10.7	9.1	70.3	80.5	78.4	33.1	49.9	38.6	1 963	
mit Freunden/anderen Personen	4.0	2.3	3.4	7.1	4.8	6.5	6.7	7.7	6.8	3.2	3.6	3.3	2.2	1.7	1.8	4.2	2.8	3.7	188	
Haft	0.1	0.0	0.0	0.9	2.4	1.3	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9	
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.4	2.3	2.4	7.1	2.4	5.8	2.2	3.8	2.5	3.1	4.6	3.4	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	2.4	123	
Spital/Klinik	2.0	2.8	2.2	1.8	2.4	1.9	0.3	3.8	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.3	67	
anderes	2.3	1.5	2.1	8.0	0.0	5.8	2.9	5.8	3.3	6.0	7.7	6.4	1.1	0.6	0.7	3.7	2.8	3.4	172	
<b>N**</b>	<b>1 636</b>	<b>751</b>	<b>2 387</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>154</b>	<b>315</b>	<b>52</b>	<b>367</b>	<b>811</b>	<b>196</b>	<b>1 007</b>	<b>91</b>	<b>349</b>	<b>440</b>	<b>3 411</b>	<b>1 669</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	
fehlende Angaben	295	106	401	29	17	46	49	4	53	116	34	150	166	476	642	709	663	1 372	1 372	
<b>Wohnsituation (letzte 30 Tage)*</b>																				
stabile Wohnsituation	92.3	92.8	92.4	84.8	79.5	83.3	91.4	82.4	90.1	92.3	91.6	92.2	96.5	97.4	97.2	92.3	93.2	92.6	4 941	
instabile Wohnsituation	3.8	2.4	3.4	5.4	15.9	8.3	5.7	5.9	5.8	3.0	4.0	3.2	3.5	2.3	2.6	3.9	3.1	3.6	192	
Haft	0.1	0.0	0.0	0.9	2.3	1.3	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9	
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	3.8	4.8	4.1	8.9	2.3	7.1	2.2	11.8	3.6	4.4	4.5	4.4	0.0	0.3	0.2	3.6	3.6	3.6	194	
<b>N**</b>	<b>1 726</b>	<b>787</b>	<b>2 513</b>	<b>112</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>314</b>	<b>51</b>	<b>365</b>	<b>857</b>	<b>202</b>	<b>1 059</b>	<b>114</b>	<b>391</b>	<b>505</b>	<b>3 576</b>	<b>1 760</b>	<b>5 336</b>	<b>5 336</b>	
fehlende Angaben	205	70	275	29	15	44	50	5	55	70	28	98	143	434	577	544	572	1 116	1 116	

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioid			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Partnerbeziehung*</b>																			
keine Partnerbeziehung, alleinst. zeitweilige Beziehung(en)	40.2	40.5	40.3	61.5	37.0	54.3	47.1	20.8	43.6	71.0	61.1	68.9	19.2	20.5	20.2	49.8	38.7	45.8	1 510
zeitweilige Beziehung(en)	1.5	1.2	1.4	1.5	7.4	3.3	3.2	0.0	2.8	3.4	7.9	4.3	2.6	0.6	1.0	2.0	2.1	2.0	67
festе Beziehung, getrennt lebend	14.2	9.8	12.8	12.3	18.5	14.1	15.3	33.3	17.7	16.5	19.8	17.2	12.8	14.2	13.9	13.6	13.2	13.5	444
festе Beziehung, zusammen leb.	44.1	48.5	45.5	24.6	37.0	28.3	34.4	45.8	35.9	9.1	11.1	9.5	65.4	64.8	64.9	34.6	46.0	38.7	1 277
<b>N**</b>	<b>1 064</b>	<b>499</b>	<b>1 563</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>24</b>	<b>181</b>	<b>473</b>	<b>126</b>	<b>599</b>	<b>78</b>	<b>332</b>	<b>410</b>	<b>2 105</b>	<b>1 193</b>	<b>3 298</b>	<b>3 298</b>
fehlende Angaben	867	358	1 225	76	32	108	207	32	239	454	104	558	179	493	672	2 015	1 139	3 154	3 154
<b>Anzahl eigener Kinder*</b>																			
keine	42.3	35.8	40.1	55.2	52.2	54.3	61.3	55.2	60.4	92.6	92.8	92.6	45.2	30.3	33.5	61.1	45.9	55.6	1 994
1 Kind	21.3	21.8	21.4	24.1	17.4	22.2	17.2	27.6	18.8	2.5	3.3	2.7	10.6	17.4	15.9	14.4	16.7	15.2	547
2 Kinder	25.3	30.3	26.9	19.0	26.1	21.0	14.1	13.8	14.1	3.7	3.9	3.8	33.7	33.5	33.5	17.1	24.8	19.9	714
3 Kinder oder mehr	11.2	12.1	11.5	1.7	4.3	2.5	7.4	3.4	6.8	1.2	0.0	0.9	10.6	18.8	17.0	7.4	12.6	9.3	333
<b>N**</b>	<b>1 048</b>	<b>519</b>	<b>1 567</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>192</b>	<b>592</b>	<b>152</b>	<b>744</b>	<b>104</b>	<b>373</b>	<b>477</b>	<b>2 275</b>	<b>1 313</b>	<b>3 588</b>	<b>3 588</b>
fehlende Angaben	883	338	1 221	83	36	119	201	27	228	335	78	413	153	452	605	1 845	1 019	2 864	2 864
<b>Anzahl Kinder im Haushalt*</b>																			
keine	71.8	64.0	69.2	83.0	83.3	83.1	79.9	75.0	79.1	80.7	81.1	80.8	61.9	43.7	47.5	75.0	62.4	70.2	2 122
1 Kind	12.1	18.6	14.2	14.9	11.1	13.8	6.7	12.5	7.6	5.1	4.1	4.9	17.5	23.4	22.1	10.0	16.7	12.5	378
2 Kinder	11.9	13.8	12.5	2.1	5.6	3.1	7.5	12.5	8.2	10.5	10.7	10.6	18.6	22.8	21.9	11.0	15.0	12.5	379
3 Kinder oder mehr	4.2	3.7	4.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.1	3.7	4.1	3.8	2.1	10.2	8.5	4.0	5.9	4.7	143
<b>N**</b>	<b>884</b>	<b>436</b>	<b>1 320</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>134</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>455</b>	<b>122</b>	<b>577</b>	<b>97</b>	<b>364</b>	<b>461</b>	<b>1 878</b>	<b>1 144</b>	<b>3 022</b>	<b>3 022</b>
fehlende Angaben	1 047	421	1 468	94	41	135	230	32	262	472	108	580	160	461	621	2 242	1 188	3 430	3 430

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
<b>Höchste abgeschlossene Ausbildung*</b>																						
keine oder teilobligatorische Ausbildung	2.6	2.5	2.5	6.7	5.1	6.3	2.0	6.4	2.6	14.9	20.7	16.0	6.0	2.0	2.9	7.7	6.2	7.2	354			
obligatorische Schule	10.4	12.6	11.0	24.8	33.3	27.1	15.4	38.3	18.5	57.5	53.9	56.8	6.6	6.7	6.7	24.1	18.5	22.2	1 091			
Übergangsbildung	2.8	5.1	3.5	3.8	5.1	4.2	1.4	4.3	1.8	3.7	4.7	3.9	1.3	2.4	2.1	2.9	4.2	3.4	166			
Allgemeinausbildung ohne Maturität	0.7	0.8	0.7	1.9	2.6	2.1	1.4	0.0	1.2	0.0	0.5	0.1	0.0	1.4	1.1	0.6	0.8	0.7	34			
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	54.4	54.3	54.4	58.1	41.0	53.5	63.1	42.6	60.3	18.0	13.5	17.1	36.4	47.2	44.7	43.7	44.0	43.8	2 153			
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.7	3.4	4.3	1.9	5.1	2.8	4.8	2.1	4.4	2.7	3.6	2.9	4.0	9.2	8.0	4.1	5.9	4.7	231			
höhere Berufsbildung	12.1	10.9	11.7	1.0	5.1	2.1	7.2	4.3	6.8	1.5	2.1	1.6	22.5	13.4	15.5	8.3	9.3	8.6	424			
Fachhochschule oder Universität	12.1	10.3	11.6	1.9	2.6	2.1	4.8	2.1	4.4	1.6	1.0	1.5	22.5	17.5	18.6	8.3	10.7	9.1	449			
Doktorat oder Habilitation	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	11			
<b>N**</b>	<b>1 486</b>	<b>652</b>	<b>2 138</b>	<b>105</b>	<b>39</b>	<b>144</b>	<b>293</b>	<b>47</b>	<b>340</b>	<b>805</b>	<b>193</b>	<b>998</b>	<b>151</b>	<b>509</b>	<b>660</b>	<b>3 240</b>	<b>1 673</b>	<b>4 913</b>	<b>4 913</b>			
fehlende Angaben	445	205	650	36	20	56	71	9	80	122	37	159	106	316	422	880	659	1 539	1 539			
<b>Berufliche Stellung*</b>																						
nicht erwerbstätig	17.9	25.4	20.1	18.0	35.5	22.5	16.5	32.4	18.6	23.0	18.2	22.1	9.1	23.5	20.0	19.0	25.9	20.8	594			
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.9	1.7	1.8	6.7	0.0	5.0	5.2	2.7	4.9	30.6	25.0	29.6	9.1	2.9	4.4	9.0	5.8	8.1	231			
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.4	2.8	3.2	3.4	3.2	3.3	2.8	5.4	3.2	2.5	2.3	2.4	0.0	2.9	2.2	3.1	3.0	3.1	88			
angelernete(r) ArbeiterIn	5.4	4.9	5.2	9.0	3.2	7.5	4.0	8.1	4.6	1.2	3.4	1.6	0.0	0.0	0.0	4.7	4.3	4.6	131			
gelernte(r) ArbeiterIn	12.1	7.4	10.7	19.1	12.9	17.5	20.2	8.1	18.6	6.9	6.8	6.9	0.0	2.9	2.2	12.1	7.0	10.7	306			
VorarbeiterIn	2.0	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.3	37			
einfache(r) Angestellte(r)	24.9	37.7	28.7	23.6	16.1	21.7	27.4	32.4	28.1	10.9	11.4	11.0	18.2	35.3	31.1	21.4	32.0	24.2	690			
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	14.8	11.2	13.8	12.4	12.9	12.5	10.1	8.1	9.8	4.4	1.1	3.9	27.3	17.6	20.0	11.5	9.6	11.0	314			
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.4	1.7	4.3	1.1	0.0	0.8	1.2	0.0	1.1	0.5	0.0	0.4	0.0	5.9	4.4	3.4	1.4	2.8	81			
selbständig	9.8	6.4	8.8	2.2	0.0	1.7	9.3	0.0	8.1	2.5	2.3	2.4	36.4	8.8	15.6	7.7	5.2	7.0	200			
SchülerIn/StudentIn	1.4	0.0	1.0	2.2	12.9	5.0	1.6	2.7	1.8	15.8	26.1	17.6	0.0	0.0	0.0	5.4	4.3	5.1	146			
andere Stellung	1.0	0.4	0.8	2.2	3.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.5	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.1	31			
<b>N**</b>	<b>1 112</b>	<b>472</b>	<b>1 584</b>	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>120</b>	<b>248</b>	<b>37</b>	<b>285</b>	<b>405</b>	<b>88</b>	<b>493</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>2 087</b>	<b>762</b>	<b>2 849</b>	<b>2 849</b>			
fehlende Angaben	819	385	1 204	52	28	80	116	19	135	522	142	664	246	791	1 037	2 033	1 570	3 603	3 603			

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*</b>																			
Erwerbseinkommen	57.0	42.1	52.3	33.9	25.0	31.3	58.0	50.0	56.9	24.8	17.8	23.5	75.7	68.3	70.0	47.1	43.4	45.9	2 470
Ersparnisse	2.7	2.8	2.7	4.0	0.0	2.8	3.0	0.0	2.6	0.6	1.0	0.7	0.9	1.6	1.4	2.0	1.8	2.0	106
Rente (AHV/IV u.a.)	15.0	24.9	18.0	19.4	21.2	19.9	7.9	21.2	9.7	3.1	5.0	3.5	10.4	10.1	10.2	11.0	18.1	13.3	716
Sozialhilfe/Fürsorge	14.2	12.4	13.6	31.5	42.3	34.7	13.3	19.2	14.1	12.4	13.9	12.6	6.1	2.1	3.1	13.7	11.5	12.9	696
Arbeitslosenversicherung	4.4	2.8	3.9	3.2	0.0	2.3	7.3	0.0	6.3	2.7	0.5	2.3	0.0	1.1	0.8	4.0	2.0	3.4	182
durch PartnerIn	1.4	9.7	4.0	3.2	1.9	2.8	1.8	3.8	2.1	2.2	2.0	2.2	0.0	10.1	7.8	1.7	7.9	3.7	198
durch Eltern/Angehörige	2.4	2.4	2.4	4.0	7.7	5.1	5.1	5.8	5.2	53.1	57.4	54.0	7.0	5.9	6.1	18.1	13.2	16.5	887
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	7
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
Prostitution	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	10
Taggeldversicherung	1.4	1.8	1.5	0.8	0.0	0.6	1.8	0.0	1.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	55
anderes	1.3	0.6	1.1	0.0	1.9	0.6	0.6	0.0	0.5	0.3	1.5	0.6	0.0	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	46
<b>N**</b>	<b>1 738</b>	<b>784</b>	<b>2 522</b>	<b>124</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>331</b>	<b>52</b>	<b>383</b>	<b>858</b>	<b>202</b>	<b>1 060</b>	<b>115</b>	<b>375</b>	<b>490</b>	<b>3 631</b>	<b>1 745</b>	<b>5 376</b>	<b>5 376</b>
fehlende Angaben	193	73	266	17	7	24	33	4	37	69	28	97	142	450	592	489	587	1 076	1 076
<b>Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*</b>																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	51.2	27.7	44.2	26.4	21.6	25.0	54.3	35.3	51.8	14.1	12.6	13.8	79.5	49.4	56.0	40.3	29.7	37.0	1 901
Teilzeitarbeit	6.1	22.4	11.0	7.4	9.8	8.1	4.7	15.7	6.2	3.4	4.3	3.6	1.1	29.0	22.9	5.1	19.1	9.5	486
Gelegenheitsjobs	1.2	0.3	0.9	2.5	0.0	1.7	2.4	3.9	2.6	0.9	0.5	0.8	1.1	0.3	0.5	1.2	0.6	1.0	51
in Ausbildung	3.1	2.0	2.8	5.0	3.9	4.7	3.6	11.8	4.6	60.4	60.9	60.5	5.7	7.7	7.3	20.7	15.5	19.1	979
arbeitslos und aktive Stellensuche	10.7	8.3	10.0	12.4	7.8	11.0	15.1	9.8	14.4	8.1	4.3	7.3	0.0	1.3	1.0	10.0	5.8	8.7	448
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	7.1	10.2	8.0	22.3	25.5	23.3	11.3	7.8	10.8	5.6	5.3	5.5	0.0	0.6	0.5	7.3	7.3	7.3	374
Rentner/Rentnerin	7.7	12.9	9.2	4.1	3.9	4.1	0.6	2.0	0.8	0.2	1.0	0.4	9.1	7.1	7.5	4.5	8.6	5.8	297
Arbeitsunfähigkeit	5.5	6.7	5.9	9.9	13.7	11.0	4.5	11.8	5.4	1.5	1.9	1.6	0.0	1.6	1.3	4.4	5.8	4.8	247
Hausfrau/-mann	0.3	3.8	1.3	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.2	2.1	0.8	40
anderes	7.0	5.7	6.7	9.1	13.7	10.5	3.6	2.0	3.4	5.7	9.2	6.4	3.4	1.6	2.0	6.4	5.4	6.1	312
<b>N**</b>	<b>1 676</b>	<b>714</b>	<b>2 390</b>	<b>121</b>	<b>51</b>	<b>172</b>	<b>337</b>	<b>51</b>	<b>388</b>	<b>857</b>	<b>207</b>	<b>1 064</b>	<b>88</b>	<b>310</b>	<b>398</b>	<b>3 535</b>	<b>1 600</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>
fehlende Angaben	255	143	398	20	8	28	27	5	32	70	23	93	169	515	684	585	732	1 317	1 317

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*</b>																			
kein Einkommen	45.3	55.3	48.0	61.2	81.3	66.2	49.4	44.4	48.9	58.6	76.1	62.3	80.0	83.1	82.4	54.8	67.7	58.6	692
weniger als 1000 Fr.	4.4	2.0	3.7	0.0	12.5	3.1	3.8	0.0	3.4	23.6	10.9	20.9	0.0	0.0	0.0	7.9	4.1	6.8	80
1001 bis 2000 Fr.	3.4	7.2	4.4	8.2	6.3	7.7	5.1	11.1	5.7	2.9	6.5	3.6	4.0	1.3	2.0	3.6	5.5	4.1	49
2001 bis 3000 Fr.	5.6	10.5	6.9	14.3	0.0	10.8	6.3	22.2	8.0	0.6	2.2	0.9	0.0	1.3	1.0	4.5	6.1	5.0	59
3001 bis 4000 Fr.	8.8	12.5	9.8	6.1	0.0	4.6	11.4	22.2	12.5	4.0	4.3	4.1	0.0	1.3	1.0	6.8	7.3	6.9	82
4001 bis 5000 Fr.	12.7	5.9	10.8	6.1	0.0	4.6	11.4	0.0	10.2	6.3	0.0	5.0	4.0	2.6	2.9	9.2	4.1	7.7	91
5001 bis 6000 Fr.	9.5	2.0	7.5	4.1	0.0	3.1	3.8	0.0	3.4	2.9	0.0	2.3	8.0	5.2	5.9	6.6	2.0	5.2	62
6001 bis 8000 Fr.	5.8	2.0	4.8	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	4.5	0.6	0.0	0.5	0.0	3.9	2.9	3.7	1.7	3.1	37
8001 bis 10 000 Fr.	2.4	1.3	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.6	0.0	0.5	4.0	1.3	2.0	1.6	0.9	1.4	16
10001 bis 15 000 Fr.	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.9	11
über 15 000 Fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	2
<b>N**</b>	<b>411</b>	<b>152</b>	<b>563</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>9</b>	<b>88</b>	<b>174</b>	<b>46</b>	<b>220</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>102</b>	<b>837</b>	<b>344</b>	<b>1 181</b>	<b>1 181</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 520</i>	<i>705</i>	<i>2 225</i>	<i>92</i>	<i>43</i>	<i>135</i>	<i>285</i>	<i>47</i>	<i>332</i>	<i>753</i>	<i>184</i>	<i>937</i>	<i>232</i>	<i>748</i>	<i>980</i>	<i>3 283</i>	<i>1 988</i>	<i>5 271</i>	<i>5 271</i>
<b>Schulden*</b>																			
keine Schulden	67.9	72.5	69.3	39.3	35.0	38.3	40.4	40.0	40.4	79.6	79.5	79.6	92.1	93.6	93.3	67.2	74.9	69.6	1 609
bis 5000 Fr.	3.6	5.0	4.0	4.9	0.0	3.7	11.3	10.0	11.2	5.6	4.5	5.3	0.0	1.6	1.2	5.4	4.4	5.1	117
5001 bis 10 000 Fr.	5.3	4.0	4.9	8.2	15.0	9.9	7.8	10.0	8.1	3.9	4.5	4.1	2.6	1.6	1.8	5.1	4.8	5.0	116
10 001 bis 25 000 Fr.	4.3	2.6	3.8	6.6	10.0	7.4	11.3	0.0	9.9	2.1	1.8	2.0	0.0	1.6	1.2	4.5	2.9	4.0	93
25 001 bis 50 000 Fr.	3.8	2.3	3.4	6.6	0.0	4.9	6.4	10.0	6.8	1.4	0.9	1.3	2.6	0.8	1.2	3.5	2.3	3.1	72
50 001 bis 100 000 Fr.	9.8	10.9	10.1	21.3	35.0	24.7	10.6	10.0	10.6	5.6	8.0	6.1	2.6	0.0	0.6	8.8	8.4	8.7	201
über 100 000 Fr.	3.3	1.3	2.7	1.6	0.0	1.2	5.7	0.0	5.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.8	0.6	2.8	0.8	2.2	50
Höhe nicht bekannt	2.1	1.3	1.8	11.5	5.0	9.9	6.4	20.0	8.1	1.2	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.5	2.3	53
<b>N**</b>	<b>676</b>	<b>302</b>	<b>978</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>141</b>	<b>20</b>	<b>161</b>	<b>431</b>	<b>112</b>	<b>543</b>	<b>38</b>	<b>125</b>	<b>163</b>	<b>1 583</b>	<b>728</b>	<b>2 311</b>	<b>2 311</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 255</i>	<i>555</i>	<i>1 810</i>	<i>80</i>	<i>39</i>	<i>119</i>	<i>223</i>	<i>36</i>	<i>259</i>	<i>496</i>	<i>118</i>	<i>614</i>	<i>219</i>	<i>700</i>	<i>919</i>	<i>2 537</i>	<i>1 604</i>	<i>4 141</i>	<i>4 141</i>

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frühere Hafterfahrungen*</b>																
keine	90.7	96.1	92.3	36.7	75.0	44.7	69.6	100.0	72.4	92.8	100.0	94.0	86.9	95.6	89.2	935
Strafhaft	4.4	2.5	3.8	26.7	25.0	26.3	14.5	0.0	13.2	4.6	0.0	3.8	6.2	2.9	5.3	56
Untersuchungshaft	3.6	0.5	2.7	16.7	0.0	13.2	10.1	0.0	9.2	2.0	0.0	1.6	4.3	0.4	3.2	34
Straf- und Untersuchungshaft	1.3	1.0	1.2	20.0	0.0	15.8	5.8	0.0	5.3	0.7	0.0	0.5	2.6	1.1	2.2	23
<b>N**</b>	<b>474</b>	<b>203</b>	<b>677</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>31</b>	<b>183</b>	<b>773</b>	<b>275</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>
fehlende Angaben	1 457	654	2 111	111	51	162	295	49	344	775	199	974	3 090	1 232	4 322	4 322
<b>Gesamtdauer der Hafterfahrungen***</b>																
<1 Monat	28.0	20.0	26.7	22.2	100.0	36.4	38.5	-	38.5	14.3	-	14.3	26.3	50.0	29.2	19
1 bis 2 Monate	4.0	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0	7.7	-	7.7	0.0	-	0.0	3.5	12.5	4.6	3
>2 bis 6 Monate	32.0	20.0	30.0	33.3	0.0	27.3	7.7	-	7.7	28.6	-	28.6	28.1	12.5	26.2	17
>6 bis 12 Monate	8.0	20.0	10.0	11.1	0.0	9.1	15.4	-	15.4	0.0	-	0.0	8.8	12.5	9.2	6
mehr als 1 Jahr	28.0	20.0	26.7	33.3	0.0	27.3	30.8	-	30.8	57.1	-	57.1	33.3	12.5	30.8	20
<b>N**</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
fehlende Angaben	19	3	22	10	0	10	8	0	8	4	0	4	44	4	48	48

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich



## T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Hauptsächliche zuweisende Instanz*</b>																			
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	13.0	6.7	11.0	4.9	2.0	4.0	12.4	7.5	11.7	48.9	46.7	48.5	0.9	0.8	0.8	19.5	8.1	15.4	916
Arztpraxis	9.8	11.1	10.2	9.8	5.9	8.6	5.1	3.8	4.9	2.3	5.6	2.9	4.1	3.0	3.2	6.6	7.4	6.9	408
andere auf Suchtprobl. spez. Einrichtung	5.2	6.0	5.4	8.1	15.7	10.3	5.1	7.5	5.5	2.1	1.4	2.0	1.8	3.1	2.8	4.1	4.3	4.2	247
andere medizinische oder soziale Dienste	17.9	19.7	18.5	16.3	17.6	16.7	12.1	28.3	14.3	9.5	7.0	9.0	6.8	4.6	5.1	14.3	12.8	13.7	816
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.3	1.1	0.6	1.6	2.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.9	7.9	3.9	1.4	0.9	1.0	1.9	2.7	2.2	130
ArbeitgeberIn	3.3	1.5	2.7	0.8	2.0	1.1	1.8	3.8	2.1	1.9	0.9	1.7	1.8	0.3	0.6	2.6	1.0	2.0	120
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	48.6	52.3	49.7	57.7	51.0	55.7	62.2	47.2	60.2	31.5	28.5	30.9	81.9	86.0	85.1	49.1	61.7	53.7	3 193
anderes	2.0	1.6	1.9	0.8	3.9	1.7	1.2	1.9	1.3	0.8	1.9	1.0	1.4	1.2	1.3	2.0	2.0	2.0	119
<b>N**</b>	<b>1 766</b>	<b>803</b>	<b>2 569</b>	<b>123</b>	<b>51</b>	<b>174</b>	<b>331</b>	<b>53</b>	<b>384</b>	<b>885</b>	<b>214</b>	<b>1 099</b>	<b>221</b>	<b>738</b>	<b>959</b>	<b>3 801</b>	<b>2 148</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>
fehlende Angaben	165	54	219	18	8	26	33	3	36	42	16	58	36	87	123	319	184	503	503

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Gerichtliche Massnahme*</b>																
keine Massnahme	91.0	94.1	91.9	95.5	94.1	95.1	95.0	93.8	94.8	75.7	81.2	76.7	89.5	92.8	90.4	2 474
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	4.3	7.1	4.8	0.8	0.8	0.8	23
Massnahme liegt vor	9.0	5.9	8.1	4.5	5.9	4.9	4.5	6.3	4.8	20.0	11.8	18.5	9.7	6.4	8.8	241
<b>N**</b>	<b>1 126</b>	<b>476</b>	<b>1 602</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>220</b>	<b>32</b>	<b>252</b>	<b>370</b>	<b>85</b>	<b>455</b>	<b>2 018</b>	<b>720</b>	<b>2 738</b>	<b>2 738</b>
fehlende Angaben	805	381	1 186	52	25	77	144	24	168	557	145	702	1 845	787	2 632	2 632
<b>Art der gerichtlichen Massnahme***</b>																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	1
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	1.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	2
ambulante Behandlung	40.4	50.0	42.6	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0	58.0	75.0	60.3	50.4	57.1	51.8	73
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	1
in Erwartung eines Urteils	3.8	0.0	2.9	100.0	0.0	100.0	20.0	0.0	20.0	4.0	0.0	3.4	5.3	0.0	4.3	6
anderes	57.7	50.0	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	25.0	43.1	48.7	42.9	47.5	67
<b>N**</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>113</b>	<b>28</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
fehlende Angaben	49	12	61	3	2	5	6	2	8	40	8	48	99	24	123	123

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

## T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frühere Behandlungserfahrungen*</b>																			
nein	45.8	42.8	44.9	18.9	18.2	18.7	49.1	43.2	48.3	78.4	74.3	77.6	79.2	79.7	79.6	56.3	56.5	56.4	2 620
ja	54.2	57.2	55.1	81.1	81.8	81.3	50.9	56.8	51.7	21.6	25.7	22.4	20.8	20.3	20.4	43.7	43.5	43.6	2 028
<b>N**</b>	<b>1 538</b>	<b>682</b>	<b>2 220</b>	<b>106</b>	<b>44</b>	<b>150</b>	<b>281</b>	<b>44</b>	<b>325</b>	<b>755</b>	<b>179</b>	<b>934</b>	<b>72</b>	<b>290</b>	<b>362</b>	<b>3 153</b>	<b>1 495</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>
<i>fehlende Angaben</i>	393	175	568	35	15	50	83	12	95	172	51	223	185	535	720	967	837	1 804	1 804
<b>Typ der früheren Behandlungen***</b>																			
heroingestützte Behandlung	1.1	1.1	1.1	3.6	8.3	5.0	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	1.2	1.3	1.2	17
Substitution (Methadon, Subutex®)	5.2	4.3	4.9	76.8	66.7	73.8	9.1	41.7	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.1	9.7	8.2	9.2	127
weitere medikamentöse Behandlung	7.3	5.0	6.5	16.1	12.5	15.0	9.1	0.0	7.9	0.0	2.9	0.7	0.0	3.4	2.7	6.8	4.6	6.1	84
ambulante Beratung/Therapie	74.2	70.9	73.1	53.6	41.7	50.0	80.5	83.3	80.9	90.7	79.4	88.0	73.3	87.9	84.9	75.8	74.4	75.3	1 044
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.6	2.9	2.0	1.8	0.0	1.3	3.9	0.0	3.4	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	1.6	22
stationäre Therapie	49.7	55.8	51.7	32.1	37.5	33.8	45.5	50.0	46.1	15.7	26.5	18.3	33.3	15.5	19.2	41.8	45.6	43.1	597
Entzug	39.8	43.9	41.1	39.3	33.3	37.5	36.4	66.7	40.4	8.3	0.0	6.3	13.3	15.5	15.1	33.1	32.8	33.0	457
Selbsthilfegruppe	6.0	7.6	6.5	1.8	0.0	1.3	9.1	16.7	10.1	0.9	0.0	0.7	0.0	5.2	4.1	5.1	5.7	5.3	73
andere	1.1	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.9	2.9	1.4	0.0	3.4	2.7	1.6	2.5	1.9	27
<b>N**</b>	<b>563</b>	<b>278</b>	<b>841</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>34</b>	<b>142</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>910</b>	<b>476</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>
<i>fehlende Angaben</i>	274	115	389	30	12	42	67	13	80	56	13	69	0	3	3	479	185	664	664

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*</b>																
nein	97.6	98.2	97.8	40.9	32.1	38.3	96.1	89.3	95.1	99.8	99.3	99.7	96.4	96.1	96.3	3 002
ja	2.4	1.8	2.2	59.1	67.9	61.7	3.9	10.7	4.9	0.2	0.7	0.3	3.6	3.9	3.7	116
<b>N**</b>	<b>1 091</b>	<b>510</b>	<b>1 601</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>94</b>	<b>155</b>	<b>28</b>	<b>183</b>	<b>592</b>	<b>152</b>	<b>744</b>	<b>2 199</b>	<b>919</b>	<b>3 118</b>	<b>3 118</b>
fehlende Angaben	840	347	1 187	75	31	106	209	28	237	335	78	413	1 664	588	2 252	2 252
<b>Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***</b>																
Heroin	27.8	11.1	22.2	41.0	47.4	43.1	16.7	33.3	22.2	0.0	-	0.0	33.8	38.2	35.2	37
Methadon	50.0	77.8	59.3	35.9	47.4	39.7	50.0	33.3	44.4	0.0	-	0.0	39.4	50.0	42.9	45
andere Opiate	22.2	11.1	18.5	23.1	5.3	17.2	16.7	33.3	22.2	100.0	-	100.0	23.9	11.8	20.0	21
andere Substanzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	11.1	0.0	-	0.0	2.8	0.0	1.9	2
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
fehlende Angaben	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	2	11	11
<b>Je in einer Substitutionsbehandlung*</b>																
nie	95.4	95.7	95.5	30.3	30.0	30.2	92.4	72.7	89.6	98.7	100.0	98.9	92.4	92.1	92.3	2 648
ja	4.6	4.3	4.5	69.7	70.0	69.8	7.6	27.3	10.4	1.3	0.0	1.1	7.6	7.9	7.7	221
<b>N**</b>	<b>1 139</b>	<b>506</b>	<b>1 645</b>	<b>99</b>	<b>40</b>	<b>139</b>	<b>198</b>	<b>33</b>	<b>231</b>	<b>374</b>	<b>96</b>	<b>470</b>	<b>2 056</b>	<b>813</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>
fehlende Angaben	792	351	1 143	42	19	61	166	23	189	553	134	687	1 807	694	2 501	2 501
<b>Alter bei erster Substitutionsbehandlung****</b>																
Mittelwert	32.2	34.2	32.7	29.2	27.2	28.6	26.3	28.8	27.5	21.5	-	21.5	28.7	29.6	29.0	
Standardabweichung	9.4	7.6	8.9	7.9	9.1	8.2	11.3	3.0	7.8	6.6	-	6.6	8.6	8.2	8.4	
1. Quartil	24.0	32.0	24.0	24.0	20.0	23.0	19.5	26.5	21.5	16.5	-	16.5	23.0	23.5	23.0	
Medianwert	30.5	37.0	32.0	28.0	27.0	28.0	21.5	29.0	26.5	20.5	-	20.5	27.0	30.0	28.0	
3. Quartil	37.0	40.0	39.0	36.0	32.0	35.0	33.0	31.0	31.0	26.5	-	26.5	34.5	33.5	34.5	
<b>N**</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>88</b>	

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren. Altersangaben

## T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2019)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
Alkohol	50.1	56.9	52.0	2 788	Alkohol	50.1	56.9	52.0	2 788
Heroin	2.9	3.2	3.0	160					
Methadon	0.3	0.2	0.2	13					
Buprenorphin	0.1	0.1	0.1	5	Opioide	3.7	3.9	3.7	200
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
andere Opioide	0.4	0.4	0.4	22					
Kokain-Pulver	9.0	3.5	7.5	401					
Crack-Kokain	0.3	0.2	0.3	16	Kokain oder Derivate	9.4	3.7	7.8	420
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.1	3					
Amphetamine	0.7	1.0	0.8	43					
Metamphetamine	0.1	0.0	0.1	5					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.4	0.4	19	andere Stimulanzien	1.3	1.6	1.4	75
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	1					
andere Stimulanzien	0.1	0.2	0.1	7					
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	1					
Benzodiazepine	0.9	1.9	1.2	62	Hypnotika/Sedativa	1.1	2.5	1.5	78
GHB/GBL	0.1	0.1	0.1	6					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.4	0.2	9					
LSD	0.1	0.1	0.1	4					
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0	Halluzinogene	0.1	0.1	0.1	5
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1					
Cannabis	24.0	15.3	21.6	1 157	Cannabis	24.0	15.3	21.6	1 157
Tabak	2.1	5.0	2.9	156	Tabak	2.1	5.0	2.9	156
flüchtige Stoffe	0.0	0.1	0.0	2					
andere Substanz(en)	0.4	0.2	0.4	19	andere Substanz	0.4	0.3	0.4	21
Glücksspielsucht	3.1	2.1	2.8	149					
Computer-bzw. Internetsucht	1.6	0.5	1.3	70	suchtähnliche Verhaltensweisen	7.8	10.8	8.7	464
Essstörungen	0.3	5.6	1.8	96					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2.8	2.7	2.8	149					
<b>N**</b>	<b>3 858</b>	<b>1 506</b>	<b>5 364</b>	<b>5 364</b>	<b>N**</b>	<b>3 858</b>	<b>1 506</b>	<b>5 364</b>	<b>5 364</b>
fehlende Angaben	5	1	6	6		5	1	6	6

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2019)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
<b>Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*</b>			
ja	6.8	5.5	6.5
nein	93.2	94.5	93.5
<b>N*</b>	<b>1 874</b>	<b>690</b>	<b>2 564</b>
<i>fehlende Angaben</i>	1 989	817	2 806
<b>Häufigste Substanzkombinationen***</b>			
Kok/Alk	20.0	4.0	16.8
Tab/Alk	7.0	20.0	9.6
Can/Alk	9.0	8.0	8.8
Can/Kok/Alk	7.0	0.0	5.6
Tab/Can/Alk	4.0	4.0	4.0
Kok/Op	3.0	4.0	3.2
Med/Alk	4.0	0.0	3.2
Tab/Kok/Alk	3.0	4.0	3.2
Kok/Op/Alk	3.0	0.0	2.4
Can/Op/Alk	3.0	0.0	2.4
Can/Kok	2.0	4.0	2.4
Can/Stim	1.0	8.0	2.4
Can/Stim/Kok/Alk	2.0	4.0	2.4
Tab/Can/Kok/Alk	2.0	4.0	2.4
Stim/Kok/Alk	1.0	4.0	1.6
Med/Kok/Op	2.0	0.0	1.6
Med/Stim	0.0	8.0	1.6
Can/Kok/Op	2.0	0.0	1.6
Can/Med/Kok/Op/Alk	2.0	0.0	1.6
Tab/Can	2.0	0.0	1.6
Andere Kombinationen	21.0	24.0	21.6
<b>N**</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>125</b>
<i>fehlende Angaben</i>	28	13	41

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozente; Nur eine Kategorie möglich

**T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer**

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*</b>									
täglich	44.6	40.7	16.8	6.7	60.0	0.0	34.3	85.3	100.0
4-6 Tage pro Woche	12.7	8.8	14.3	2.2	0.0	0.0	8.5	2.7	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.8	11.0	26.4	22.2	10.0	0.0	16.4	2.7	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.0	13.2	23.6	26.7	6.7	33.3	17.8	4.0	0.0
kein Konsum	21.8	26.4	18.9	42.2	23.3	66.7	23.0	5.3	0.0
<b>N**</b>	<b>1 593</b>	<b>91</b>	<b>280</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>799</b>	<b>75</b>	<b>1</b>
<i>fehlende Angaben</i>	338	50	84	6	11	1	128	6	16

**T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Frauen**

<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*</b>									
täglich	42.7	35.1	8.5	25.0	66.7	-	40.3	84.3	100.0
4-6 Tage pro Woche	13.5	5.4	17.0	20.0	0.0	-	6.3	4.3	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.5	13.5	27.7	15.0	10.0	-	13.6	1.4	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.3	13.5	19.1	20.0	6.7	-	17.3	5.7	0.0
kein Konsum	21.0	32.4	27.7	20.0	16.7	-	22.5	4.3	0.0
<b>N**</b>	<b>710</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>70</b>	<b>1</b>
<i>fehlende Angaben</i>	147	22	9	4	7	1	39	5	3

**T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2019), Männer und Frauen**

<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*</b>									
täglich	44.0	39.1	15.6	12.3	63.3	0.0	35.5	84.8	100.0
4-6 Tage pro Woche	13.0	7.8	14.7	7.7	0.0	0.0	8.1	3.4	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.0	11.7	26.6	20.0	10.0	0.0	15.9	2.1	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.4	13.3	22.9	24.6	6.7	33.3	17.7	4.8	0.0
kein Konsum	21.6	28.1	20.2	35.4	20.0	66.7	22.9	4.8	0.0
<b>N**</b>	<b>2 303</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>990</b>	<b>145</b>	<b>2</b>
<i>fehlende Angaben</i>	485	72	93	10	18	2	167	11	19

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2019), Männer**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)</b>				
täglich	16.3	61.2	55.6	66.0
4-6 Tage pro Woche	8.1	14.3	0.0	6.2
2-3 Tage pro Woche	17.4	8.2	33.3	12.4
1 Tag pro Woche oder weniger	17.4	8.2	0.0	7.2
nie	40.7	8.2	11.1	8.2
<b>N**</b>	<b>86</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>97</b>
<i>fehlende Angaben</i>	32	14	2	12

**T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2019), Frauen**

<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)</b>				
täglich	10.5	33.3	57.5	47.1
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	12.5	5.9
2-3 Tage pro Woche	10.5	16.7	18.8	14.7
1 Tag pro Woche oder weniger	26.3	0.0	7.5	20.6
nie	52.6	50.0	3.8	11.8
<b>N**</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>34</b>
<i>fehlende Angaben</i>	12	1	5	6

**T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2019), Männer und Frauen**

<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)</b>				
täglich	15.2	58.2	57.3	61.1
4-6 Tage pro Woche	6.7	12.7	11.2	6.1
2-3 Tage pro Woche	16.2	9.1	20.2	13.0
1 Tag pro Woche oder weniger	19.0	7.3	6.7	10.7
nie	42.9	12.7	4.5	9.2
<b>N**</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>89</b>	<b>131</b>
<i>fehlende Angaben</i>	44	15	7	18

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)



**T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer**

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>									
Mittelwert	16.1	24.2	21.0	19.9	29.2	18.0	15.2	15.6	20.2
Standardabweichung	4.1	9.6	6.3	6.7	14.7		2.3	2.7	3.3
1. Quartil	14.0	17.0	17.0	16.0	17.5	18.0	14.0	14.0	18.0
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.5	25.0	18.0	15.0	15.0	20.0
3. Quartil	17.0	28.0	23.0	20.0	35.5	18.0	16.0	18.0	23.0
<b>N*</b>	<b>1 010</b>	<b>75</b>	<b>222</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>621</b>	<b>49</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	921	66	142	17	21	3	306	32	12
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>									
Mittelwert	22.6	27.0	24.7	19.5	28.9	19.0	16.3	17.9	20.3
Standardabweichung	8.7	10.6	7.0	4.3	10.3		2.8	6.5	2.5
1. Quartil	17.0	20.0	20.0	17.0	20.0	19.0	15.0	14.0	18.0
Medianwert	20.0	23.0	24.0	19.0	27.0	19.0	16.0	16.5	20.0
3. Quartil	25.0	30.0	28.0	22.0	35.0	19.0	17.0	19.0	23.0
<b>N*</b>	<b>717</b>	<b>44</b>	<b>103</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>375</b>	<b>40</b>	<b>3</b>
fehlende Angaben	1 214	97	261	30	30	3	552	41	14
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>									
Mittelwert	31.6	26.7	26.1	22.3	34.2	20.0	17.3	21.4	32.1
Standardabweichung	12.8	10.0	7.6	7.2	14.4		4.4	11.1	13.5
1. Quartil	21.0	20.0	20.0	18.0	24.0	20.0	15.0	15.0	18.0
Medianwert	30.0	24.0	25.0	21.0	30.5	20.0	16.0	19.0	31.0
3. Quartil	40.0	31.0	30.0	25.0	42.0	20.0	18.0	20.0	46.0
<b>N*</b>	<b>1 084</b>	<b>75</b>	<b>223</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>558</b>	<b>41</b>	<b>7</b>
fehlende Angaben	847	66	141	17	19	3	369	40	10
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>									
Mittelwert	26.4	5.8	11.2	4.6	21.8	2.2	4.7	13.6	14.8
Standardabweichung	13.4	6.4	8.5	5.5	29.4		6.4	15.9	18.1
1. Quartil	16.2	2.2	4.4	1.1	1.2	2.2	1.3	1.7	0.7
Medianwert	25.1	3.6	10.0	1.9	8.7	2.2	2.3	4.8	10.0
3. Quartil	35.6	5.6	15.9	4.7	55.4	2.2	4.8	20.5	28.8
<b>N*</b>	<b>415</b>	<b>13</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>410</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
fehlende Angaben	290	7	48	8	3	1	182	18	6

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>									
Mittelwert	18.0	21.7	20.9	17.4	31.5	-	15.0	16.1	13.0
Standardabweichung	6.2	7.8	5.7	5.5	12.8	-	2.1	3.5	-
1. Quartil	15.0	17.0	16.0	14.0	21.5	-	14.0	14.0	-
Medianwert	16.0	20.0	19.0	15.5	29.0	-	15.0	16.0	13.0
3. Quartil	19.0	22.0	25.0	19.0	37.5	-	16.0	17.5	-
<b>N*</b>	<b>432</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>56</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	425	26	14	10	21	1	86	19	3
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>									
Mittelwert	27.0	20.8	23.4	19.1	36.7	-	15.8	18.5	-
Standardabweichung	10.2	5.4	6.0	8.7	14.4	-	2.4	4.7	-
1. Quartil	20.0	18.0	19.0	14.0	30.0	-	14.0	15.0	-
Medianwert	25.0	20.5	23.0	15.0	30.5	-	15.0	18.0	-
3. Quartil	33.0	21.0	27.0	22.5	54.0	-	16.0	20.0	-
<b>N*</b>	<b>321</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	536	41	37	16	31	1	145	29	4
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>									
Mittelwert	35.5	23.1	22.8	21.4	34.5	-	16.7	21.5	17.0
Standardabweichung	13.2	8.4	6.3	10.5	12.6	-	4.0	9.0	-
1. Quartil	25.0	18.0	18.0	15.0	26.0	-	15.0	15.0	-
Medianwert	35.0	21.0	21.0	17.0	30.0	-	16.0	18.0	17.0
3. Quartil	44.0	23.0	25.0	19.0	42.0	-	17.0	26.0	-
<b>N*</b>	<b>498</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>49</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	359	29	14	11	15	1	98	26	3
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>									
Mittelwert	27.6	8.4	4.5	4.9	5.2	-	4.2	22.3	5.1
Standardabweichung	13.7	11.5	3.2	5.0	5.5	-	6.8	17.8	-
1. Quartil	17.3	0.5	1.7	1.2	2.0	-	1.0	4.1	-
Medianwert	27.1	4.4	4.3	2.7	3.2	-	1.6	19.8	5.1
3. Quartil	37.9	16.4	6.6	7.9	8.5	-	3.6	39.0	-
<b>N*</b>	<b>173</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	119	4	5	3	4	1	45	15	1

\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>									
Mittelwert	16.7	23.4	21.0	19.2	30.2	18.0	15.1	15.9	19.0
Standardabweichung	4.9	9.1	6.2	6.4	13.7	-	2.2	3.1	4.2
1. Quartil	15.0	17.0	17.0	15.0	20.0	-	14.0	14.0	16.0
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	16.0	19.0
3. Quartil	18.0	26.0	23.0	20.0	35.5	-	16.0	18.0	23.0
<b>N*</b>	<b>1 442</b>	<b>108</b>	<b>264</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>765</b>	<b>105</b>	<b>6</b>
fehlende Angaben	1 346	92	156	27	42	4	392	51	15
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>									
Mittelwert	23.9	25.2	24.5	19.4	31.6	19.0	16.2	18.2	20.3
Standardabweichung	9.4	9.8	6.9	5.7	12.0	-	2.7	5.6	2.5
1. Quartil	18.0	19.0	20.0	15.0	23.0	-	15.0	15.0	18.0
Medianwert	20.0	21.0	23.5	18.0	30.0	19.0	16.0	17.0	20.0
3. Quartil	28.0	29.0	28.0	22.0	35.0	-	16.0	20.0	23.0
<b>N*</b>	<b>1 038</b>	<b>62</b>	<b>122</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>460</b>	<b>86</b>	<b>3</b>
fehlende Angaben	1 750	138	298	46	61	4	697	70	18
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>									
Mittelwert	32.8	25.7	25.6	22.0	34.4	20.0	17.2	21.5	30.3
Standardabweichung	13.0	9.7	7.5	8.1	13.3	-	4.3	10.0	13.6
1. Quartil	22.0	19.0	20.0	17.0	25.0	-	15.0	15.0	17.5
Medianwert	30.0	23.0	25.0	19.0	30.0	20.0	16.0	19.0	27.0
3. Quartil	40.0	30.0	30.0	25.0	42.0	-	17.0	25.0	45.0
<b>N*</b>	<b>1 582</b>	<b>105</b>	<b>265</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>690</b>	<b>90</b>	<b>8</b>
fehlende Angaben	1 206	95	155	28	34	4	467	66	13
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>									
Mittelwert	26.7	6.5	10.3	4.7	12.3	2.2	4.6	18.1	12.8
Standardabweichung	13.5	7.5	8.3	5.1	19.5	-	6.4	17.4	16.2
1. Quartil	16.6	1.7	3.7	1.1	1.2	-	1.2	2.4	1.0
Medianwert	25.6	3.6	8.8	1.9	3.5	2.2	2.2	14.7	5.1
3. Quartil	36.3	6.1	14.0	7.9	13.4	-	4.6	29.8	19.0
<b>N*</b>	<b>588</b>	<b>17</b>	<b>104</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>498</b>	<b>69</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	409	11	53	11	7	2	227	33	7

\* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>				
Mittelwert	22.1	21.4	10.0	15.4
Standardabweichung	6.2	14.7	5.4	9.3
1. Quartil	18.0	14.0	4.0	12.0
Medianwert	20.0	15.0	12.0	13.0
3. Quartil	25.0	29.0	14.0	16.0
<b>N*</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>53</b>
fehlende Angaben	69	46	4	56
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>				
Mittelwert	27.3	16.1	15.3	16.9
Standardabweichung	8.8	4.0	4.1	9.5
1. Quartil	21.0	14.0	12.0	12.0
Medianwert	25.0	15.0	13.0	14.0
3. Quartil	32.0	16.0	20.0	16.0
<b>N*</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>51</b>
fehlende Angaben	96	56	4	58
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>				
Mittelwert	28.0	22.9	15.6	19.7
Standardabweichung	8.5	14.1	4.0	10.9
1. Quartil	20.5	15.0	12.0	14.0
Medianwert	27.0	16.5	14.0	15.0
3. Quartil	33.0	32.0	20.0	20.0
<b>N*</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>63</b>
fehlende Angaben	58	41	4	46
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>				
Mittelwert	11.3	5.7	3.9	6.3
Standardabweichung	9.3	4.2	2.9	7.7
1. Quartil	3.9	2.8	1.7	2.0
Medianwert	8.5	4.9	3.6	3.3
3. Quartil	17.6	6.7	6.1	7.9
<b>N*</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>37</b>
fehlende Angaben	32	24	2	29

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>				
Mittelwert	22.8	42.0	15.5	21.2
Standardabweichung	11.2	29.7	5.2	11.6
1. Quartil	18.0	21.0	14.0	15.0
Medianwert	19.5	42.0	15.5	16.0
3. Quartil	26.5	63.0	17.0	28.0
<b>N*</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>17</b>
fehlende Angaben	23	5	33	23
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>				
Mittelwert	26.4	42.5	19.3	21.3
Standardabweichung	6.3	29.0	8.3	10.4
1. Quartil	21.0	22.0	15.0	14.0
Medianwert	26.0	42.5	16.0	18.5
3. Quartil	30.0	63.0	20.0	25.0
<b>N*</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>18</b>
fehlende Angaben	26	5	38	22
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>				
Mittelwert	32.4	42.5	20.4	23.7
Standardabweichung	15.3	29.0	8.6	12.4
1. Quartil	23.0	22.0	16.0	15.0
Medianwert	27.0	42.5	17.0	20.0
3. Quartil	46.0	63.0	23.5	28.0
<b>N*</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>23</b>
fehlende Angaben	20	5	29	17
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>				
Mittelwert	18.0	2.1	6.8	6.4
Standardabweichung	21.7	2.7	9.3	6.2
1. Quartil	6.0	0.2	1.0	1.7
Medianwert	8.9	2.1	3.4	3.8
3. Quartil	29.9	4.0	8.4	10.2
<b>N*</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>11</b>
fehlende Angaben	14	0	17	11

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

### T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2019), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer und Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>				
Mittelwert	22.2	23.6	14.8	16.8
Standardabweichung	7.0	16.9	5.5	10.1
1. Quartil	18.0	14.0	14.0	12.0
Medianwert	20.0	15.0	15.0	14.0
3. Quartil	25.0	30.0	17.0	18.0
<b>N*</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>70</b>
fehlende Angaben	92	51	37	79
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>				
Mittelwert	27.1	22.0	18.8	18.1
Standardabweichung	8.3	15.9	7.9	9.9
1. Quartil	21.0	15.0	15.0	13.0
Medianwert	25.0	15.0	16.0	15.0
3. Quartil	32.0	22.0	20.0	20.0
<b>N*</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>69</b>
fehlende Angaben	122	61	42	80
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>				
Mittelwert	28.6	24.5	19.8	20.7
Standardabweichung	9.8	15.7	8.4	11.4
1. Quartil	21.0	15.0	15.0	14.0
Medianwert	27.0	17.0	17.0	15.5
3. Quartil	33.0	33.0	23.0	23.0
<b>N*</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>86</b>
fehlende Angaben	78	46	33	63
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>				
Mittelwert	11.9	5.2	6.4	6.3
Standardabweichung	10.8	4.2	8.8	7.3
1. Quartil	3.9	2.4	1.0	1.9
Medianwert	8.5	4.0	3.4	3.3
3. Quartil	17.6	6.7	7.5	8.2
<b>N*</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>48</b>
fehlende Angaben	46	24	19	40

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2019)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	13.1	7.7	11.5	3.4	9.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	57.4	53.8	56.3	11.0	7.0	10.5	16.7	18.2	17.2	98.3	97.3	98.1	3.4	4.3	3.8
essen/trinken	4.9	11.5	6.9	1.9	2.3	2.0	33.3	27.3	31.0	0.9	1.1	1.0	96.6	91.3	94.2
sniffen	24.6	26.9	25.3	82.5	81.4	82.4	50.0	36.4	44.8	0.5	0.5	0.5	0.0	4.3	1.9
anderes	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	18.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>87</b>	<b>263</b>	<b>43</b>	<b>306</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>759</b>	<b>186</b>	<b>945</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>52</b>
<i>fehlende Angaben</i>	51	22	73	85	10	95	10	4	14	168	44	212	4	6	10

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Injektion im Leben*</b>																
ja	3.6	3.6	3.6	30.4	23.7	28.5	6.7	19.5	8.7	1.0	1.7	1.1	4.0	3.8	3.9	154
nie	94.8	95.0	94.9	63.0	63.2	63.1	91.5	78.0	89.4	96.3	96.1	96.3	94.1	94.0	94.0	3 696
möchte nicht antworten	1.6	1.5	1.5	6.5	13.2	8.5	1.8	2.4	1.9	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	2.0	80
<b>N**</b>	<b>1 394</b>	<b>616</b>	<b>2 010</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>130</b>	<b>224</b>	<b>41</b>	<b>265</b>	<b>736</b>	<b>178</b>	<b>914</b>	<b>2 822</b>	<b>1 108</b>	<b>3 930</b>	<b>3 930</b>
fehlende Angaben	537	241	778	49	21	70	140	15	155	191	52	243	1 041	399	1 440	1 440
<b>Injektion in den letzten 12 Monaten*</b>																
ja	2.1	2.1	2.1	16.1	26.3	18.7	11.8	45.5	17.7	0.0	0.0	0.0	3.9	6.2	4.5	33
nein	97.9	97.9	97.9	83.9	73.7	81.3	88.2	54.5	82.3	100.0	100.0	100.0	96.1	93.8	95.5	707
<b>N**</b>	<b>234</b>	<b>96</b>	<b>330</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>119</b>	<b>37</b>	<b>156</b>	<b>545</b>	<b>195</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
fehlende Angaben	1 697	761	2 458	85	40	125	313	45	358	808	193	1 001	3 318	1 312	4 630	4 630
<b>Injektion in den letzten 30 Tagen*</b>																
ja	1.4	2.1	1.6	12.5	21.1	14.9	8.3	22.2	10.5	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	3.0	21
nein	98.6	97.9	98.4	87.5	78.9	85.1	91.7	77.8	89.5	100.0	100.0	100.0	97.5	95.8	97.0	688
<b>N**</b>	<b>220</b>	<b>95</b>	<b>315</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>152</b>	<b>518</b>	<b>191</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
fehlende Angaben	1 711	762	2 473	93	40	133	316	47	363	811	194	1 005	3 345	1 316	4 661	4 661
<b>Austausch von Injektionsmaterial im Leben***</b>																
ja	42.9	60.0	47.4	8.3	0.0	6.7	28.6	75.0	45.5	33.3	-	33.3	28.2	50.0	33.3	17
nein	57.1	40.0	52.6	83.3	100.0	86.7	71.4	25.0	54.5	66.7	-	66.7	69.2	50.0	64.7	33
möchte nicht antworten	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0	-	0.0	2.6	0.0	2.0	1
<b>N**</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
fehlende Angaben	35	17	52	16	6	22	8	4	12	4	3	7	72	30	102	102
<b>Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****</b>																
ja	0.0	9.1	3.4	20.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2.9	5.3	3.7	2
nein	100.0	90.9	96.6	80.0	100.0	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	97.1	94.7	96.3	52
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
fehlende Angaben	31	11	42	23	5	28	11	5	16	5	2	7	76	23	99	99
<b>Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****</b>																
ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>N**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	49	22	71	28	9	37	15	8	23	7	3	10	111	42	153	153

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich



## T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Alter bei der ersten Injektion*</b>																
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	4.0	16.7	0.0	10.0	33.3	0.0	25.0	3.4	4.5	3.7	3
15-16	3.8	10.0	5.6	22.2	14.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	8.5	13.6	9.9	8
17-18	34.6	30.0	33.3	27.8	14.3	24.0	33.3	50.0	40.0	33.3	0.0	25.0	30.5	27.3	29.6	24
19-20	7.7	10.0	8.3	22.2	28.6	24.0	33.3	25.0	30.0	0.0	0.0	0.0	15.3	18.2	16.0	13
21-25	26.9	30.0	27.8	11.1	14.3	12.0	16.7	25.0	20.0	33.3	0.0	25.0	25.4	22.7	24.7	20
26-30	15.4	10.0	13.9	5.6	14.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	9.1	8.6	7
30-39	7.7	10.0	8.3	11.1	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	4.5	6.2	5
ab 40	3.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.2	1
<b>N**</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<i>fehlende Angaben</i>	24	12	36	10	2	12	9	4	13	4	2	6	53	20	73	73

\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer

## Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>									
Alkohol	-	26.3	29.3	14.0	30.8	0.0	11.6	12.8	17.6
Heroin	1.0	4.4	3.4	4.0	2.6	0.0	0.3	0.0	5.9
Methadon	0.2	8.0	0.3	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	11.8
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.1	2.9	0.3	2.0	2.6	0.0	0.4	0.0	5.9
Kokain-Pulver	5.9	27.7	2.0	20.0	15.4	33.3	7.3	0.0	5.9
Crack-Kokain	0.2	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.1	5.1	4.2	6.0	2.6	0.0	3.5	0.0	0.0
Metamphetamine	0.1	2.9	1.4	10.0	2.6	0.0	0.4	0.0	5.9
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.9	3.6	6.2	8.0	0.0	33.3	3.4	1.3	5.9
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
Barbiturate	0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.1	15.3	3.1	2.0	2.6	0.0	2.0	2.6	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	2.5	2.0	0.0	0.0	1.5	1.3	5.9
Ketamin	0.1	0.7	0.6	0.0	2.6	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Cannabis	7.4	27.0	23.1	18.0	15.4	0.0	-	17.9	5.9
Tabak	14.4	16.1	17.7	10.0	15.4	0.0	12.8	-	0.0
andere Substanz(en)	0.2	1.5	1.1	2.0	5.1	0.0	0.2	1.3	0.0
Glücksspielsucht	0.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	5.1	5.9
Essstörungen	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	78.6	41.6	52.7	66.0	43.6	66.7	78.5	74.4	52.9
<b>N**</b>	<b>1 789</b>	<b>137</b>	<b>355</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>895</b>	<b>78</b>	<b>17</b>
<i>fehlende Angaben</i>	142	4	9	1	2	1	32	3	0

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>									
Alkohol	-	16.1	16.7	21.7	20.0	0.0	9.9	12.2	0.0
Heroin	1.1	1.8	5.6	0.0	5.7	0.0	0.4	0.0	25.0
Methadon	0.4	8.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.4	1.8	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.9	21.4	3.7	21.7	14.3	0.0	5.4	0.0	50.0
Crack-Kokain	0.0	3.6	1.9	0.0	2.9	0.0	0.4	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	5.4	5.6	0.0	2.9	0.0	6.3	1.4	0.0
Metamphetamine	0.4	3.6	0.0	0.0	2.9	0.0	0.9	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.4	1.8	3.7	13.0	0.0	0.0	6.3	0.0	25.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.4	10.7	7.4	4.3	0.0	0.0	1.3	2.7	0.0
GHB/GBL	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	1.8	1.9	8.7	0.0	0.0	2.7	0.0	25.0
Ketamin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	25.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	4.3	0.0	100.0	0.4	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Cannabis	4.0	12.5	24.1	21.7	8.6	0.0	-	9.5	25.0
Tabak	10.9	12.5	18.5	13.0	14.3	0.0	12.1	-	25.0
andere Substanz(en)	0.5	5.4	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
Essstörungen	1.1	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	84.3	51.8	61.1	65.2	54.3	0.0	79.4	78.4	50.0
<b>N**</b>	<b>795</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>223</b>	<b>74</b>	<b>4</b>
<i>fehlende Angaben</i>	62	3	2	1	2	0	7	1	0

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen

## Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>									
Alkohol	-	23.3	27.6	16.4	25.7	0.0	11.3	12.5	14.3
Heroin	1.0	3.6	3.7	2.7	4.1	0.0	0.4	0.0	9.5
Methadon	0.2	8.3	0.5	0.0	2.7	0.0	0.1	0.7	9.5
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.2	2.6	0.2	1.4	2.7	0.0	0.4	0.0	4.8
Kokain-Pulver	5.0	25.9	2.2	20.5	14.9	25.0	6.9	0.0	14.3
Crack-Kokain	0.2	2.1	1.5	0.0	1.4	0.0	0.4	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.1	5.2	4.4	4.1	2.7	0.0	4.0	0.7	0.0
Metamphetamine	0.2	3.1	1.2	6.8	2.7	0.0	0.5	0.0	4.8
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	3.1	5.9	9.6	0.0	25.0	3.9	0.7	9.5
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8
Barbiturate	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.5	14.0	3.7	2.7	1.4	0.0	1.9	2.6	0.0
GHB/GBL	0.0	0.5	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.5	2.4	4.1	0.0	0.0	1.7	0.7	9.5
Ketamin	0.1	0.5	0.5	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	4.8
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.2	2.7	0.0	25.0	0.5	0.7	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Cannabis	6.3	22.8	23.2	19.2	12.2	0.0	-	13.8	9.5
Tabak	13.4	15.0	17.8	11.0	14.9	0.0	12.7	-	4.8
andere Substanz(en)	0.3	2.6	1.0	1.4	4.1	0.0	0.2	0.7	0.0
Glücksspielsucht	0.3	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	4.8
Essstörungen	0.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	80.4	44.6	53.8	65.8	48.6	50.0	78.7	76.3	52.4
<b>N**</b>	<b>2 584</b>	<b>193</b>	<b>409</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>1 118</b>	<b>152</b>	<b>21</b>
<i>fehlende Angaben</i>	204	7	11	2	4	1	39	4	0

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer

## Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>				
Alkohol	3.5	3.2	10.0	1.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.6	0.0	0.0	1.9
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.8	4.8	10.0	0.0
Tabak	3.5	4.8	0.0	1.0
andere Substanz(en)	0.0	1.6	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	5.3	-	10.0	6.7
Essstörungen	0.0	1.6	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	1.6	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	87.7	87.1	90.0	91.3
<b>N**</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>104</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>				
Alkohol	10.7	14.3	4.9	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	2.4	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.6	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	1.2	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	2.4	0.0
Tabak	3.6	14.3	0.0	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	2.8
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	2.8
Computer-bzw. Internetsucht	3.6	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	-	2.8
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	78.6	85.7	93.9	91.7
<b>N**</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>82</b>	<b>36</b>
<i>fehlende Angaben</i>	3	0	3	4

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2019), Männer und Frauen

## Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>				
Alkohol	4.9	4.3	5.4	0.7
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.1	0.0	2.2	1.4
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.7	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	1.1	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.4	4.3	3.3	0.0
Tabak	3.5	5.8	0.0	0.7
andere Substanz(en)	0.0	1.4	0.0	0.7
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.7
Computer-bzw. Internetsucht	4.9	-	1.1	5.0
Essstörungen	0.0	1.4	-	0.7
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	1.4	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	85.9	87.0	93.5	91.4
<b>N**</b>	<b>142</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>140</b>
<i>fehlende Angaben</i>	7	1	4	9

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
<b>Alkohol*</b>	<b>Opiode</b>			<b>Kokain</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>									
täglich	22.7	66.7	32.1	22.2	14.3	21.6	11.0	10.5	10.9	0.0	25.0	8.3	0.0	20.0	8.3	15.6	25.0	17.4	48			
4-6 Tage pro Woche	13.6	0.0	10.7	21.0	14.3	20.5	6.6	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	16.7	13.4	1.9	11.2	31			
2-3 Tage pro Woche	27.3	16.7	25.0	24.7	57.1	27.3	27.5	15.8	25.5	25.0	0.0	16.7	28.6	40.0	33.3	26.8	21.2	25.7	71			
1 Tag pro Woche oder weniger	18.2	0.0	14.3	19.8	0.0	18.2	30.8	52.6	34.5	25.0	50.0	33.3	28.6	40.0	33.3	25.9	34.6	27.5	76			
kein Konsum	18.2	16.7	17.9	12.3	14.3	12.5	24.2	21.1	23.6	50.0	25.0	41.7	14.3	0.0	8.3	18.3	17.3	18.1	50			
<b>N**</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>224</b>	<b>52</b>	<b>276</b>	<b>276</b>			
fehlende Angaben	119	53	172	283	49	332	836	211	1 047	33	33	66	294	158	452	3 896	2 280	6 176	6 176			
<b>Opiode*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Kokain</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>									
täglich	23.1	12.5	19.0	33.3	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	26.9	8.3	21.1	8			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	25.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	100.0	100.0	-	-	-	0.0	25.0	7.9	3			
1 Tag pro Woche oder weniger	7.7	0.0	4.8	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	7.7	0.0	5.3	2			
kein Konsum	69.2	62.5	66.7	55.6	100.0	63.6	100.0	100.0	100.0	-	0.0	0.0	-	-	-	65.4	66.7	65.8	25			
<b>N**</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>38</b>			
fehlende Angaben	1 918	849	2 767	355	54	409	925	229	1 154	41	36	77	301	163	464	4 094	2 320	6 414	6 414			
<b>Kokain*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Opiode</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>									
täglich	8.4	0.0	7.0	16.7	0.0	12.5	1.9	8.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	2.4	5.8	13			
4-6 Tage pro Woche	2.4	0.0	2.0	4.2	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.2	5			
2-3 Tage pro Woche	9.6	23.5	12.0	20.8	25.0	21.9	5.6	0.0	4.5	40.0	0.0	33.3	60.0	0.0	42.9	13.8	14.3	13.9	31			
1 Tag pro Woche oder weniger	31.3	11.8	28.0	33.3	50.0	37.5	27.8	50.0	31.8	20.0	0.0	16.7	40.0	50.0	42.9	30.9	33.3	31.4	70			
kein Konsum	48.2	64.7	51.0	25.0	12.5	21.9	64.8	41.7	60.6	20.0	100.0	33.3	0.0	50.0	14.3	46.4	47.6	46.6	104			
<b>N**</b>	<b>83</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>181</b>	<b>42</b>	<b>223</b>	<b>223</b>			
fehlende Angaben	1 848	840	2 688	117	51	168	873	218	1 091	36	36	72	296	161	457	3 939	2 290	6 229	6 229			
<b>Cannabis*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Opiode</b>			<b>Kokain</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>									
täglich	36.7	29.0	35.1	53.6	80.0	57.6	43.9	70.0	47.4	60.0	33.3	50.0	50.0	0.0	33.3	41.6	41.9	41.7	128			
4-6 Tage pro Woche	4.2	12.9	6.0	10.7	0.0	9.1	10.6	0.0	9.2	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	6.9	6.5	6.8	21			
2-3 Tage pro Woche	18.3	16.1	17.9	10.7	20.0	12.1	9.1	20.0	10.5	0.0	33.3	12.5	0.0	50.0	16.7	13.5	17.7	14.3	44			
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	16.1	9.9	3.6	0.0	3.0	16.7	10.0	15.8	0.0	33.3	12.5	25.0	50.0	33.3	10.2	19.4	12.1	37			
kein Konsum	32.5	25.8	31.1	21.4	0.0	18.2	19.7	0.0	17.1	20.0	0.0	12.5	25.0	0.0	16.7	27.8	14.5	25.1	77			
<b>N**</b>	<b>120</b>	<b>31</b>	<b>151</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>245</b>	<b>62</b>	<b>307</b>	<b>307</b>			
fehlende Angaben	1 811	826	2 637	113	54	167	298	46	344	36	34	70	297	161	458	3 875	2 270	6 145	6 145			

\*Als weiteres Problem. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein



## T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
<b>andere Stimulanzien*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Opioide</b>			<b>Kokain und Derivate</b>			<b>Cannabis</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>									
täglich	5.6	0.0	3.8	16.7	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.3	7.1	9.3	-	-	-	7.5	3.8	6.5	6			
4-6 Tage pro Woche	5.6	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	-	-	-	3.0	0.0	2.2	2			
2-3 Tage pro Woche	11.1	0.0	7.7	0.0	33.3	11.1	15.4	100.0	21.4	3.4	0.0	2.3	-	-	-	9.0	7.7	8.6	8			
1 Tag pro Woche oder weniger	27.8	12.5	23.1	50.0	0.0	33.3	23.1	0.0	21.4	13.8	21.4	16.3	-	-	-	22.4	15.4	20.4	19			
kein Konsum	50.0	87.5	61.5	33.3	66.7	44.4	61.5	0.0	57.1	69.0	71.4	69.8	-	-	-	58.2	73.1	62.4	58			
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>93</b>	<b>93</b>			
fehlende Angaben	1 913	849	2 762	135	56	191	351	55	406	898	216	1 114	301	163	464	4 053	2 306	6 359	6 359			
<b>Hypnotika/Sedativa*</b>																						
täglich	100.0	-	100.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	25.0	0.0	20.0	1			
4-6 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	100.0	20.0	1			
2-3 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	66.7	-	66.7	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	50.0	0.0	40.0	2			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0			
kein Konsum	0.0	-	0.0	33.3	-	33.3	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	25.0	0.0	20.0	1			
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
fehlende Angaben	1 930	857	2 787	138	59	197	364	55	419	927	230	1 157	301	163	464	4 116	2 331	6 447	6 447			
<b>Halluzinogene*</b>																						
täglich	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.7	0.0	2.6	1			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.9	-	-	-	3.7	0.0	2.6	1			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.7	0.0	2.6	1			
1 Tag pro Woche oder weniger	16.7	0.0	12.5	-	0.0	0.0	25.0	100.0	33.3	9.1	33.3	17.6	-	-	-	14.8	25.0	17.9	7			
kein Konsum	83.3	100.0	87.5	-	100.0	100.0	50.0	0.0	44.4	81.8	66.7	76.5	-	-	-	74.1	75.0	74.4	29			
<b>N**</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>39</b>			
fehlende Angaben	1 925	855	2 780	141	58	199	356	55	411	916	224	1 140	301	163	464	4 093	2 320	6 413	6 413			
<b>andere Substanzen*</b>																						
täglich	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	33.3	0.0	25.0	-	-	-	25.0	50.0	33.3	2			
4-6 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	33.3	100.0	50.0	-	-	-	25.0	50.0	33.3	2			
1 Tag pro Woche oder weniger	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	33.3	0.0	25.0	-	-	-	50.0	0.0	33.3	2			
kein Konsum	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0			
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			
fehlende Angaben	1 930	857	2 787	141	59	200	364	56	420	924	229	1 153	301	163	464	4 116	2 330	6 446	6 446			

\*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
<b>Häufigkeit des Alkoholkonsums*</b>																
nie	8.7	7.8	8.4	11.3	17.6	12.9	15.0	13.6	14.8	13.1	29.4	16.2	13.7	15.0	14.1	370
1-mal pro Monat oder weniger	3.1	6.0	4.0	15.1	29.4	18.6	11.0	13.6	11.4	27.9	28.4	28.0	10.9	12.9	11.5	302
2-4-mal pro Monat	6.3	6.0	6.2	30.2	11.8	25.7	22.8	22.7	22.8	41.2	29.4	39.0	17.7	12.5	16.2	427
2-3-mal pro Woche	16.2	17.3	16.5	18.9	29.4	21.4	24.4	36.4	26.2	13.1	5.9	11.8	16.1	16.1	16.1	423
4-mal oder mehr pro Woche	65.7	63.0	64.9	24.5	11.8	21.4	26.8	13.6	24.8	4.6	6.9	5.0	41.6	43.5	42.1	1 108
<b>N**</b>	<b>1 056</b>	<b>486</b>	<b>1 542</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	<b>149</b>	<b>434</b>	<b>102</b>	<b>536</b>	<b>1 878</b>	<b>752</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>
<i>fehlende Angaben</i>	875	371	1 246	88	42	130	237	34	271	493	128	621	1 985	755	2 740	2 740
<b>Anzahl Standarddrinks pro Tag***</b>																
1 oder 2	5.5	8.6	6.5	46.7	30.8	43.1	39.6	44.4	40.3	45.3	54.5	46.8	21.3	22.0	21.5	459
3 oder 4	18.0	20.6	18.8	28.9	38.5	31.0	24.8	50.0	28.6	36.3	28.8	35.0	23.6	23.4	23.5	501
5 oder 6	24.3	25.8	24.8	6.7	15.4	8.6	14.9	0.0	12.6	10.8	12.1	11.0	19.6	20.9	20.0	426
7 bis 9	21.1	24.1	22.1	4.4	0.0	3.4	12.9	5.6	11.8	4.4	4.5	4.4	14.8	18.3	15.8	337
10 oder mehr	31.1	20.9	27.8	13.3	15.4	13.8	7.9	0.0	6.7	3.2	0.0	2.7	20.7	15.5	19.2	409
<b>N**</b>	<b>913</b>	<b>431</b>	<b>1 344</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>18</b>	<b>119</b>	<b>342</b>	<b>66</b>	<b>408</b>	<b>1 524</b>	<b>608</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>
<i>fehlende Angaben</i>	1 018	426	1 444	96	46	142	263	38	301	585	164	749	2 339	899	3 238	3 238
<b>Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***</b>																
nie	11.3	13.3	11.9	43.5	46.7	44.3	32.4	42.1	33.8	50.3	67.0	53.6	27.8	31.1	28.7	677
weniger als 1-mal pro Monat	8.4	12.2	9.6	23.9	26.7	24.6	20.7	21.1	20.8	32.3	23.9	30.7	16.0	15.5	15.8	373
1-mal pro Monat	12.5	16.5	13.8	8.7	6.7	8.2	14.4	5.3	13.1	11.0	4.5	9.8	11.8	12.2	11.9	280
1-mal pro Woche	28.8	21.7	26.6	13.0	20.0	14.8	22.5	31.6	23.8	5.0	2.3	4.4	20.2	17.1	19.3	455
fast jeden Tag	39.0	36.2	38.1	10.9	0.0	8.2	9.9	0.0	8.5	1.4	2.3	1.6	24.2	24.2	24.2	570
<b>N**</b>	<b>966</b>	<b>442</b>	<b>1 408</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>130</b>	<b>362</b>	<b>88</b>	<b>450</b>	<b>1 676</b>	<b>679</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>
<i>fehlende Angaben</i>	965	415	1 380	95	44	139	253	37	290	565	142	707	2 187	828	3 015	3 015

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Häufigkeit des Tabakkonsums*</b>																
nie	36.9	46.4	39.9	22.2	15.8	20.3	18.2	22.7	18.9	24.1	26.7	24.6	33.1	42.0	35.7	840
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	4.9	8.6	5.7	1.9	3.0	2.3	53
2-3 Tage pro Woche	1.2	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	4.9	9.5	5.9	2.2	1.9	2.1	49
4-6 Tage pro Woche	0.7	0.5	0.7	0.0	5.3	1.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	3.0	1.6	0.9	1.4	33
einmal täglich	1.7	1.6	1.7	2.2	5.3	3.1	1.7	0.0	1.4	4.2	3.4	4.1	2.4	1.7	2.2	52
mehrmals täglich	58.6	49.3	55.7	75.6	73.7	75.0	78.5	77.3	78.3	58.3	50.9	56.7	58.7	50.6	56.3	1 323
<b>N**</b>	<b>818</b>	<b>375</b>	<b>1 193</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>121</b>	<b>22</b>	<b>143</b>	<b>448</b>	<b>116</b>	<b>564</b>	<b>1 652</b>	<b>698</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
fehlende Angaben	1 113	482	1 595	96	40	136	243	34	277	479	114	593	2 211	809	3 020	3 020
<b>Anzahl Zigaretten pro Tag***</b>																
0 bis 10	16.6	20.8	17.7	22.9	37.5	27.5	25.0	7.1	22.5	66.4	66.7	66.5	34.6	35.1	34.8	480
11 bis 20	48.2	53.9	49.8	57.1	43.8	52.9	50.0	64.3	52.0	26.1	23.1	25.5	40.9	42.5	41.3	571
21 bis 30	24.8	16.3	22.5	14.3	12.5	13.7	21.6	21.4	21.6	6.5	10.3	7.3	17.8	15.0	17.0	235
31 und mehr	10.4	9.0	10.0	5.7	6.3	5.9	3.4	7.1	3.9	1.0	0.0	0.8	6.7	7.4	6.9	95
<b>N**</b>	<b>471</b>	<b>178</b>	<b>649</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>88</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>307</b>	<b>78</b>	<b>385</b>	<b>1 014</b>	<b>367</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>
fehlende Angaben	45	23	68	0	0	0	11	3	14	33	7	40	91	38	129	129

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

## T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Konsumziel*</b>									
definitive Abstinenz	28.6	82.5	72.2	37.5	80.0	0.0	39.8	50.0	70.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	23.2	0.0	6.2	0.0	10.0	100.0	13.8	5.6	0.0
kontrollierter Konsum	34.9	5.0	10.3	25.0	0.0	0.0	19.5	22.2	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.0	2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.6	10.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.2	7.5	10.3	37.5	10.0	0.0	20.3	16.7	10.0
anderes	1.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	10.0
<b>N**</b>	<b>573</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>18</b>	<b>10</b>
fehlende Angaben	1 358	101	267	43	31	3	804	63	7

## T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Frauen

<b>Konsumziel*</b>									
definitive Abstinenz	33.3	58.3	90.9	50.0	33.3	-	51.9	54.5	100.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	7.4	9.1	0.0
kontrollierter Konsum	37.4	33.3	0.0	0.0	33.3	-	25.9	27.3	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	3.7	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	7.8	8.3	9.1	50.0	33.3	-	11.1	0.0	0.0
anderes	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	9.1	0.0
<b>N**</b>	<b>243</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	614	47	45	22	31	1	203	64	3

## T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2019), Männer und Frauen

<b>Konsumziel*</b>									
definitive Abstinenz	30.0	76.9	74.1	40.0	62.5	0.0	42.0	51.7	72.7
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.9	0.0	5.6	0.0	6.3	100.0	12.7	6.9	0.0
kontrollierter Konsum	35.7	11.5	9.3	20.0	12.5	0.0	20.7	24.1	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.2	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.3	3.4	9.1
bis jetzt nicht festgelegt	10.2	7.7	10.2	40.0	18.8	0.0	18.7	10.3	9.1
anderes	1.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	9.1
<b>N**</b>	<b>816</b>	<b>52</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>29</b>	<b>11</b>
fehlende Angaben	1 972	148	312	65	62	4	1 007	127	10

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T24a Psychische Probleme im Leben (2019), Männer

## Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>										
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	25.2	22.0	39.7	12.5	27.3	0.0	18.4	27.8	16.7	
schwere Angst- und Spannungszustände	22.9	29.3	28.8	12.5	54.5	50.0	20.2	16.7	33.3	
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	8.3	14.6	11.0	0.0	9.1	0.0	9.6	5.6	16.7	
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	8.5	17.1	17.8	12.5	9.1	0.0	12.3	11.1	16.7	
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	0.5	14.6	5.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	9.2	7.3	6.8	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	8.3	
Halluzinationen	1.7	7.3	2.7	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	8.3	
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	8.3	7.3	16.4	0.0	36.4	0.0	6.1	16.7	0.0	
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	22.4	24.4	19.2	25.0	45.5	0.0	14.0	27.8	33.3	
ernsthafte Suizidgedanken	8.5	9.8	9.6	25.0	27.3	0.0	7.0	16.7	8.3	
Suizidversuche	2.1	7.3	5.5	0.0	9.1	0.0	2.6	0.0	0.0	
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.0	4.9	5.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	
keine	43.2	51.2	39.7	37.5	9.1	50.0	57.9	44.4	25.0	
<b>N**</b>	<b>424</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 507</i>	<i>100</i>	<i>291</i>	<i>43</i>	<i>30</i>	<i>2</i>	<i>813</i>	<i>63</i>	<i>5</i>	

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T24b Psychische Probleme im Leben (2019), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	44.6	38.5	81.8	100.0	50.0	-	29.6	50.0	33.3
schwere Angst- und Spannungszustände	29.9	46.2	45.5	50.0	83.3	-	25.9	50.0	66.7
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	13.6	7.7	9.1	50.0	16.7	-	7.4	20.0	33.3
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.5	7.7	18.2	50.0	16.7	-	11.1	20.0	33.3
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.6	7.7	0.0	0.0	16.7	-	11.1	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	8.2	7.7	0.0	0.0	0.0	-	7.4	10.0	0.0
Halluzinationen	3.3	15.4	9.1	0.0	0.0	-	3.7	20.0	33.3
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	10.9	15.4	9.1	0.0	16.7	-	7.4	0.0	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	37.0	46.2	36.4	50.0	33.3	-	25.9	70.0	33.3
ernsthafte Suizidgedanken	10.9	7.7	0.0	0.0	33.3	-	7.4	40.0	0.0
Suizidversuche	3.8	7.7	9.1	0.0	33.3	-	3.7	10.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	5.4	7.7	0.0	0.0	0.0	-	3.7	0.0	0.0
keine	26.6	38.5	9.1	0.0	16.7	-	40.7	10.0	33.3
<b>N**</b>	<b>184</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
<i>fehlende Angaben</i>	673	46	45	22	31	1	203	65	1

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T24c Psychische Probleme im Leben (2019), Männer und Frauen

## Männer &amp; Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	31.1	25.9	45.2	30.0	35.3	0.0	20.6	35.7	20.0
schwere Angst- und Spannungszustände	25.0	33.3	31.0	20.0	64.7	50.0	21.3	28.6	40.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	9.9	13.0	10.7	10.0	11.8	0.0	9.2	10.7	20.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	9.7	14.8	17.9	20.0	11.8	0.0	12.1	14.3	20.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	0.8	13.0	4.8	0.0	5.9	0.0	2.8	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	8.9	7.4	6.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.6	6.7
Halluzinationen	2.1	9.3	3.6	0.0	0.0	0.0	2.1	7.1	13.3
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	9.0	9.3	15.5	0.0	29.4	0.0	6.4	10.7	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	26.8	29.6	21.4	30.0	41.2	0.0	16.3	42.9	33.3
ernsthafte Suizidgedanken	9.2	9.3	8.3	20.0	29.4	0.0	7.1	25.0	6.7
Suizidversuche	2.6	7.4	6.0	0.0	17.6	0.0	2.8	3.6	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.4	5.6	4.8	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
keine	38.2	48.1	35.7	30.0	11.8	50.0	54.6	32.1	26.7
<b>N**</b>	<b>608</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>141</b>	<b>28</b>	<b>15</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2 180</i>	<i>146</i>	<i>336</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	<i>3</i>	<i>1 016</i>	<i>128</i>	<i>6</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2019)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
<b>Beziehung zur Drittperson*</b>				
Mutter/Vater	37.9	37.6	37.7	406
Tochter/Sohn	14.8	10.7	11.7	126
Schwester/Bruder	6.3	5.0	5.3	57
Ehe-/LebenspartnerIn	28.5	39.8	37.1	400
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	1.2	2.7	2.3	25
KollegIn/FreundIn	4.7	1.2	2.0	22
ArbeitgeberIn/LehrerIn	2.3	0.6	1.0	11
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.1	0.1	1
anderes	4.3	2.3	2.8	30
<b>N**</b>	<b>256</b>	<b>822</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>
<i>fehlende Angaben</i>	1	3	4	4

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)



## T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2019)

Angehörige		
	Total	
	%	N
<b>Hauptproblem der Drittperson*</b>		
Alkohol	55.1	331
Heroin	1.2	7
Methadon	0.0	0
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.0	0
andere Opioide	0.3	2
Kokain-Pulver	9.7	58
Crack-Kokain	0.3	2
anderer Kokain-Typ	0.0	0
Amphetamine	1.2	7
Metamphetamine	0.2	1
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	4
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.2	1
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.2	1
GHB/GBL	0.2	1
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1
LSD	0.2	1
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.2	1
Cannabis	20.5	123
Tabak	0.3	2
andere Substanz(en)	1.0	6
Glücksspielsucht	1.8	11
Computer-bzw. Internetsucht	5.2	31
Essstörungen	0.2	1
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.5	9
<b>N**</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>481</i>	<i>481</i>

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Geschlecht*</b>																			
Männer	69.9			74.5			85.2			82.7			24.2			65.4 4 084			
Frauen	30.1			25.5			14.8			17.3			75.8			34.6 2 160			
Geschlecht nicht bekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0 0			
<b>N**</b>	<b>1 957</b>	<b>843</b>	<b>2 800</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>242</b>	<b>758</b>	<b>1 000</b>	<b>4 084</b>	<b>2 160</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>
<b>Alter (in Jahren)*</b>																			
bis 14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.9	3.5	1.7	0.5	0.8	1.2	1.2	1.2	75
15-19	1.1	1.4	1.2	0.7	2.0	1.0	1.6	9.3	2.7	59.2	59.7	59.3	3.0	2.1	2.3	16.3	8.9	13.8	857
20-24	3.5	2.1	3.1	4.7	5.9	5.0	11.3	13.0	11.5	12.5	11.5	12.4	4.2	4.8	4.7	7.1	5.1	6.4	400
25-29	7.5	4.3	6.5	6.7	7.8	7.0	18.7	22.2	19.2	8.7	4.7	8.0	6.3	6.1	6.2	9.2	6.2	8.2	511
30-34	9.6	6.9	8.8	15.4	21.6	17.0	20.3	18.5	20.1	5.9	4.7	5.7	5.9	8.2	7.7	9.8	8.1	9.2	575
35-39	11.3	10.9	11.2	14.8	13.7	14.5	21.9	16.7	21.2	4.9	5.8	5.1	7.2	10.8	9.9	10.4	10.5	10.4	650
40-44	11.0	9.6	10.6	13.4	13.7	13.5	11.9	7.4	11.3	2.4	1.6	2.3	7.6	11.7	10.7	8.8	9.4	9.0	562
45-49	12.9	11.5	12.5	16.8	2.0	13.0	5.5	1.9	4.9	2.0	1.6	1.9	13.9	17.6	16.7	9.4	11.6	10.2	633
50-54	14.7	16.7	15.3	11.4	19.6	13.5	5.8	9.3	6.3	1.0	0.5	0.9	16.9	16.5	16.6	9.9	14.1	11.4	708
55-59	12.3	15.1	13.1	10.7	11.8	11.0	2.3	0.0	1.9	0.2	2.1	0.5	13.9	8.6	9.9	7.7	10.4	8.6	538
60-64	7.7	9.0	8.1	2.7	0.0	2.0	0.3	1.9	0.5	0.3	0.0	0.3	7.6	5.2	5.8	4.7	5.9	5.1	319
65-69	4.4	5.8	4.9	2.0	0.0	1.5	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	6.8	3.7	4.4	2.9	4.1	3.3	207
70 -74	2.3	4.4	2.9	0.7	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	1.7	1.3	2.7	1.8	113
75 und mehr	1.5	2.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.1	2.6	1.1	1.7	1.3	83
<b>N**</b>	<b>1 956</b>	<b>843</b>	<b>2 799</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>237</b>	<b>752</b>	<b>989</b>	<b>4 077</b>	<b>2 154</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	7	6	13	13
<b>Alter</b>																			
Mittelwert	46.7	49.7	47.6	42.8	41.0	42.4	35.3	32.9	34.9	22.5	21.9	22.4	47.4	45.6	46.1	38.8	43.8	40.5	
Standardabweichung	13.2	13.4	13.3	11.5	12.0	11.6	9.3	10.3	9.5	9.0	9.4	9.0	16.3	13.5	14.3	16.0	15.7	16.1	
1. Quartil	36.3	39.6	37.5	33.8	31.4	33.4	28.1	25.2	28.0	17.0	16.4	16.9	37.0	36.4	36.6	25.2	32.2	27.6	
Medianwert	47.5	51.2	48.5	42.6	39.8	41.9	34.4	31.5	34.0	18.2	18.0	18.2	50.0	46.7	47.3	38.0	45.3	40.3	
3. Quartil	56.3	58.3	56.9	50.9	51.9	51.1	40.0	37.2	40.0	25.4	22.9	24.9	57.1	53.9	54.8	51.2	55.0	52.9	
<b>N**</b>	<b>1 956</b>	<b>843</b>	<b>2 799</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>241</b>	<b>754</b>	<b>995</b>	<b>4 081</b>	<b>2 156</b>	<b>6 237</b>	
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	7	6	13	

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Zivilstand*</b>																			
ledig	42.7	31.3	39.1	67.7	85.0	71.8	67.8	70.8	68.2	93.0	87.0	91.8	25.8	26.4	26.3	60.5	42.4	54.2	1 842
verheiratet	34.4	28.5	32.5	15.4	0.0	11.8	17.1	12.5	16.5	4.0	5.3	4.2	45.2	51.3	50.0	23.6	30.3	25.9	881
getrennt	3.6	4.0	3.8	4.6	5.0	4.7	3.4	4.2	3.5	1.3	2.3	1.5	4.3	3.6	3.7	3.0	3.5	3.2	108
geschieden	18.6	28.5	21.7	12.3	10.0	11.8	11.0	12.5	11.2	1.8	4.6	2.3	22.6	14.2	16.0	12.3	19.1	14.7	498
verwitwet	0.5	7.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.2	3.9	3.5	0.5	4.2	1.8	60
reg. Partnerschaft	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	10
<b>N**</b>	<b>1 071</b>	<b>498</b>	<b>1 569</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>85</b>	<b>146</b>	<b>24</b>	<b>170</b>	<b>556</b>	<b>131</b>	<b>687</b>	<b>93</b>	<b>337</b>	<b>430</b>	<b>2 221</b>	<b>1 178</b>	<b>3 399</b>	<b>3 399</b>
fehlende Angaben	886	345	1 231	84	31	115	164	30	194	354	60	414	149	421	570	1 863	982	2 845	2 845
<b>Urbanitätsgrad*</b>																			
Grossstadtzentren	14.3	12.6	13.7	1.5	0.0	1.1	4.6	0.0	3.9	1.0	2.1	1.2	20.3	17.7	18.4	8.8	10.7	9.5	361
Umland der Grossstadtzentren	16.5	14.9	16.0	6.2	12.5	7.9	13.8	7.7	12.9	4.8	5.6	5.0	4.9	0.5	1.6	10.9	7.8	9.8	374
Mittelzentren	15.9	21.1	17.5	23.1	8.3	19.1	25.0	23.1	24.7	25.8	26.6	25.9	23.6	31.6	29.7	20.7	25.3	22.3	849
Kleinzentren	27.5	27.7	27.6	52.3	41.7	49.4	34.9	30.8	34.3	34.1	30.8	33.5	21.1	23.9	23.2	30.5	28.4	29.8	1 134
rural	25.8	23.7	25.2	16.9	37.5	22.5	21.7	38.5	24.2	34.3	35.0	34.4	30.1	26.2	27.1	29.0	27.7	28.5	1 086
<b>N**</b>	<b>1 220</b>	<b>549</b>	<b>1 769</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>89</b>	<b>152</b>	<b>26</b>	<b>178</b>	<b>598</b>	<b>143</b>	<b>741</b>	<b>123</b>	<b>389</b>	<b>512</b>	<b>2 482</b>	<b>1 322</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
fehlende Angaben	737	294	1 031	84	27	111	158	28	186	312	48	360	119	369	488	1 602	838	2 440	2 440

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>MitbewohnerInnen*</b>																			
allein	38.9	42.5	40.0	40.2	36.7	39.3	34.7	36.7	35.0	11.6	13.6	12.0	12.1	18.0	16.7	29.4	30.8	29.9	1 182
mit Herkunftsfamilie	6.1	2.6	5.0	13.4	23.3	16.1	15.0	13.3	14.8	69.0	52.3	66.2	14.3	5.8	7.7	25.8	12.7	21.4	848
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	47.9	49.8	48.5	20.7	33.3	24.1	36.4	46.7	37.9	9.3	13.6	10.0	69.2	72.2	71.5	35.9	48.8	40.1	1 588
mit Freunden/anderen Personen	2.6	1.9	2.4	4.9	3.3	4.5	4.0	0.0	3.4	1.7	3.0	1.9	2.2	2.4	2.4	2.5	2.7	2.6	101
Haft	0.1	0.0	0.1	2.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.7	1.9	2.5	7.3	0.0	5.4	5.2	0.0	4.4	3.6	5.3	3.9	1.1	0.6	0.7	3.1	1.8	2.7	105
Spital/Klinik	0.2	0.3	0.2	1.2	0.0	0.9	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	6
anderes	1.6	1.0	1.4	9.8	3.3	8.0	4.0	3.3	3.9	4.6	12.1	5.9	1.1	0.9	1.0	3.1	3.1	3.1	121
<b>N**</b>	<b>1 289</b>	<b>588</b>	<b>1 877</b>	<b>82</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>173</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>646</b>	<b>132</b>	<b>778</b>	<b>91</b>	<b>327</b>	<b>418</b>	<b>2 647</b>	<b>1 309</b>	<b>3 956</b>	<b>3 956</b>
fehlende Angaben	668	255	923	67	21	88	137	24	161	264	59	323	151	431	582	1 437	851	2 288	2 288
<b>Wohnsituation*</b>																			
stabile Wohnsituation	94.9	96.9	95.5	77.4	96.8	82.6	90.5	92.9	90.8	93.9	90.4	93.3	97.3	96.3	96.5	93.8	95.7	94.5	3 915
instabile Wohnsituation	2.9	1.5	2.5	11.9	3.2	9.6	5.0	3.6	4.8	2.7	5.2	3.1	2.7	3.4	3.3	3.3	2.9	3.1	130
Haft	0.1	0.0	0.1	2.4	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	2.0	1.6	1.9	8.3	0.0	6.1	4.5	3.6	4.3	3.1	4.4	3.4	0.0	0.3	0.2	2.6	1.5	2.2	93
<b>N**</b>	<b>1 373</b>	<b>619</b>	<b>1 992</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>115</b>	<b>179</b>	<b>28</b>	<b>207</b>	<b>667</b>	<b>135</b>	<b>802</b>	<b>110</b>	<b>349</b>	<b>459</b>	<b>2 780</b>	<b>1 365</b>	<b>4 145</b>	<b>4 145</b>
fehlende Angaben	584	224	808	65	20	85	131	26	157	243	56	299	132	409	541	1 304	795	2 099	2 099
<b>Partnerbeziehung*</b>																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	36.7	44.5	39.2	59.2	52.9	57.6	40.0	23.5	37.8	74.3	57.8	71.2	21.6	21.5	21.5	47.4	38.9	44.3	1 181
zeitweilige Beziehung(en)	3.6	2.9	3.3	6.1	0.0	4.5	6.4	5.9	6.3	2.9	11.1	4.4	1.4	3.5	3.1	3.4	4.4	3.8	100
feste Beziehung, getrennt lebend	10.8	9.1	10.3	4.1	5.9	4.5	20.0	23.5	20.5	13.0	20.0	14.3	9.5	12.7	12.0	11.3	11.9	11.5	307
feste Beziehung, zus. lebend	48.9	43.5	47.2	30.6	41.2	33.3	33.6	47.1	35.4	9.9	11.1	10.1	67.6	62.3	63.4	37.9	44.9	40.4	1 075
<b>N**</b>	<b>869</b>	<b>416</b>	<b>1 285</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>127</b>	<b>385</b>	<b>90</b>	<b>475</b>	<b>74</b>	<b>284</b>	<b>358</b>	<b>1 711</b>	<b>952</b>	<b>2 663</b>	<b>2 663</b>
fehlende Angaben	1 088	427	1 515	100	34	134	200	37	237	525	101	626	168	474	642	2 373	1 208	3 581	3 581

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Hauptquelle des Lebensunterhaltes*</b>																			
Erwerbseinkommen	60.4	47.7	56.3	39.3	27.8	36.5	54.8	37.5	52.0	24.1	22.8	23.9	71.7	72.1	72.0	48.9	51.2	49.7	1 646
Ersparnisse	1.4	1.7	1.5	5.4	0.0	4.1	4.0	4.2	4.1	0.0	0.0	0.0	2.7	0.3	0.8	1.2	0.9	1.1	36
Rente (AHV/IV u.a.)	14.7	25.2	18.1	19.6	16.7	18.9	11.3	16.7	12.2	3.2	4.4	3.4	11.5	8.9	9.5	11.5	17.5	13.6	451
Sozialhilfe/Fürsorge	15.0	12.4	14.2	28.6	44.4	32.4	16.9	29.2	18.9	10.5	7.9	10.0	0.9	3.3	2.8	12.9	8.7	11.4	378
Arbeitslosenversicherung	3.3	2.3	3.0	1.8	0.0	1.4	3.2	4.2	3.4	2.2	1.8	2.2	0.9	0.6	0.6	2.8	1.6	2.4	79
durch PartnerIn	1.2	7.4	3.2	1.8	5.6	2.7	2.4	0.0	2.0	1.9	1.8	1.8	0.9	8.6	6.8	1.4	6.6	3.2	107
durch Eltern/Angehörige	2.1	1.4	1.9	1.8	5.6	2.7	4.8	8.3	5.4	57.0	61.4	57.8	10.6	5.6	6.8	19.9	12.4	17.2	570
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Prostitution	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
Taggeldversicherung	0.6	0.2	0.5	1.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	9
anderes	1.3	1.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.6	0.0	0.5	0.9	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	30
<b>N**</b>	<b>1 021</b>	<b>484</b>	<b>1 505</b>	<b>56</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>124</b>	<b>24</b>	<b>148</b>	<b>535</b>	<b>114</b>	<b>649</b>	<b>113</b>	<b>359</b>	<b>472</b>	<b>2 133</b>	<b>1 179</b>	<b>3 312</b>	<b>3 312</b>
fehlende Angaben	936	359	1 295	93	33	126	186	30	216	375	77	452	129	399	528	1 951	981	2 932	2 932
<b>Hauptsächlicher Erwerbstatus*</b>																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	58.7	34.9	51.3	33.3	25.0	31.5	56.1	47.4	54.9	15.0	9.8	14.0	71.4	51.5	56.1	44.9	36.5	42.0	1 251
Teilzeitarbeit	5.3	23.4	11.0	3.5	12.5	5.5	3.5	10.5	4.5	0.6	6.3	1.6	7.7	28.6	23.7	3.9	21.4	9.9	295
Gelegenheitsjobs	0.8	0.7	0.7	5.3	0.0	4.1	1.8	0.0	1.5	0.8	0.0	0.6	0.0	0.7	0.5	1.0	0.7	0.9	27.0
in Ausbildung	2.4	1.9	2.2	0.0	6.3	1.4	2.6	21.1	5.3	67.9	70.5	68.4	5.5	7.6	7.1	23.1	16.0	20.7	615
arbeitslos und aktive Stellensuche	8.0	3.8	6.7	8.8	0.0	6.8	14.0	10.5	13.5	3.5	4.5	3.7	2.2	0.7	1.0	6.3	2.7	5.0	150
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	4.8	4.8	4.8	15.8	31.3	19.2	6.1	5.3	6.0	2.8	0.9	2.4	0.0	1.0	0.8	4.3	3.1	3.9	116
Rentner/Rentnerin	8.4	16.0	10.8	5.3	6.3	5.5	1.8	0.0	1.5	0.6	0.0	0.5	11.0	6.6	7.7	5.4	9.8	7.0	207
Arbeitsunfähigkeit	5.7	6.0	5.8	12.3	0.0	9.6	4.4	5.3	4.5	2.4	1.8	2.3	0.0	1.3	1.0	4.5	4.1	4.3	129
Hausfrau/-mann	0.1	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	1.1	0.4	13.0
anderes	5.8	6.0	5.8	15.8	18.8	16.4	9.6	0.0	8.3	6.5	6.3	6.5	2.2	1.7	1.8	6.5	4.6	5.8	174
<b>N**</b>	<b>916</b>	<b>418</b>	<b>1 334</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>114</b>	<b>19</b>	<b>133</b>	<b>508</b>	<b>112</b>	<b>620</b>	<b>91</b>	<b>301</b>	<b>392</b>	<b>1 948</b>	<b>1 029</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>
fehlende Angaben	1 041	425	1 466	92	35	127	196	35	231	402	79	481	151	457	608	2 136	1 131	3 267	3 267

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	28.1	32.9	29.5	53.1	36.4	48.8	37.5	57.1	39.4	17.9	24.1	18.9	27.3	18.8	20.9	27.3	30.3	28.1	327
Lehrling/Lehrtochter, Praktikum	2.2	1.4	1.9	3.1	0.0	2.3	1.6	0.0	1.4	32.5	27.6	31.7	0.0	0.0	0.0	8.6	3.7	7.2	84
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.0	2.3	2.8	9.4	9.1	9.3	1.6	0.0	1.4	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	3.1	1.9	2.8	32
angelernte(r) ArbeiterIn	4.0	5.6	4.5	6.3	9.1	7.0	7.8	14.3	8.5	3.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	4.2	5.0	4.4	51
gelernte(r) ArbeiterIn	14.7	6.5	12.3	18.8	9.1	16.3	12.5	0.0	11.3	7.3	6.9	7.2	9.1	3.1	4.7	13.1	6.8	11.4	132
VorarbeiterIn	2.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.8	1.3	0.0	1.1	0.0	3.1	2.3	2.0	0.3	1.5	18
einfache(r) Angestellte(r)	18.3	28.2	21.3	3.1	9.1	4.7	18.8	14.3	18.3	11.3	6.9	10.6	0.0	31.3	23.3	15.4	25.4	18.2	211
mittlere Angestellte® / Kader	13.1	10.2	12.3	6.3	18.2	9.3	9.4	14.3	9.9	2.6	3.4	2.8	18.2	21.9	20.9	10.0	11.8	10.5	122
leitende/r Angestellte(r)/Kader	3.8	1.9	3.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	18.2	6.3	9.3	3.0	1.9	2.7	31
selbständig	8.4	9.7	8.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.6	1.3	0.0	1.1	27.3	9.4	14.0	7.0	7.4	7.1	83
SchülerIn/StudentIn	1.0	0.5	0.8	0.0	9.1	2.3	0.0	0.0	0.0	18.5	31.0	20.6	0.0	6.3	4.7	5.4	4.6	5.2	60
andere Stellung	0.8	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	11
<b>N**</b>	<b>502</b>	<b>216</b>	<b>718</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>151</b>	<b>29</b>	<b>180</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>839</b>	<b>323</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>
fehlende Angaben	1 455	627	2 082	117	40	157	246	47	293	759	162	921	231	726	957	3 245	1 837	5 082	5 082

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)**

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
planm. Beendigung ohne Übertritt	51.1	52.3	51.5	22.8	29.4	24.5	32.7	38.9	33.6	62.5	69.1	63.6	68.6	71.7	71.0	52.5	60.9	55.4	3 453
planm. Beendigung mit Übertritt	9.5	11.5	10.1	16.8	7.8	14.5	9.4	7.4	9.1	6.4	1.6	5.5	2.5	2.1	2.2	8.3	7.0	7.9	491
Wohnortswechsel	1.6	2.7	1.9	4.7	5.9	5.0	3.2	3.7	3.3	1.3	0.5	1.2	0.0	1.1	0.8	1.6	2.0	1.7	107
Hospitalisierung	1.1	1.8	1.3	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8	50
Inhaftierung	0.1	0.1	0.1	2.0	0.0	1.5	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9
Kontaktverlust	26.9	21.7	25.3	29.5	29.4	29.5	42.4	42.6	42.4	20.1	20.9	20.3	19.8	18.2	18.6	26.3	20.8	24.4	1 521
expliziter Abbruch	7.0	6.8	7.0	11.4	13.7	12.0	6.5	3.7	6.1	7.3	5.2	6.9	3.3	4.4	4.1	7.2	5.5	6.6	411
Tod	1.5	1.4	1.5	8.1	7.8	8.0	1.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	0.8	0.1	0.3	1.3	1.0	1.2	73
anderer Grund	1.2	1.7	1.4	3.4	5.9	4.0	2.6	3.7	2.8	2.1	2.1	2.1	4.5	2.4	2.9	1.8	1.9	1.9	116
<b>N**</b>	<b>1 951</b>	<b>840</b>	<b>2 791</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>309</b>	<b>54</b>	<b>363</b>	<b>909</b>	<b>191</b>	<b>1 100</b>	<b>242</b>	<b>757</b>	<b>999</b>	<b>4 075</b>	<b>2 156</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
fehlende Angaben	6	3	9	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	9	4	13	13

**T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)**

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
stationäre Therapie	39.3	42.2	40.3	10.0	0.0	8.3	26.3	0.0	22.7	32.1	0.0	31.0	25.0	0.0	7.1	33.0	32.6	32.9	98
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	0.8	3.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.1	0.5	3.4	1.3	4
ambulante Behandlung	41.8	39.1	40.9	60.0	25.0	54.2	52.6	100.0	59.1	60.7	100.0	62.1	25.0	60.0	50.0	48.8	44.9	47.7	142
Aussenwohngruppe	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
andere Stelle/Institution	17.2	15.6	16.7	30.0	75.0	37.5	21.1	0.0	18.2	7.1	0.0	6.9	50.0	30.0	35.7	17.2	19.1	17.8	53
<b>N**</b>	<b>122</b>	<b>64</b>	<b>186</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>209</b>	<b>89</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
fehlende Angaben	63	33	96	5	0	5	10	1	11	30	2	32	2	6	8	131	62	193	193

**T32c Todesursachen nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)**

Todesursache****	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Suizid	15.0	0.0	11.5	0.0	66.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	36.4	17.5	7
Unfall	0.0	16.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	2.5	1
Krankheit	75.0	83.3	76.9	60.0	33.3	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	72.4	54.5	67.5	27
Überdosis bzw. Vergiftung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.5	1
andere Todesursache	10.0	0.0	7.7	40.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	10.0	4
<b>N**</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
fehlende Angaben	9	6	15	7	1	8	2	0	2	2	0	2	0	1	1	23	10	33	33

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
<b>Dauer der Behandlung (%)*</b>																			
1 Woche oder weniger	8.5	8.4	8.5	2.7	5.9	3.5	1.3	1.9	1.4	4.7	3.1	4.5	15.4	12.3	13.0	6.7	8.7	7.4	461
> 1 Woche bis 1 Monat	5.1	4.3	4.9	3.4	0.0	2.5	3.9	1.9	3.6	11.8	12.0	11.8	4.1	4.0	4.0	6.4	4.6	5.8	360
> 1 Monat bis 2 Monate	3.7	3.8	3.7	4.0	2.0	3.5	6.1	0.0	5.2	9.9	10.5	10.0	5.0	4.2	4.4	5.5	4.6	5.2	322
> 2 bis 3 Monate	3.3	4.2	3.6	2.0	3.9	2.5	6.1	3.7	5.8	7.3	6.3	7.1	6.6	4.4	4.9	4.8	4.5	4.7	293
> 3 bis 6 Monate	12.7	10.3	12.0	6.7	11.8	8.0	17.1	14.8	16.8	15.1	14.7	15.0	14.5	19.6	18.3	14.0	13.8	13.9	867
> 6 Monate bis 1 Jahr	24.2	26.0	24.7	16.8	21.6	18.0	33.2	38.9	34.1	28.2	27.7	28.2	36.5	33.4	34.2	27.7	30.0	28.5	1 775
> 1 Jahr bis 2 Jahre	21.7	21.8	21.8	15.4	21.6	17.0	20.3	20.4	20.3	14.8	17.3	15.3	11.6	14.0	13.4	18.9	19.0	18.9	1 179
> 2 bis 3 Jahre	8.4	8.7	8.5	6.0	3.9	5.5	5.8	5.6	5.8	4.5	4.7	4.5	2.9	5.2	4.6	6.4	6.4	6.4	400
> 3 bis 5 Jahre	7.7	8.1	7.8	25.5	13.7	22.5	3.5	7.4	4.1	3.1	3.7	3.2	0.8	2.4	2.0	6.0	5.4	5.8	360
> 5 bis 10 Jahre	3.4	3.3	3.4	10.7	11.8	11.0	1.9	5.6	2.5	0.5	0.0	0.5	2.1	0.7	1.0	2.6	2.2	2.5	154
mehr als 10 Jahre	1.4	1.2	1.3	6.7	3.9	6.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	1.0	0.7	0.9	56
<b>N**</b>	<b>1 957</b>	<b>843</b>	<b>2 800</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>241</b>	<b>757</b>	<b>998</b>	<b>4 075</b>	<b>2 152</b>	<b>6 227</b>	<b>6 227</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	8	17	17
<b>Dauer in Wochen</b>																			
Mittelwert	75.2	75.5	75.3	171.9	131.3	161.5	58.1	74.7	60.6	40.1	39.2	39.9	39.7	40.7	40.4	64.1	59.7	62.5	
Standardabweichung	105.0	106.6	105.5	236.2	182.6	224.0	98.5	81.0	96.2	54.5	42.4	52.6	66.7	55.0	58.0	100.5	88.7	96.6	
1. Quartil	16.9	17.9	17.0	27.4	27.7	27.6	16.9	26.6	17.9	7.7	7.3	7.7	8.4	12.3	11.3	13.4	14.1	13.7	
Medianwert	43.0	42.7	43.0	98.3	60.6	86.8	37.2	45.9	38.6	25.0	28.0	26.0	25.7	27.4	26.8	34.7	34.5	34.6	
3. Quartil	90.4	90.0	90.2	210.5	180.4	201.0	62.0	87.6	64.0	48.3	56.6	49.0	45.0	47.9	46.7	72.6	68.7	71.4	
<b>N**</b>	<b>1 957</b>	<b>843</b>	<b>2 800</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>241</b>	<b>757</b>	<b>998</b>	<b>4 075</b>	<b>2 152</b>	<b>6 227</b>	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	8	17	

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein



T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Substitution während der Behandlung*</b>																
nein	98.7	99.2	98.9	58.1	68.4	60.5	95.4	100.0	96.0	99.6	100.0	99.7	97.5	98.5	97.8	2 862
ja	1.3	0.8	1.1	41.9	31.6	39.5	4.6	0.0	4.0	0.4	0.0	0.3	2.5	1.5	2.2	64
<b>N**</b>	<b>1 087</b>	<b>488</b>	<b>1 575</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>130</b>	<b>21</b>	<b>151</b>	<b>533</b>	<b>121</b>	<b>654</b>	<b>2 103</b>	<b>823</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>
fehlende Angaben	870	355	1 225	87	32	119	180	33	213	377	70	447	1 737	574	2 311	2 311
<b>Typ der Substitution***</b>																
Heroin	0.0	0.0	0.0	4.0	16.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.1	3.3	2
Methadon	61.5	100.0	70.6	72.0	50.0	67.7	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	72.0	72.7	72.1	44
andere Opiate	38.5	0.0	29.4	24.0	33.3	25.8	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	24.0	18.2	23.0	14
andere Substanzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	1
<b>N**</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
fehlende Angaben	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>Substitution nach der Behandlung*</b>																
nein	99.2	99.4	99.3	69.1	77.8	71.2	96.6	100.0	97.1	100.0	100.0	100.0	98.4	99.1	98.6	2 744
ja	0.8	0.6	0.7	30.9	22.2	28.8	3.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.4	39
<b>N**</b>	<b>1 049</b>	<b>464</b>	<b>1 513</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>73</b>	<b>118</b>	<b>21</b>	<b>139</b>	<b>519</b>	<b>114</b>	<b>633</b>	<b>2 005</b>	<b>778</b>	<b>2 783</b>	<b>2 783</b>
fehlende Angaben	908	379	1 287	94	33	127	192	33	225	391	77	468	1 835	619	2 454	2 454
<b>Typ der Substitution***</b>																
heroingestützte Behandlung	12.5	0.0	9.1	5.9	25.0	9.5	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	9.4	14.3	10.3	4
Substitution	87.5	100.0	90.9	94.1	75.0	90.5	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	90.6	85.7	89.7	35
<b>N**</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*</b>																
nein	91.7	85.6	90.0	90.7	85.7	89.5	89.7	85.7	89.3	95.6	100.0	96.4	92.5	88.8	91.6	1 259
ja	8.3	14.4	10.0	9.3	14.3	10.5	10.3	14.3	10.7	4.4	0.0	3.6	7.5	11.2	8.4	116
<b>N**</b>	<b>637</b>	<b>243</b>	<b>880</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>182</b>	<b>40</b>	<b>222</b>	<b>1 035</b>	<b>340</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>
fehlende Angaben	1 320	600	1 920	106	37	143	242	47	289	728	151	879	2 805	1 057	3 862	3 862
<b>Typ der vorgesehenen Nachsorge***</b>																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	2.1	3.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	1.9	2
fremde Aussenwohngruppe	6.3	0.0	3.8	25.0	0.0	16.7	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	4.8	5
fremde Nachsorgestelle	14.6	21.9	17.5	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	25.0	16.7	0.0	16.7	14.3	20.0	16.2	17
Alkoholberatungsstelle	10.4	15.6	12.5	0.0	0.0	0.0	28.6	100.0	37.5	0.0	0.0	0.0	11.4	17.1	13.3	14
Drogenberatungsstelle	4.2	0.0	2.5	75.0	100.0	83.3	28.6	100.0	37.5	0.0	0.0	0.0	11.4	8.6	10.5	11
andere Beratungsstelle	12.5	21.9	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	14.3	20.0	16.2	17
Selbsthilfegruppe	8.3	6.3	7.5	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	8.6	5.7	7.6	8
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	43.8	31.3	38.8	25.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	37.1	28.6	34.3	36
<b>N**</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
fehlende Angaben	5	3	8	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	3	11	11

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2019)

Suchtprobleme bei Austritt*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	71.5	75.6	72.8	22.7	13.3	20.0	24.3	30.0	25.0	11.8	6.6	11.0	43.1	50.1	45.0	1 570
Heroin	0.6	0.5	0.6	48.0	63.3	52.4	2.5	3.3	2.6	0.2	0.0	0.1	2.1	2.6	2.3	79
Methadon	0.3	0.0	0.2	9.3	3.3	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	15
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Opiode	0.2	0.0	0.2	4.0	13.3	6.7	2.0	0.0	1.7	0.0	0.8	0.1	0.4	0.6	0.5	17
Kokain-Pulver	4.8	1.0	3.6	20.0	16.7	19.0	66.3	50.0	64.2	3.9	1.7	3.6	9.8	3.2	8.0	278
Crack-Kokain	0.3	0.0	0.2	1.3	3.3	1.9	3.5	0.0	3.0	0.2	0.0	0.1	0.5	0.1	0.4	14
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	1.0	1.0	3.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	5
Amphetamine	1.0	0.2	0.7	2.7	0.0	1.9	3.5	6.7	3.9	1.4	0.8	1.3	1.5	0.7	1.3	45
Metamphetamine	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	8
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.5	0.3	0.4	2.7	0.0	1.9	0.5	0.0	0.4	0.6	1.7	0.8	0.7	0.6	0.7	23
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1	2
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	7
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	1
Benzodiazepine	1.1	2.6	1.5	14.7	3.3	11.4	2.0	3.3	2.2	0.3	0.0	0.3	1.7	2.6	2.0	68
GHB/GBL	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.5	0.3	1.3	6.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	14
LSD	0.2	0.0	0.2	2.7	0.0	1.9	1.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.3	0.4	0.0	0.3	10
Ketamin	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	3
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.2	0.1	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	5
Cannabis	6.2	3.1	5.2	20.0	16.7	19.0	13.4	16.7	13.8	64.0	52.9	62.2	21.8	10.7	18.8	654
Tabak	10.9	10.4	10.7	18.7	16.7	18.1	9.9	6.7	9.5	11.9	9.9	11.6	12.1	12.5	12.2	425
andere Substanz(en)	0.2	0.2	0.2	1.3	0.0	1.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	13
Glücksspielsucht	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4	2.0	69
Computer- bzw. Internetsucht	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.8	0.5	1.3	0.5	1.1	38
Essstörungen	0.1	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	5.2	1.6	56
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1.9	2.2	2.0	68
keine	26.1	22.3	24.9	22.7	13.3	20.0	21.8	23.3	22.0	32.2	45.5	34.3	27.5	25.3	26.9	939
<b>N**</b>	<b>1 286</b>	<b>587</b>	<b>1 873</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>202</b>	<b>30</b>	<b>232</b>	<b>636</b>	<b>121</b>	<b>757</b>	<b>2 528</b>	<b>959</b>	<b>3 487</b>	<b>3 487</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit der Rückfälle*</b>																
keine	52.3	38.4	48.3	25.9	28.6	26.5	36.4	33.3	36.1	67.4	62.5	66.7	52.3	41.2	49.5	384
einmal	7.5	11.3	8.6	14.8	0.0	11.8	18.2	66.7	22.2	5.3	6.3	5.4	8.5	11.1	9.1	71
zweimal	6.7	8.8	7.3	7.4	14.3	8.8	15.2	0.0	13.9	4.2	12.5	5.4	6.6	9.0	7.2	56
drei- oder viermal	10.6	16.4	12.2	18.5	0.0	14.7	12.1	0.0	11.1	8.4	6.3	8.1	10.7	15.1	11.9	92
fünfmal oder mehr	22.9	25.2	23.6	33.3	57.1	38.2	18.2	0.0	16.7	14.7	12.5	14.4	21.8	23.6	22.3	173
<b>N**</b>	<b>388</b>	<b>159</b>	<b>547</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>95</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>577</b>	<b>199</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
fehlende Angaben	1 569	684	2 253	122	44	166	277	51	328	815	175	990	3 263	1 198	4 461	4 461
<b>Substanzen/Verhalten bei Rückfall***</b>																
Alkohol	97.8	97.8	97.8	44.4	20.0	39.1	40.0	0.0	36.4	43.3	16.7	38.9	80.7	85.7	82.2	309
Opioide	2.8	1.1	2.2	61.1	80.0	65.2	10.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.6	4.5	6.6	25
Kokain oder Derivate	2.8	1.1	2.2	50.0	20.0	43.5	95.0	50.0	90.9	6.7	33.3	11.1	14.0	4.5	11.2	42
andere Stimulanzien	0.0	1.1	0.4	5.6	0.0	4.3	5.0	50.0	9.1	3.3	0.0	2.8	1.5	2.7	1.9	7
Hypnotika/Sedativa	1.7	2.2	1.8	11.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.8	2.1	8
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
Cannabis	10.6	3.2	8.1	22.2	0.0	17.4	15.0	0.0	13.6	83.3	100.0	86.1	20.5	8.0	16.8	63
Tabak	4.4	5.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	4.2	5.4	4.5	17
andere Substanz(en)	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	1
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.6	3.0	0.9	2.4	9
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.6	2.3	0.9	1.9	7
Essstörungen	0.0	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	1.1	4
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
<b>N**</b>	<b>180</b>	<b>93</b>	<b>273</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>264</b>	<b>112</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
fehlende Angaben	5	5	10	2	0	2	1	0	1	1	0	1	11	5	16	16

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2019)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit des Tabakkonsums*</b>																
nie	41.5	53.2	45.2	30.0	40.0	32.0	12.5	0.0	12.1	18.1	26.7	19.4	35.6	48.7	39.2	280
1 Tag pro Woche oder weniger	1.5	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	1.1	8
2 bis 3 Tage pro Woche	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.1	1.0	0.0	0.7	5
4 bis 6 Tage pro Woche	1.5	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	1.7	0.5	1.4	10
einmal täglich	1.5	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.0	3.6	6.7	4.1	2.3	1.0	2.0	14
mehrmals täglich	53.5	44.9	50.8	70.0	60.0	68.0	81.3	100.0	81.8	72.3	66.7	71.4	58.0	49.2	55.6	397
<b>N**</b>	<b>342</b>	<b>158</b>	<b>500</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>83</b>	<b>15</b>	<b>98</b>	<b>519</b>	<b>195</b>	<b>714</b>	<b>714</b>
fehlende Angaben	1 615	685	2 300	129	46	175	278	53	331	827	176	1 003	3 321	1 202	4 523	4 523
<b>Anzahl Zigaretten proTag***</b>																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	26.0	33.9	28.0	8.3	0.0	6.7	16.7	100.0	20.0	50.9	60.0	52.2	30.3	36.6	31.7	117
11-20 Zigaretten pro Tag	46.2	50.8	47.4	83.3	100.0	86.7	50.0	0.0	48.0	38.6	40.0	38.8	45.3	51.2	46.6	172
21-30 Zigaretten pro Tag	22.0	11.9	19.4	8.3	0.0	6.7	20.8	0.0	20.0	7.0	0.0	6.0	18.5	9.8	16.5	61
31 und mehr Zigaretten pro Tag	5.8	3.4	5.2	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.0	3.5	0.0	3.0	5.9	2.4	5.1	19
<b>N**</b>	<b>173</b>	<b>59</b>	<b>232</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>287</b>	<b>82</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
fehlende Angaben	27	15	42	2	0	2	4	0	4	11	1	12	47	18	65	65

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich


T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2019)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Konsumziel*</b>																
definitive Abstinenz	33.8	34.9	34.1	78.3	66.7	75.9	62.8	100.0	65.2	49.5	61.1	51.2	39.4	41.2	39.9	358
zeitlich begrenzte Abstinenz	11.6	8.1	10.5	4.3	0.0	3.4	9.3	0.0	8.7	6.3	0.0	5.4	9.8	6.4	8.9	80
kontrollierter Konsum	34.0	43.5	36.8	8.7	0.0	6.9	7.0	0.0	6.5	23.4	22.2	23.3	30.4	38.2	32.4	291
keine Beschränkung beabsichtigt	6.8	2.7	5.6	0.0	16.7	3.4	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.9	5.6	2.6	4.8	43
bis jetzt nicht festgelegt	12.9	9.7	12.0	8.7	16.7	10.3	20.9	0.0	19.6	16.2	16.7	16.3	13.7	10.3	12.8	115
andere	0.9	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.2	11
<b>N**</b>	<b>441</b>	<b>186</b>	<b>627</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>111</b>	<b>18</b>	<b>129</b>	<b>665</b>	<b>233</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
fehlende Angaben	1 516	657	2 173	126	45	171	267	51	318	799	173	972	3 175	1 164	4 339	4 339
<b>Prognose*</b>																
sehr gute Prognose	17.6	13.7	16.5	18.5	8.3	15.4	17.8	20.0	18.0	18.3	21.7	18.9	18.0	14.5	17.1	154
gute Prognose	45.1	46.3	45.4	44.4	41.7	43.6	46.7	80.0	50.0	56.7	47.8	55.1	46.9	48.3	47.3	426
eher ungünstige Prognose	25.0	29.1	26.2	25.9	25.0	25.6	26.7	0.0	24.0	20.2	30.4	22.0	24.6	26.5	25.1	226
ungünstige Prognose	12.3	10.9	11.9	11.1	25.0	15.4	8.9	0.0	8.0	4.8	0.0	3.9	10.5	10.7	10.5	95
<b>N**</b>	<b>448</b>	<b>175</b>	<b>623</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>23</b>	<b>127</b>	<b>667</b>	<b>234</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
fehlende Angaben	1 509	668	2 177	122	39	161	265	49	314	806	168	974	3 173	1 163	4 336	4 336




<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich


\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019**





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



## G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität









## G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




**G4 Hauptproblem andere Stimulanzien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019**





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




## G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




## G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



## G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität

