

**Indications et médicaments visés à l'art. 45, al. 1, let. a**  
(Etat du 15 septembre 2019))**Remarques générales:**

- La remise sans ordonnance/sans consultation préalable d'un médecin peut être effectuée sous réserve des données de l'information sur le médicament, en particulier de la limite d'âge et d'autres restrictions (Cf. « autres remarques »)
- Pour les préparations contenant des associations médicamenteuses, les restrictions de chaque principe actif s'appliquent.
- La taille de l'emballage est limitée à la durée traitement mentionnée dans le tableau ou les données de l'information professionnelle.
- Une remise aux femmes enceintes et allaitantes est exclue

**1. Rhinite et rhino-conjonctivite allergiques saisonnières**

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques          |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| cétirizine       | comprimés              | oral                  | 10 mg                                | 1 mois              | Enfant au-dessus de 6 ans |
| cétirizine       | comprimés              | oral                  | 10 mg/ml                             |                     |                           |
| lévocétirizine   | comprimés              | oral                  | 5 mg                                 |                     |                           |
| lévocétirizine   | gouttes                | oral                  | 5 mg/ml                              |                     |                           |
| loratadine       | comprimés              | oral                  | 10 mg                                |                     |                           |
| desloratadine    | comprimés              | oral                  | 5 mg                                 |                     |                           |
| desloratadine    | solution               | oral                  | 0.5 mg/ml                            |                     |                           |
| bilastine        | comprimés              | oral                  | 20 mg                                |                     |                           |
| fexofénadine     | comprimés              | oral                  | 120 mg                               |                     |                           |
| azélastine       | Spray nasal            | local                 | 0.14 mg/dose                         |                     |                           |
| azélastine       | Gtt. opht.             | local                 | 0.5 mg/ml                            |                     |                           |
| épinastine       | Gtt. opht.             | local                 | 0.5 mg/ml                            |                     |                           |
| kétotifene       | Gtt. opht.             | local                 | 0.25 mg/ml                           |                     |                           |
| kétotifene       | comprimés              | oral                  | 1 mg                                 |                     |                           |
| olopatadine      | Gtt. opht.             | local                 | 1 mg/ml                              |                     |                           |
| mométasone       | Spray nasal            | local                 | 50 mcg                               | Adultes uniquement  |                           |
| fluticasone      | Spray nasal            | local                 | 27.5 mcg                             |                     |                           |

## 2. Maladies du système respiratoire aigües

### a. Bronchospasmes

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques          |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Salbutamol       | poudre                 | local                 | 100µg                                | 2 semaines          | Enfant au-dessus de 6 ans |
| Terbutaline      | poudre                 | local                 | 500µg                                |                     |                           |

## 3. Maladies de l'appareil digestif

### a. Symptômes de nausées et de vomissements

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques          |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Dompéridone      | Suspension             | Oral                  | 1mg/ml                               | Max 1 semaine       | Enfant au-dessus de 6 ans |

### b. Symptômes du reflux

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques     | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques   |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Oméprazole       | Gélules comprimés          | oral                  | 10mg<br>20mg                         | Max. 2 semaines     | Adultes uniquement |
| Lanzoprazole     | gélules                    | oral                  | 15 mg                                |                     |                    |
| Esoméprazole     | Gélules Comprimés granules | oral                  | 20 mg                                |                     |                    |
| Pantoprazole     | comprimés                  | oral                  | 20mg                                 |                     |                    |
| Rabéprazol       | comprimés                  | oral                  | 10 mg                                |                     |                    |

### c. troubles intestinaux fonctionnels

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques   |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Mébévérine       | Comprimés retard       | oral                  | 200 mg                               | Max 2 semaines      | Adultes uniquement |

### d. Diarrhées

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement  | Autres remarques          |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Lopéramide       | sirop                  | oral                  | 0.2mg/ml                             | Durée de traitement selon avis du pharmacien, de la pharmacienne | Enfant au-dessus de 6 ans |

### e. Constipation

| Principes actifs   | Formes pharmaceutiques     | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité    | Durée du traitement  | Autres remarques          |
|--|----------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|
| Macrogol, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium | Poudre ou solution à boire | oral                  | 13.125g<br>178.6mg<br>350.8mg<br>50.2mg | Durée de traitement selon avis du pharmacien, de la pharmacienne | Adultes uniquement        |
| Macrogol, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium | poudre                     | oral                  | 13.125g<br>178.5mg<br>350.7mg<br>46.6mg |  |                           |
| Macrogol, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium | poudre                     | oral                  | 6.563g<br>89.3 mg<br>175.4mg<br>25.1mg  |  | Enfant au-dessus de 6 ans |
| Phénolphthaléine , Agar, Paraffine   | émulsion                   | oral                  | 65mg<br>15mg<br>2g                      |  |                           |
| Picosulfat de sodium   | gouttes                    | oral                  | 7.5mg/ml                                |  |                           |

**f. Traitement de la crise hémorroïdale aiguë**

| Principes actifs                           | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques   |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Policresulenum, Cinchocaini hydrochloridum | onguent                | local                 | 50mg<br>10mg                         | Max. 1 semaine      | Adultes uniquement |
| Policresulenum, Cinchocaini hydrochloridum | Supp.                  | local                 | 100mg<br>2.5mg                       | Max. 1 semaine      |                    |
| Calcium dobesilas, Lidocain, Dexamethason  | onguent                | local                 | 40mg<br>20mg<br>0,25mg               | Max 3 jours         |                    |

**g. Surcharge pondérale**

| Principes actifs | Formes pharmaceutiques | Mode d'administration | Quantité de principe actif par unité | Durée du traitement | Autres remarques   |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| orlistat         | gélules                | oral                  | 120mg                                | 12 semaines         | Adultes uniquement |