

Legende	PRAXIS				FORSCHUNG			Sonstige		Quellen		
	erfasste Störungsbilder/ Problembereich	Kosten	verfügbare Sprachen	Erforderliche Expertise der Durchführenden und Auswertenden	Remanenz/ Zeitbedarf	Altersgruppen	Validität des Originalinstruments	Spezifische Eignung für Geflüchtete/ Asylsuchende, Kultursensibilität	Sonstige Hinweise, Erfahrungen in der Anwendung	Zugang	Literatur	Links
	1) online kostenfrei verfügbar 2) auf Anfrage kostenfrei verfügbar 3) kann kostenpflichtig erworben werden	1) online frei verfügbar 2) auf Anfrage verfügbar 3) kann kostenpflichtig erworben werden	1) online frei verfügbar Arabisch, Bengali, Bosnisch, Burmesisch, Chinesisch (traditionell), Dänisch, Dari, Englisch, Farsi (Persisch), Filipino, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Khmer, Koreanisch, Kroatisch, Malaiisch, Mazedonisch, Nepali, Niederländisch, Polnisch, Punjabi, Russisch, Serbisch, Singalesisch, Spanisch, Swahili, Tamil, Thai, Türkisch, Urdu, Vietnamesisch	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden (Cut-Off Werte belegen) 2) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt werden, muss aber durch klinisches Fachpersonal (Psychologinnen, Ärztinnen, etc.) interpretiert werden 3) Kann nur von klinischem Fachpersonal durchgeführt und ausgewertet werden (Psycholog*innen, Ärzt*innen, etc.) 4) Kann nur von klinischem Fachpersonal mit spezifischer Schulung durchgeführt und ausgewertet werden.	10 Items, 5 Minuten	1) Erwachsene 2) Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren	3) gute Gütekriterien	1) keine spezifische Eignung berichtet 2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet, Empfehlung von Experten 3) Validierung des Instruments in einer Geflüchtetenpopulation 4) Entwickelt für Geflüchtete und Asylsuchende, Kultursensibel	weitere Versionen: Empfehlungen durch Expert*innen Anwendung in der Schweiz	Zugang	Literatur	Links
<b>Störungsübergreifende Screening-Instrumente</b>												
Kessler 10 (K10)	Allgemeine psychische Belastung	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Arabisch, Bengali, Burmesisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Karen, Kinyarwanda, Nepali, Russisch, Somali, Spanisch, Swahili, Tigrinya	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden (Cut-Off: Bemerkungsschritt von 0,88 bzw. Summenwert von 12 oder höher: positiver Fall)	10 Items, 5 Minuten	1) Erwachsene 2) Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren	3) gute Gütekriterien	3) Validierung des Instruments in einer Geflüchtetenpopulation	Für Übersetzung empfohlen, explizit für kulturbegreifenden Einsatz entwickelt: Weitere Version verfügbar mit 6 Items (K6)	Quelle: Kessler R. Professor of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston, USA. (2003). Screening for serious mental illness in the general population Archives of General Psychiatry, 60(2), 184-189.	Kessler, R.C., Barker, P.R., Colpe, L.J., Epstein, J.F., Gfroerer, J.C., Hiripi, E., Howes, M.J., Norman, S.L.T., Manderscheid, R.W., Walters, E.E., Zaslavsky, A.M. (2003). Screening for serious mental illness in the general population Archives of General Psychiatry, 60(2), 184-189.	<a href="https://www.healthrelations.org/owu/ubh92/bh92nat/PresData/2/OpenAs=Kessler_10_(K10)_Assessment_Form">https://www.healthrelations.org/owu/ubh92/bh92nat/PresData/2/OpenAs=Kessler_10_(K10)_Assessment_Form</a>
Refugee Health Screener (RHS-15)	Allgemeine psychische Belastung	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Arabisch, Bengali, Burmesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Karen, Kinyarwanda, Nepali, Russisch, Somali, Spanisch, Swahili, Tigrinya	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden (Cut-Off: Bemerkungsschritt von 0,88 bzw. Summenwert von 12 oder höher: positiver Fall)	15 Items, 4-12 Minuten	1) Erwachsene 2) Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren	3) gute Gütekriterien	4) Entwickelt für Geflüchtete und Asylsuchende, Kultursensibel	Der Vorteil dieses Screening-Instrumentes ist insbesondere seine kulturelle Sensibilität. Version mit 13 Items zeigt ebenfalls gute Gütekriterien (Hollfeld, 2016; Kallenbach, 2017)	Zweisprachige Version des RHS-15 über Pathways to Wellness: C. Vidwanamane, T. Yamazaki, J., & Sochoo, J. (2013). The Refugee Health Screener-15 (RHS-15): development and validation of an instrument for anxiety, depression, and PTSD in refugees. General hospital psychiatry, 35(2), 202-209.	Hollfeld, M., Verbeils-Köpp, S., Farmer, B., Toolson, E. (2015). Über Pathways to Wellness: C. Vidwanamane, T. Yamazaki, J., & Sochoo, J. (2013). The Refugee Health Screener-15 (RHS-15): development and validation of an instrument for anxiety, depression, and PTSD in refugees. General hospital psychiatry, 35(2), 202-209.	<a href="http://philipps.uni-heidelberg.org/page_id/2503">http://philipps.uni-heidelberg.org/page_id/2503</a>
WHO-Five Wellbeing Index (WHO-5)	Allgemeines Wohlbefinden, Depression	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Arabisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Italienisch, Japanisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. Einschätzung von 0 - 5 Testwerte von 0-25 Punkte möglich Umrechnung in Prozentwerte (0-100) Cut-Offs je nach Sprache z.T. mitgeteilt Ein Testwert von unter 13 bzw. ein Prozentwert von unter 50 wird als Hinweis gesehen, auf Depression zu testen	5 Items, > 1 Minute	1) Erwachsene, 2) Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren	3) gute Gütekriterien	1) keine spezifische Eignung berichtet	Sowohl für die Erfassung allgemeinen Wohlbefindens als auch als Screening für Depression empfohlen. Wird für Erwachsene oder Kinder ab 9 Jahren empfohlen. Sehr zuverlässig	Frei verfügbar zum download.	WHO (1998). Wellbeing Measures in Primary Health Care/The DepCare Project. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.	<a href="https://www.psychiatry-region.de/who-5-checklist-who-5-5-pages/default.aspx">https://www.psychiatry-region.de/who-5-checklist-who-5-5-pages/default.aspx</a>
Pediatric Symptom Checklist - 17 Items (PSC-17)	Allgemeine psychische Belastung	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Arabisch, Englisch, Farsi, Filipino, Französisch, Deutsch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Hindi, Hmong, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Khmer, Koreanisch, Malayalam, Nepali, Portugiesisch, Russisch, Setswana, Somali, Spanisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Bialich mit englischen, spanischen oder filipino Untertiteln.	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. Ein Testwert von >= 15 wird als Hinweis für weitere Diagnostik gesehen.	17 Items, 5 Minuten	2) Kinder und Jugendliche	3) gute Gütekriterien	2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet, Empfehlung von Experten	Sehr kurze, leicht verständliche Fragen. Daher gut geeignet für Übersetzungen und zum Einsatz bei Geflüchteten. Einsatz als Fremdbereich über Eltern/Betreuungspersonen oder als Selbstbericht für Jugendliche möglich.	Alle PSD-17-Screener und Übersetzungen können von der Webseite heruntergeladen werden.	Murphy, J. M., Bergmann, P., Chang, C., Stumer, R., Howard, B., Abel, M. R., & Jellinek, M. (2016). The PSC-17: subscale scores, reliability, and factor structure in a new national sample. Pediatrics, 138(3), e20160038.	<a href="https://www.massgeneral.org/psychiatry/treatments-and-services/pediatric-symptom-checklist">https://www.massgeneral.org/psychiatry/treatments-and-services/pediatric-symptom-checklist</a>
<b>Störungsspezifische Selbstbeurteilungsinstrumente</b>												
Harvard Trauma Questionnaire 5 (HTQ-5)	PTBS	3) kann kostenpflichtig erworben werden	3) kann kostenpflichtig erworben werden Bosnisch, Englisch, Khmer, Khmer (R), Arabisch, Japanisch, Vietnamesisch, Laotisch	2) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt werden, muss aber durch klinisches Fachpersonal (Psychologinnen, Ärztinnen, etc.) interpretiert werden	25 Items	1) Erwachsene	1) keine Gütekriterien vorliegend (Veröffentlichung 2019)	4) Entwickelt für Geflüchtete und Asylsuchende, Kultursensibel Der HTQ-5 basiert auf einer früheren Version (HTQ). Dieser wird aufgrund der Berücksichtigung von kulturellen Faktoren bei der Entwicklung als besonders geeignet für Geflüchtete/Asylsuchende betrachtet und gilt als bewährt.	Entwickelt um gut in viele Sprachen übersetzt zu werden.	Berthold, S. M., Mollica, R. F., Silove, D., Tay, A. K., Lavee, J., & Lindort, J. (2019). The HTQ-5: revision of the Harvard Trauma Questionnaire for measuring torture, trauma and DSM-5 PTSD symptoms in refugee populations. European journal of public health, 29(3), 468-474.	<a href="http://hart.harvard.edu/trauma/questionnaire/trauma-questionnaire">http://hart.harvard.edu/trauma/questionnaire/trauma-questionnaire</a>	
PTSD-Checklist 5 (PCL-5)	PTBS	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Englisch, Filipino, Französisch, Griechisch, Spanisch	2) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt werden, muss aber durch klinisches Fachpersonal (Psychologinnen, Ärztinnen, etc.) interpretiert werden Cut-Off zwischen 31-33 als Indiz für wahrscheinliche PTBS. Unterschiedliche kulturelle Hintergründe können unterschiedliche Cut-Offs erfordern Anleitung vorhanden	20 Items, 10 Minuten	1) Erwachsene	3) gute Gütekriterien	3) Validierung des Instruments in einer Geflüchtetenpopulation	Für die PCL-5 gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, unter anderem: - Verlaufsmessungen während und nach der Behandlung - Screening von Personen auf PTSD - eine erste vorläufige PTSD-Diagnose stellen	Fragebogen verfügbar über "National Center for PTSD" (USA): www.ptsd.va.gov.	Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). <a href="https://lists.oca.org/discuss/ptsd-checklist">https://lists.oca.org/discuss/ptsd-checklist</a>	<a href="https://www.ptsd.va.gov/professionals/ptsd-checklist/">https://www.ptsd.va.gov/professionals/ptsd-checklist/</a>
Children and Adolescent Trauma Screening (CATS)	PTBS, Traumatische Exposition	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Deutsch, Englisch, Norwegisch, Arabisch, Dari, Farsi, Paschali, Tigrinya	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden (Cut-Off Werte belegen)	20 Items, 10-15 Minuten	2) Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre)	3) gute Gütekriterien	2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet, Empfehlung von Expert*innen	CATS ist in 3 Versionen erhältlich: Selbstreport für 7-17 Jahre, Caregiver Report (7-17 Jahre) und (3-6 Jahre). Es ist eher ein Screeninginstrument für PTBS. Cut-Off scores unterscheiden sich je nach Alter	Fragebogen verfügbar über: <a href="https://uimer.onlinelibrary.com/doi/full/10.1177/1063426917701471">https://uimer.onlinelibrary.com/doi/full/10.1177/1063426917701471</a>	Sachsler, C., Berliner, L., Holt, T., Jensen, T. K., Jungbluth, N., Risch, E., ... & Goldbeck, L. (2017). The validity of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of affective disorders, 210, 189-195.	<a href="https://uimer.onlinelibrary.com/doi/full/10.1177/1063426917701471">https://uimer.onlinelibrary.com/doi/full/10.1177/1063426917701471</a>
University of California LA - PTSD Reaction Index (UCLA-PTSD-Ri-6)	PTBS, Traumatische Exposition	3) kann kostenpflichtig erworben werden	3) kann kostenpflichtig erworben werden Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Indonesisch, Italienisch, Malayalam, Spanisch. * nicht alle Sprachen für alle Versionen erhältlich	3) Kann nur von klinischem Fachpersonal durchgeführt und ausgewertet werden (Psycholog*innen, Ärzt*innen, etc.)	Child/Adolescent Self Report: Traumatic Events Section 22 Items: PTBS Symptome +4 Items: Dissociativer Subtyp	2) Kinder und Jugendliche (7-18 Jahre)	3) gute Gütekriterien in Originalstudie => in späteren Studien auch schlechtere Ergebnisse	2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet, Empfehlung von Experten	UCLA enthält 4 Versionen: - Child/Adolescent Self-Report version - Parent/Caregiver Report version - Parent/Caregiver Report version for Children Age 6 and Younger - Brief Screen for Trauma and PTSD. (kostenlos)	Kaplow, J. B., Rolin-Arroyo, B., Layne, C. M., Rooney, E., Oosterhoff, B., Hill, R., ... & Pynoos, R. S. (2020). Validation of the UCLA PTSD reaction index for DSM-5: A developmentally informed assessment tool for youth. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(1), 186-194.	<a href="https://www.reactionindex.com/tools/measurements">https://www.reactionindex.com/tools/measurements</a>	
Hopkins-Symptom-Checklist-25 (HSLC-25)	Emotional Distress, Subakuter Angst/Depression	3) kann kostenpflichtig erworben werden	3) kann kostenpflichtig erworben werden Arabisch, Englisch, Khmer, Khmer (R), Kroatisch, Japanisch, Vietnamesisch, Laotisch.	2) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und ausgewertet werden (Psychologinnen, Ärztinnen, etc.) interpretiert werden	25 Items, 6-10 Minuten	1) Erwachsene und 2) Jugendliche ab 14	3) gute Gütekriterien	3) Validierung des Instruments in einer Geflüchtetenpopulation	3) Validierung des Instruments in einer Geflüchtetenpopulation	Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., & Heir, T. (2017). Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers: Use of computer-based assessment. Transcultural psychiatry, 54(5-6), 611-625.	<a href="http://hpcit.cambridge.org/screening/measurements/trauma-measuring-form/">http://hpcit.cambridge.org/screening/measurements/trauma-measuring-form/</a> <a href="https://www.testzentrale.de/shop/hooken-symptom-checkliste-25-deutsche-version.html">https://www.testzentrale.de/shop/hooken-symptom-checkliste-25-deutsche-version.html</a>	
General Anxiety Disorder 7 (GAD-7)	Generalisierte Angststörung	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Afrikanisch, Arabisch, Bulgarisch, Cebuano (Philippinen), Chinesisch (Kantonisch), Mandarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Griechisch, Philippinisch, Finnisch, Französisch, Französisch-Kanarisch, Griechisch, Gujarati, Hindi, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Indonesisch, Kannada (Indien), Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Malayalam, Marathi, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Swahili, Tamil, Telugu, Thai, Türkisch, Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. Summenwerte - Cut-Offs: 1-4: keine/minimale Angstsymptomatik 5-9: milde Angstsymptomatik 10-14: mittelgradige Angstsymptomatik 15-21: schwere Angstsymptomatik ab 10 Punkten: Hinweis auf vorliegende Symptomatik, weitere Abklärung empfohlen.	7 Items	1) Erwachsene	3) gute Gütekriterien	2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet, Empfehlung von Experten	Alle PHQ-GAD-7-Screener und Übersetzungen können von der angegebenen Webseite heruntergeladen werden. Es ist keine Genehmigung erforderlich, sie zu vervielfältigen, zu übersetzen, abzubilden oder zu verbreiten.	Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder - The GAD-7. Archives of Internal Medicine. 2006;166:1092-1097	<a href="https://www.phqscreeners.com/select-screener">https://www.phqscreeners.com/select-screener</a>	
Brief Patient Health Questionnaire (PHQ-9)	Depression	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Arabisch, Assamesisch, Bengalisches, Bulgarisch, Cebuano (Philippinen), Chinesisch (Kantonisch), Mandarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Griechisch, Philippinisch, Finnisch, Französisch, Französisch-Kanarisch, Griechisch, Gujarati, Hindi, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Kannada (Indien), Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Malayalam, Marathi, Niederländisch, Norwegisch, Oda, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Swahili, Tamil, Telugu, Thai, Türkisch, Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. Summenwerte - Cut-Offs: 1-4: keine/minimale depressive Symptomatik 5-9: milde depressive Symptomatik 10-14: mittelgradige depressive Symptomatik 15-21: schwere depressive Symptomatik ab 10 Punkten: Hinweis auf vorliegende Symptomatik, weitere Abklärung empfohlen.	9 Items	1) Erwachsene 2) Kinder und Jugendliche ab 12	3) gute Gütekriterien	3) Validierung des Instruments in einer Geflüchtetenpopulation	Alle PHQ-GAD-7-Screener und Übersetzungen können von der angegebenen Webseite heruntergeladen werden. Es ist keine Genehmigung erforderlich, sie zu vervielfältigen, zu übersetzen, abzubilden oder zu verbreiten.	Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001 Sep;16(9):606-13	<a href="https://www.phqscreeners.com/select-screener">https://www.phqscreeners.com/select-screener</a>	
Somatic Symptom Scale (SSS-8)	Somatisierungsstörung	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Deutsch, Englisch, Japanisch Übersetzungen aus Langversion des PHQ ableitbar: Chinesisch (Kantonisch, Mandarisch), Dänisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Malayalam, Niederländisch, Norwegisch, Oda, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Swahili, Tamil, Telugu, Thai, Türkisch, Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch.	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. 0-3 Punkte (minimale bis keine Belastung) 4-7 Punkte (niedrige Belastung) 8-11 Punkte (mittlere Belastung) 12-15 Punkte (hohe Belastung) mehr als 16 Punkte (sehr hohe Belastung)	8 Items, 1 Minute	1) Erwachsene	3) gute Gütekriterien	1) keine spezifische Eignung berichtet	Kurzversion des PHQ-15, daher sind die Übersetzungen des PHQ-15 nutzbar.	Alle PHQ-GAD-7-Screener und Übersetzungen können von der angegebenen Webseite heruntergeladen werden. Es ist keine Genehmigung erforderlich, sie zu vervielfältigen, zu übersetzen, abzubilden oder zu verbreiten.	Gierk B, Köhmann S, Kroenke K, Spangenberg L, Zenger M, Brähler E, Löwe B. (2014). The Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8): A brief measure of somatic symptom burden. JAMA Internal Medicine, 174(3), 399-407.	<a href="https://www.phqscreeners.com/select-screener">https://www.phqscreeners.com/select-screener</a>
Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15)	Somatisierungsstörung	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Englisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch Übersetzungen aus Langversion ableitbar: 1-4: keine/minimale somatische Symptomatik 5-9: milde somatische Symptomatik 10-14: mittelgradige somatische Symptomatik mehr als 15: schwere somatische Symptomatik ab 10: "yellow flag"	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. Summenwerte - Cut-Offs: 1-4: keine/minimale somatische Symptomatik 5-9: milde somatische Symptomatik 10-14: mittelgradige somatische Symptomatik mehr als 15: schwere somatische Symptomatik ab 10: "yellow flag"	15 Items	1) Erwachsene	3) gute Gütekriterien	2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet, Empfehlung von Expert*innen	Übersetzungen sind teilweise nur in der Langversion (PHQ) verfügbar. PHQ-15 kann daraus zusammengestellt werden (Items 1e-1m, sowie Items 2c und 2d). Wird von Experten empfohlen.	Alle PHQ-GAD-7-Screener und Übersetzungen können von der angegebenen Webseite heruntergeladen werden. Es ist keine Genehmigung erforderlich, sie zu vervielfältigen, zu übersetzen, abzubilden oder zu verbreiten.	Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosom Med. 2002 Mar-Apr;64(2):258-66	<a href="https://www.phqscreeners.com/select-screener">https://www.phqscreeners.com/select-screener</a>
Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST-Line)	Substanzkonsum	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Englisch, Malayisch	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden Summenscore -Cut-Offs (pro Substanzkategorie): 0: geringes Risiko 1-2: moderates Risiko 3: hohes Risiko	7-19 Items je nach Ansoerhalten , 3-5 Minuten	1) Erwachsene	3) gute Gütekriterien	1) keine spezifische Eignung berichtet	Englische Online-Version verfügbar, erfasst neben Alkohol 6 weitere Substanzgruppen, von Experten für den Einsatz empfohlen.	Alle PHQ-GAD-7-Screener und Übersetzungen können von der angegebenen Webseite heruntergeladen werden. Es ist keine Genehmigung erforderlich, sie zu vervielfältigen, zu übersetzen, abzubilden oder zu verbreiten.	Ali, R., Meena, S., Eastwood, B., Richards, I., & Marsden, J. (2013). Ultra-rapid screening for substance use disorders: The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST-Line). Drug and Alcohol Dependence, 132(1-2), 352-361. doi:10.1016/j.drugalcdep.2013.03.001	<a href="https://www.assistanet.com.au/assistanet/">https://www.assistanet.com.au/assistanet/</a> <a href="https://www.assistanet.com.au/assistanet/online-version-english/">https://www.assistanet.com.au/assistanet/online-version-english/</a> <a href="https://assistanet.adeledu.au/assistanet/">https://assistanet.adeledu.au/assistanet/</a>
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)	Substanzkonsum	1) online kostenfrei verfügbar	1) online frei verfügbar Arabisch, Bengali, Burmesisch, Chinesisch (Kantonisch, Mandarisch), Dänisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Filipino, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Karen, Katalan, Koreanisch, Malayisch, Mongolisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Swahili, Tamil, Telugu, Thai, Türkisch, Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu, Vietnamesisch.	1) Kann ohne spezielle Ausbildung durchgeführt und mithilfe von Cut-Off-Werten ausgewertet werden. Summenwerte - Cut-Offs: 0-7: geringes Risiko 8-14: erhöhter Gebrauch >15: Abhängigkeit	10 Items	1) Erwachsene	3) gute Gütekriterien	2) Häufige Anwendung in der Praxis berichtet	Wird in den Behandlungsleitlinien zum Screening empfohlen. In verschiedenen Populationen validiert, nicht jedoch für Geflüchtete	Alle Übersetzungen sind unter der angegebenen Webseite verfügbar.	Saunders JB, Aaaland OG, Babor TF, de la Fuente JR and Grant M. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption II. Addiction 1993; 88:791-804	<a href="https://auditscreen.org/">https://auditscreen.org/</a>