

### 1 Qui ?



Aucun symptôme



### Des symptômes ?

Ne participez pas à des tests répétitifs. Veuillez faire un test individuel directement dans un centre de test ou dans une pharmacie.

### 2 Quoi ?

Test PCR groupé  
(pooling)

Test antigénique  
rapide

### 3 Comment ?


1h  
avant :



Salive

Suivre les instructions, par exemple :


- 1) mettre une solution saline dans la bouche
- 2) agiter le liquide dans la bouche pendant 60 secondes.
- 3) cracher dans la cuve
- 4) mâcher et cracher encore une fois
- 5) bien fermer la cuve



Nasopharynx


Échantillonnage par un professionnel

### Pooling par des personnes formées :



L'échantillon de salive est mélangé à d'autres échantillons en dehors du laboratoire d'analyse et est analysé en laboratoire. L'échantillon n'est pas traçable en fonction d'un individu.

### Évaluation par un spécialiste :



Sur place, au cabinet du médecin, en pharmacie ou en laboratoire.

### 4 Résultat : et maintenant ?

**Pool positif**



**Pool négatif**



**Test PCR individuel**  
dans un centre de test ou une pharmacie

Veuillez observer les principes de base

Possibilité d'obtenir un certificat



**Positif**

**Négatif**

**Recommandation :**

- Rester à la maison
- Éviter les contacts
- Porter un masque à l'intérieur

Veuillez observer les principes de base

Veuillez observer les principes de base

**Positif**

**Recommandation :**

- Rester à la maison
- Éviter les contacts
- Porter un masque à l'intérieur

**Négatif**

Possibilité d'obtenir un certificat



Veuillez observer les principes de base