



# COVID-19 : Types de tests recommandés pour les tests répétitifs dans les entreprises

Version du 16.11.2021

Les tests PCR de salive poolés doivent être utilisés en priorité pour les tests répétitifs pour les entreprises. Cette méthode d'analyse est prouvée, fiable et applicable à large échelle. Dans ce qui suit, les possibilités de tests répétitifs sont énumérées par ordre de priorité décroissante :

	Échantillonnage	Effort	Coûts des tests/rémunération
<b>Priorité 1 :</b> Test PCR de salive poolé <sup>1</sup>	<i>simple</i> , grâce à l'auto-échantillonnage de la salive, le pooling doit être effectué de manière décentralisée (sur place)	<ul style="list-style-type: none"><li>- configuration initiale des processus pour la logistique</li><li>- dans le but d'assurer une large faisabilité, le pooling devrait avoir lieu en dehors du laboratoire d'essai</li><li>- temps nécessaire jusqu'au résultat du test : de 5 à 8 heures</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- le laboratoire prend en charge tout le matériel, les coûts logistiques et l'instruction sur l'échantillonnage</li><li>- l'entreprise organise uniquement la collecte des échantillons et l'étiquetage</li></ul>
<b>Priorité 2 :</b> Test rapide antigénique avec application par un professionnel <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>désagréable</i>, car il faut effectuer un prélèvement nasal ou nasopharyngé</li><li>- <i>coûteux en temps</i>, car les échantillons doivent être prélevés par une personne spécifiquement formée, sous la responsabilité d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable de laboratoire</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- emploi ou formation de la personne qui prélève les échantillons</li><li>- coordonner avec le médecin, le pharmacien ou le directeur de laboratoire qui assumera la responsabilité</li><li>- temps nécessaire jusqu'au résultat du test : &lt;1 heure</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- seulement les coûts du matériel des tests sont remboursés (max. 8 CHF)</li><li>- la personne formée qui effectue l'échantillonnage et le prestataire de services responsable doivent être payés par l'entreprise</li></ul>

<sup>1</sup> [Fiche d'information sur le pooling d'échantillons et la manipulation des pools positifs](#)

<sup>2</sup> Seulement les tests rapides antigéniques selon la [liste des tests rapides validés pour le Sars-CoV-2](#) peuvent être utilisés.

Les **autotests** ne sont **pas destinés à des tests répétitifs** en raison du manque de sensibilité/de données et que, jusqu'à présent, aucun résultat convaincant n'a été constaté dans les essais à l'étranger!