

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	<b>Formulaire à usage interne</b>  <b>envoyer par e-mail à la pharmacie de l'hôpital :</b>  <b>E-MAIL</b>	Numéro : F0_002 Valable à partir du 25.03.2022 Créé : OFSP Page : 1de 1
<b>Ordonnance de Veklury® (remdesivir)</b> <b>ambulatoire - nosocomial - découverte fortuite</b>		

*Ou l'étiquette du patient*

Nom / prénom du patient  
 Numéro de référence du patient  
 Année de naissance et sexe du patient  
 Nom / prénom du médecin  
 Nom de l'hôpital

**Conditions de traitement selon les [critères de la CCG/SSI](#) (cocher ce qui convient):**

- Le patient a contracté le SARS-CoV-2, confirmé par un test COVID positif et présente des symptômes qui ne datent généralement pas de plus de 5 jours, et fait partie du groupe des personnes à risque selon les [critères de la CCG /SSI](#).
- Consultation ambulatoire OU
- Infection nosocomiale ou découverte fortuite

Les critères supplémentaires suivants doivent être remplis :

- Âge du patient : au moins 12 ans et au moins 40 kg
- Aucune contre-indication pour Veklury® (recommandation d'utilisation pour les professionnels de santé en anglais sous [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch))
- Patient
  - répond aux [critères de la CCG /SSI](#) OU
  - ne** répond **pas** ou **pas exactement** aux critères CCG /SSI, mais la thérapie a été approuvée par l'équipe multidisciplinaire de l'hôpital.
- Le patient a été informé de la thérapie et a consenti à cette thérapie<sup>1</sup>.

**Date et heure de la thérapie :** ..... **Service :** .....

**Rp.      200 mg remdesivir (jour 1)<sup>1</sup> dans 100 ml NaCl 0.9% ou dans 250 ml NaCl 0.9%**  
**100 mg remdesivir (jour 2)<sup>1</sup> dans 100 ml NaCl 0.9% ou dans 250 ml NaCl 0.9%**  
**100 mg remdesivir (jour 3)<sup>2</sup> dans 100 ml NaCl 0.9% ou dans 250 ml NaCl 0.9%**

Chaque flacon de Veklury® doit être reconstitué **avec de l'eau stérile (19 ml par flacon)**, puis administré en perfusion intraveineuse pendant 30 à 120 minutes après dilution dans du NaCl 0,9%. Il convient de suivre les instructions de préparation de la perfusion (Preparation of Veklury solution for infusion) selon les recommandations d'utilisation pour professionnels de santé (en anglais sur [swissmedicinfo.ch](http://swissmedicinfo.ch)). Les patients doivent être surveillés conformément aux pratiques médicales en vigueur.

**Date :** .....

**Nom, prénom du médecin / tampon :** .....

**Signature :** .....

- Cette ordonnance doit être conservée dans la pharmacie de l'hôpital et envoyée sur demande anonymisée à l'OFSP ([HMR\\_COVID@bag.admin.ch](mailto:HMR_COVID@bag.admin.ch)).

<sup>1</sup> Cette application n'est pas incluse dans l'information destinée aux professionnels de santé de Veklury® (remdesivir). La décision de cette utilisation off-label doit donc être prise par l'équipe multidisciplinaire responsable.