

## Annexe 1 : Tableau synoptique des recommandations de vaccination pour l'automne/hiver 2022/23

Vue d'ensemble des recommandations de vaccination à l'automne/hiver 2022/23 pour les personnes de ≥ 16 ans **déjà vaccinées**

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 <sup>1</sup>	Vaccins <sup>2</sup>	
			Nom	Dosage
Personnes vulnérables (PV : personnes avec des maladies chroniques, ≥ 65 ans, trisomie 21, femmes enceintes <sup>3</sup> ) à partir de 16 ans	Vacciné <sup>4</sup>	<b>1</b> Degré de recommandation : <b>+++</b>	<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 <sup>2</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 <sup>2</sup>	50 µg
			<i>Nuvaxovid</i> <sup>®</sup> <sup>2</sup> sauf femmes enceintes/allaitantes <sup>3</sup>	5 µg
			<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup>	50 µg
Personnel de santé de ≥ 16 ans, personnes assurant la prise en charge de PV	Vacciné	<b>1</b> Degré de recommandation : <b>++</b>	<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 <sup>2</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 <sup>2</sup>	50 µg
			<i>Nuvaxovid</i> <sup>®</sup> <sup>2</sup> sauf femmes enceintes/allaitantes <sup>3</sup>	5 µg
			<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup>	50 µg
Population générale de 16 à 64 ans	Vacciné	<b>1</b> Degré de recommandation : <b>(+)</b>	<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 <sup>2</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 <sup>2</sup>	50 µg
			<i>Nuvaxovid</i> <sup>®</sup> <sup>2</sup> sauf femmes enceintes/allaitantes <sup>3</sup>	5 µg
			<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup>	50 µg

Vue d'ensemble des recommandations de vaccination à l'automne/hiver 2022/23 pour les personnes de ≥ 16 ans **pas encore vaccinées**

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 <sup>1</sup>	Vaccins	
			Nom	Dosage
PV (personnes avec des maladies chroniques, ≥ 65 ans, trisomie 21, femmes enceintes <sup>3</sup> ) à partir de 16 ans	Non vacciné	<b>2</b> avec un intervalle min. de 4 semaines	<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup> <sup>5</sup>	2x 30 µg
			<i>Nuvaxovid</i> <sup>®</sup> sauf femmes enceintes/allaitantes <sup>3</sup>	2x 5 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup> <sup>6,7</sup>	2x 100 µg
Population générale de 16 à 64 ans  Y c. personnel de santé de ≥ 16 ans, personnes assurant la prise en charge de PV	Non vacciné	<b>1</b>	<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1	50 µg
			<i>Nuvaxovid</i> <sup>®</sup> sauf femmes enceintes/allaitantes <sup>3</sup>	5 µg
			<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup>	30 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup>	50 µg
	Non vacciné	<b>Autre possibilité : 2</b> avec un intervalle min. de 4 semaines	<i>Comirnaty</i> <sup>®</sup> <sup>4</sup>	2 x 30 µg
			<i>Nuvaxovid</i> <sup>®</sup> sauf femmes enceintes/allaitantes <sup>3</sup>	2 x 5 µg
			<i>Spikevax</i> <sup>®</sup> <sup>6,7</sup>	2 x 100 µg

<sup>1</sup> Dans tous les cas, il convient de respecter, pour la vaccination de rappel à l'automne 2022, un **intervalle minimal de 4 mois** après l'administration de la dernière dose de vaccin ou après l'infection.

<sup>2</sup> Pour la vaccination de rappel à l'automne 2022 (chez les personnes de ≥ 16 ans qui sont déjà vaccinées) et en fonction de la disponibilité, il est recommandé de privilégier un vaccin à ARNm bivalent ou le *Nuvaxovid*<sup>®</sup>. Ces vaccins, de même que les vaccins à ARNm monovalents, sont appropriés et recommandés afin d'éviter des infections graves.

<sup>3</sup> La vaccination avec le *Nuvaxovid*<sup>®</sup> des femmes enceintes ou qui allaitent n'est pas recommandée pour le moment en raison de l'insuffisance de données relatives à la sécurité.

<sup>4</sup> La recommandation pour une vaccination à l'automne 2022 concerne aussi les personnes qui ont déjà renouvelé la vaccination de rappel.

<sup>5</sup> *Comirnaty*<sup>®</sup> 30µg monovalent conformément à l'autorisation. S'il n'est pas disponible, *Comirnaty*<sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 peut être utilisé; il n'existe pratiquement aucune donnée à ce sujet et il s'agit d'une utilisation *off-label*

<sup>6</sup> Si un vaccin à ARNm est administré, il convient de privilégier le *Comirnaty*<sup>®</sup> pour les personnes de < 30 ans (raison : fort dosage de *Spikevax*<sup>®</sup>).

<sup>7</sup> *Spikevax*<sup>®</sup> 100 µg monovalent conformément à l'autorisation. S'il n'est pas disponible, le *Spikevax*<sup>®</sup> Bivalent Original/Omicron BA.1 peut être utilisé (également 100 µg par dose de vaccin) ; il n'existe pratiquement aucune donnée à ce sujet et il s'agit d'une utilisation hors étiquette (ou *off-label*).

<sup>8</sup> Chez les personnes âgées de 18 ans et plus qui ne peuvent pas se faire vacciner avec un vaccin à ARNm ou à base de protéines pour des raisons médicales, ou qui refusent ces vaccins, le *COVID-19 Vaccine Janssen*<sup>®</sup> peut être utilisé. Consulter l'**annexe 7** pour plus de détails concernant son utilisation et sa recommandation.



### Recommandations spécifiques : enfants et adolescents de 5 à 15 ans<sup>9</sup>

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 <sup>10</sup>	Vaccins	
			Nom	Dosage
Adolescents 12-15 ans	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	Pas de vaccination	-	-
		Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty <sup>® 12</sup> Nuvaxovid <sup>®</sup>	2 x 30 µg 2 x 5 µg
Enfants 5-11 ans	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	Pas de vaccination	-	-
		Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty <sup>® 11</sup>	2 x 10 µg
Adolescents 12-15 ans avec des maladies chroniques	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	1  Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty <sup>® 12</sup>	30 µg
			Nuvaxovid <sup>®</sup>	5 µg
			Comirnaty <sup>® 12</sup> Nuvaxovid <sup>®</sup>	2 x 30 µg 2 x 5 µg
Enfants 5-11 ans avec des maladies chroniques	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	1  Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty <sup>® 11</sup>	10 µg
Comirnaty <sup>® 11</sup>			2 x 10 µg	

### Recommandations spécifiques : personnes présentant une immunodéficience sévère

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 <sup>10</sup>	Vaccins	
			Nom	Dosage
Personnes de ≥12 ans présentant une immunodéficience sévère	Vacciné <sup>4</sup>	1	Comirnaty <sup>®</sup>	30 µg
			Spikevax <sup>® 13</sup>	100 µg
			Comirnaty <sup>® Bivalent Original/Omicron BA.1<sup>14</sup></sup>	30 µg
			Spikevax <sup>® Bivalent Original/Omicron BA.1<sup>13, 14</sup></sup>	100 µg
			Comirnaty <sup>®</sup>	30 µg (par dose)
	Non vacciné	3 + 1	Spikevax <sup>® 13, 15</sup>	100 µg (par dose)
			Comirnaty <sup>® 11</sup>	10 µg (par dose)
Enfants 5-11 ans présentant une immunodéficience sévère	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	2 + sérologie. En l'absence d'anticorps, 3 <sup>e</sup> dose pour la primovaccination	Comirnaty <sup>® 11</sup>	10 µg (par dose)

<sup>9</sup> La vaccination contre le Covid-19 n'est pas recommandée aux enfants de moins de 5 ans.

<sup>10</sup> Dans tous les cas, il convient de respecter, pour la vaccination de rappel à l'automne 2022, un **intervalle minimal de 4 mois** après l'administration de la dernière dose de vaccin ou après l'infection.

<sup>11</sup> Aucune recommandation concernant l'utilisation de Spikevax<sup>®</sup> chez les enfants de 5 à 11 ans n'a été formulée car les données disponibles sur l'efficacité et la sécurité pour ce vaccin dans ce groupe d'âge sont limitées.

<sup>12</sup> Si un vaccin à ARNm est administré, il est recommandé de privilégier le Comirnaty<sup>®</sup> pour la vaccination de toutes les personnes de <16 ans.

<sup>13</sup> Dans ce cas, il convient de privilégier le Comirnaty<sup>®</sup> pour les personnes de < 30 ans (raison : fort dosage de Spikevax<sup>®</sup>).

<sup>14</sup> L'utilisation de vaccins à ARNm bivalents est recommandée dans ce groupe de personne selon l'avis du médecin traitant.

<sup>15</sup> À la place des vaccins à ARNm monovalents, selon l'avis du médecin traitant, un vaccin à ARNm bivalent peut également être utilisé (100 µg Spikevax<sup>® Bivalent Original/Omicron BA.1 [off-label]</sup> ou 30 µg Comirnaty<sup>® Bivalent Original /Omicron BA.1 [off-label]</sup>).

