



ADDICTION | SUISSE

act-info - SAMBAD

Prise en charge ambulatoire
des problèmes de dépendance

Résultats du monitoring de la clientèle 2021



Jeanne Vorlet & Etienne Maffli

Lausanne, novembre 2022



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher et Diane Jaccard pour la conception graphique de ce rapport.

Compléments d'information: Jeanne Vorlet, Tel. 021 321 29 46,
e-mail jvorlet@addictionsuisse.ch

Réalisation: Jeanne Vorlet & Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail rbischof@addictionsuisse.ch

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2022

Citation recommandée: Vorlet, J., Maffli, E. (2022). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats du monitoring de la clientèle 2021.
Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy <i>information</i>	6
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide en matière de dépendance (SAMBAD).....	6
Explications concernant les graphiques et tableaux.....	7

TRENDS

G1	Evolution de la demande de prise en charge dans le domaine des substances : trends 2013-2021
G2	Evolution de la demande de prise en charge dans le domaine des comportements : trends 2013-2021
G3	Evolution de la demande de prise en charge selon le problème principal (trends indexés 2013-2021)
G4	Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2021
G5	Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2021
G6	Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2021
G7	Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2021
G8	Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2021
G9	Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2021
G10	Problème principal à l'admission tabac: évolution 2013-2021
G11	Problème principal à l'admission jeux de hasard: évolution 2013-2021
G12	Problème principal à l'admission troubles alimentaires : évolution 2013-2021
G13	Problème principal à l'admission dépendances aux ordinateurs/internet : évolution 2013-2021

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2021)

T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2021)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2021)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2021)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes
T15.2a	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes
T15.2b	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), femmes
T15.2c	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes et femmes
T16.1a	Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2021), hommes
T16.1b	Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2021), femmes
T16.1c	Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2021), hommes et femmes
T16.2a	Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2021), hommes
T16.2b	Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2021), femmes
T16.2c	Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2021), hommes et femmes
T17	Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2021)
T18.1	Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
T18.2	Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
T19.1a	Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2021), hommes
T19.1b	Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2021), femmes
T19.1c	Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2021), hommes et femmes
T19.2a	Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2021), hommes

- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2021), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2021), hommes et femmes
- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2021), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2021), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2021), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours des 12 derniers mois (2021), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours des 12 derniers mois (2021), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours des 12 derniers mois (2021), hommes et femmes
- T25 Proches : lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2021)
- T26 Proches : problème principal de la tierce personne (2021)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2021)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

-
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
 - T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
 - T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)
 - T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2021)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse :

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide en matière de dépendance sans traitements de substitution ni traitements avec prescription d'héroïne)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés dans l'ensemble des domaines de traitement est effectuée dès 2018 par Addiction Suisse.

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide en matière de dépendance (SAMBAD)

Les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits en 2004 dans le secteur ambulatoire de l'aide en matière de dépendance (sans traitements par agonistes opioïdes (TAO)) et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les questionnaires révisés ont été introduits en 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. Toutes les institutions n'ont cependant pas pu implémenter les questionnaires révisés. En outre, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire de façon à répondre aux différents besoins. Ces particularités expliquent en partie pourquoi il y a un nombre relativement élevé de valeurs manquantes pour certaines questions.

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance (sans TAO) en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

Toutes les institutions proposant une aide individuelle ambulatoire en matière de dépendance ont été invitées à participer au monitoring de la clientèle au début des enquêtes dans le secteur ambulatoire. Cette invitation leur est également rappelée chaque année dans le cadre de l'enquête *act-info* sur les institutions (voir ci-dessous). Les offres à bas seuil, les foyers, les appartements protégés ainsi que les institutions qui ne proposent pas de prise en charge individuelle ciblée ne sont pas inclus. De plus, les nombreuses institutions axées uniquement sur le tabac ne sont pas incluses dans le monitoring en raison de leur mode de traitement différent (souvent des cours sans prise en charge individuelle). Dans le domaine cible de SAMBAD, la participation des institutions n'est pas obligatoire, de sorte que des lacunes - surtout dans le domaine médical - existent. Le faible nombre d'institutions médicales participantes s'explique par leur participation à d'autres statistiques. En 2021, 54 institutions du secteur ambulatoire de l'aide en matière de dépendance (sans TAO) ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit principalement de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de

services polyvalents offrant à côté d'autres prestations également une aide pour les problèmes addictifs. Les Institutions qui ne participent pas au monitoring *act-info* ont été interrogées dans le cadre d'une vaste enquête ayant pour objectif une estimation de l'ensemble de la demande en matière de traitement des addictions (enquête auprès des institutions). Les résultats de cette enquête figurent dans le rapport global *act-info* (rapport annuel 2021) publié également fin 2022.

Explications concernant les graphiques et tableaux

La première partie présente les tendances de base du monitoring *act-info* dans le domaine de l'aide ambulatoire en matière de dépendance (sans TAO) sous forme de graphiques (2013-2021). Les thèmes retenus comprennent la demande en matière de traitement, la répartition des sexes, la fréquence de consommation et la structure des âges en fonction du problème principal (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotiques/sédatifs, tabac, jeux de hasard, troubles alimentaires et dépendances aux ordinateurs/Internet).

La deuxième partie présente des résultats détaillés concernant les admissions de l'année de référence 2021 (couleur de fond verte) et la troisième partie les résultats concernant les sorties (couleur de fond bleue). Ces statistiques descriptives prennent en compte toutes les questions des instruments de l'enquête. Il convient de distinguer deux types de tableaux :


- Pour les questions dont les catégories de réponses sont codées distinctement sur une échelle nominale (par exemple "état civil") ou pour des données numériques recodées en catégories distinctes comme des tranches d'âge, le tableau indique les fréquences (pourcentages) des catégories de réponses correspondantes.
- Pour les questions comportant des données numériques de variables à échelle métrique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, quartiles inférieur et supérieur)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects sociodémographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux-euses) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu ou indéterminé).


Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Celui-ci est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au-dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

G1 Evolution de la demande de prise en charge dans le domaine des substances : trends 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante




Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).

G2 Evolution de la demande de prise en charge dans le domaine des comportements : trends 2013-2021







Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante




Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).

G3 Evolution de la demande de prise en charge selon le problème principal (trends indexés 2013-2021)





Trends indexés du nombre d'admissions enregistrées dans les institutions avec une participation constante (2013=100%)


G4 Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante
 Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).



Fréquence de consommation durant les 30 jours précédant l'admission





G5 Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante


Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).



Fréquence de consommation durant les 30 jours précédant l'admission





G6 Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante


Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).



Fréquence de consommation durant les 30 jours précédant l'admission





G7 Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante


Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).



Fréquence de consommation durant les 30 jours précédant l'admission





G8 Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante


Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).





Fréquence de consommation durant les 30 jours précédant l'admission




G10 Problème principal à l'admission tabac: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante
Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).



Quantité de cigarettes fumées par jour durant les 30 jours précédant l'admission





G11 Problème principal à l'admission jeux de hasard: évolution 2013-2021




Nombre d'admissions enregistrées par les institutions avec une participation constante

Le nombre de premières admissions a été ajusté au nombre total d'admissions afin de permettre une comparaison directe (données manquantes extrapolées).



Fréquence de manifestation du comportement durant les 30 jours précédant l'admission



T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	67.6			72.2			81.6			79.1			23.7			63.5		3926	
femmes	32.4			27.8			18.4			20.9			76.3			36.5		2260	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	1691	812	2503	109	42	151	418	94	512	869	229	1098	238	766	1004	3926	2260	6186	6186
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	6.1	4.6	1.8	1.6	1.6	2.0	2.5	2.2	133
15-19	1.9	2.0	1.9	0.9	2.4	1.3	3.1	16.0	5.5	51.1	55.0	51.9	4.0	1.5	2.1	15.6	10.3	13.6	839
20-24	3.7	3.8	3.8	9.3	11.9	10.0	10.0	11.7	10.4	14.2	12.7	13.8	1.8	4.3	3.7	8.2	6.4	7.5	463
25-29	7.2	5.8	6.8	6.5	9.5	7.3	22.7	16.0	21.5	12.3	8.7	11.6	7.6	5.8	6.2	11.2	7.5	9.8	603
30-34	12.1	7.3	10.5	9.3	16.7	11.3	22.2	20.2	21.9	7.4	5.7	7.0	5.8	9.2	8.5	11.9	8.7	10.7	659
35-39	13.3	13.5	13.3	16.7	16.7	16.7	18.2	16.0	17.8	5.1	5.7	5.2	9.0	11.1	10.6	11.6	10.8	11.3	695
40-44	14.0	11.5	13.2	15.7	4.8	12.7	12.9	13.8	13.1	2.4	3.5	2.6	7.6	12.6	11.4	10.2	10.7	10.4	637
45-49	11.1	14.0	12.0	17.6	16.7	17.3	6.2	1.1	5.3	1.7	0.4	1.5	11.7	13.8	13.3	7.6	10.9	8.8	539
50-54	12.9	15.7	13.8	11.1	9.5	10.7	2.6	1.1	2.3	0.8	1.3	0.9	17.9	15.3	15.9	8.2	12.1	9.6	591
55-59	10.5	9.1	10.0	10.2	9.5	10.0	0.5	4.3	1.2	0.7	0.4	0.6	13.9	11.2	11.9	6.1	8.2	6.9	424
60-64	6.6	7.8	7.0	1.9	0.0	1.3	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	9.0	4.8	5.8	3.9	5.0	4.3	262
65-69	3.5	5.2	4.0	0.0	2.4	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	4.5	4.7	4.6	1.9	3.8	2.6	159
70-74	2.0	2.1	2.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	2.7	1.2	1.9	1.4	87
75 et plus	1.1	2.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	1.8	1.7	1.8	0.6	1.4	0.9	56
N**	1690	809	2499	108	42	150	418	94	512	869	229	1098	223	747	970	3909	2238	6147	6147
données manquantes	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	19	34	17	22	39	39
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.8	46.8	45.4	41.8	39.1	41.0	34.1	31.8	33.7	22.9	22.4	22.8	45.2	45.6	45.5	36.7	41.3	38.4	
écart-type	13.2	13.5	13.3	11.2	12.0	11.5	8.7	10.2	9.0	8.9	9.6	9.1	17.0	14.1	14.8	15.1	15.9	15.6	
1er quartile	34.9	37.2	35.9	34.3	30.8	32.6	27.7	23.5	27.3	16.7	16.3	16.7	34.2	36.5	36.3	24.5	29.1	25.9	
valeur médiane	44.3	47.5	45.1	42.4	37.7	41.7	33.5	31.9	33.2	18.6	17.8	18.3	49.3	46.3	46.8	35.5	41.6	37.5	
3e quartile	54.4	55.6	54.7	49.8	47.3	49.8	39.4	38.3	39.1	27.0	25.8	26.9	56.6	54.9	55.3	48.1	53.1	50.3	
N**	1690	809	2499	108	42	150	418	94	512	869	229	1098	235	751	986	3921	2242	6163	
données manquantes	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	15	18	5	18	23	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	49.8	38.9	46.3	72.0	56.8	67.9	73.8	76.9	74.3	90.5	90.0	90.4	30.0	28.4	28.7	64.4	46.9	58.1	3366
marié-e	29.1	27.9	28.7	12.0	13.5	12.4	12.5	4.4	11.0	5.3	3.3	4.9	54.8	48.2	49.8	21.2	28.8	23.9	1386
séparé-e	3.8	4.3	4.0	2.0	5.4	2.9	3.0	1.1	2.6	0.8	1.4	1.0	1.8	3.7	3.2	2.7	3.5	3.0	171
divorcé-e	15.1	23.0	17.6	12.0	18.9	13.9	8.0	15.4	9.4	2.1	3.3	2.3	12.0	17.4	16.1	9.8	17.1	12.4	718
veuf/veuve	1.1	4.1	2.1	1.0	5.4	2.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.9	0.2	0.5	1.8	1.5	0.6	2.6	1.3	78
partenariat enregistré	1.1	1.8	1.4	1.0	0.0	0.7	2.5	2.2	2.4	1.3	0.9	1.3	0.9	0.6	0.7	1.3	1.2	1.2	72
N**	1600	761	2361	100	37	137	400	91	491	828	211	1039	217	677	894	3717	2074	5791	5791
données manquantes	91	51	142	9	5	14	18	3	21	41	18	59	21	89	110	209	186	395	395
Nationalité*																			
Suisse/FL	75.7	79.5	76.9	74.7	79.4	76.1	72.9	76.7	73.7	79.8	84.3	80.7	82.9	81.8	82.1	77.0	81.8	78.7	4249
UE	13.8	13.2	13.6	14.5	11.8	13.7	14.9	14.4	14.8	9.0	7.6	8.7	8.3	7.4	7.6	12.2	9.3	11.1	599
autre	10.6	7.4	9.5	10.8	8.8	10.3	12.2	8.9	11.6	11.2	8.1	10.6	8.8	10.8	10.3	10.9	9.0	10.2	548
N**	1468	707	2175	83	34	117	377	90	467	747	197	944	216	693	909	3385	2011	5396	5396
données manquantes	223	105	328	26	8	34	41	4	45	122	32	154	22	73	95	541	249	790	790

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	9.5	8.2	9.1	1.0	2.6	1.4	8.9	7.6	8.7	4.9	3.2	4.5	13.8	10.6	11.4	7.6	7.7	7.6	462	
périphérie des grands centres	20.3	17.4	19.3	13.5	7.7	11.9	22.9	16.3	21.7	12.0	11.4	11.9	27.6	20.3	22.0	17.5	15.9	16.9	1024	
villes de moyenne importance	12.3	14.9	13.1	11.5	5.1	9.8	13.5	12.0	13.2	23.2	25.5	23.7	12.1	14.9	14.2	15.7	17.1	16.2	982	
petites villes	31.3	32.5	31.7	51.9	46.2	50.3	39.6	39.1	39.5	32.7	35.5	33.3	23.3	31.4	29.5	33.5	32.7	33.2	2007	
campagne	26.6	27.0	26.7	22.1	38.5	26.6	15.0	25.0	16.8	27.2	24.5	26.6	23.3	22.8	22.9	25.7	26.5	26.0	1573	
N**	1663	797	2460	104	39	143	414	92	506	865	220	1085	232	725	957	3865	2183	6048	6048	
données manquantes	28	15	43	5	3	8	4	2	6	4	9	13	6	41	47	61	77	138	138	
Type de ménage (30 derniers jours)*																				
seul-e en ménage	40.1	35.6	38.6	39.5	32.4	37.5	35.6	32.1	34.9	14.3	13.6	14.2	12.1	11.3	11.4	30.0	26.6	28.9	1403	
avec famille d'origine	8.8	4.8	7.5	18.6	8.8	15.8	17.8	26.2	19.4	61.3	56.8	60.4	17.2	3.9	6.6	26.7	17.7	23.8	1158	
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	42.6	51.6	45.5	25.6	44.1	30.8	35.9	26.2	34.0	11.2	12.1	11.4	70.7	82.3	79.9	32.8	46.3	37.1	1804	
avec des amis ou d'autres personnes	4.3	3.4	4.0	3.5	2.9	3.3	5.1	2.4	4.6	4.2	5.3	4.4	0.0	0.9	0.7	4.2	3.7	4.1	197	
en prison	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	0.8	1.2	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	16	
institution/foyer	2.4	2.6	2.4	5.8	5.9	5.8	3.1	10.7	4.6	4.6	8.3	5.3	0.0	0.4	0.3	3.4	3.2	3.3	162	
hôpital/clinique	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	8	
autre	1.3	1.4	1.4	5.8	5.9	5.8	1.4	1.2	1.4	4.3	3.4	4.1	0.0	1.3	1.0	2.3	2.1	2.2	109	
N**	1500	705	2205	86	34	120	354	84	438	788	206	994	58	231	289	3307	1550	4857	4857	
données manquantes	191	107	298	23	8	31	64	10	74	81	23	104	180	535	715	619	710	1329	1329	
Situation de domicile (30 dernier jours)*																				
logement stable	94.3	94.1	94.2	83.5	85.3	84.0	90.7	88.0	90.1	93.1	92.2	92.9	98.3	95.7	96.2	93.2	94.2	93.5	4550	
logement instable/SDF	2.6	2.5	2.6	9.4	5.9	8.4	5.4	6.0	5.5	2.9	1.9	2.7	1.7	3.8	3.4	3.1	2.8	3.0	147	
en prison	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	14	
institution/foyer/hôpital/autre	2.7	3.4	2.9	5.9	8.8	6.7	3.4	6.0	3.9	3.8	5.8	4.2	0.0	0.4	0.3	3.2	2.9	3.1	153	
N**	1492	715	2207	85	34	119	353	83	436	786	206	992	59	234	293	3299	1565	4864	4864	
données manquantes	199	97	296	24	8	32	65	11	76	83	23	106	179	532	711	627	695	1322	1322	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

Type de relation de couple*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
sans partenaire, seul-e	42.8	40.7	42.1	52.2	50.0	51.7	41.9	55.9	44.4	72.9	63.4	71.0	20.0	20.2	20.1	51.6	41.3	48.1	1482
relations temporaires	3.3	2.3	3.0	2.2	0.0	1.7	1.3	0.0	1.1	3.0	6.3	3.6	1.8	1.4	1.5	2.7	2.4	2.6	79
partenaire fixe, vivant séparé	11.5	13.6	12.2	10.9	0.0	8.6	18.1	23.5	19.0	13.0	23.2	15.0	9.1	14.1	13.1	12.0	15.7	13.3	409
partenaire fixe, ménage commun	42.4	43.3	42.7	34.8	50.0	37.9	38.7	20.6	35.4	11.1	7.1	10.3	69.1	64.3	65.3	33.7	40.6	36.1	1112
N**	963	469	1432	46	12	58	155	34	189	468	112	580	55	213	268	2029	1053	3082	3082
données manquantes	728	343	1071	63	30	93	263	60	323	401	117	518	183	553	736	1897	1207	3104	3104
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	45.2	40.8	43.7	59.0	44.4	56.3	60.7	72.0	62.5	92.1	88.5	91.4	41.3	29.5	32.3	63.5	50.2	58.6	1656
1 enfant	18.1	23.1	19.9	25.6	11.1	22.9	21.5	16.0	20.6	3.1	6.6	3.8	20.0	12.1	14.0	13.1	15.1	13.8	390
2 enfants	24.2	23.1	23.8	12.8	44.4	18.8	14.1	8.0	13.1	2.9	3.3	3.0	26.3	39.0	36.0	15.9	23.0	18.5	522
3 enfants ou plus	12.4	12.9	12.6	2.6	0.0	2.1	3.7	4.0	3.8	1.9	1.6	1.8	12.5	19.3	17.7	7.5	11.8	9.1	256
N**	756	402	1158	39	9	48	135	25	160	480	122	602	80	264	344	1788	1036	2824	2824
données manquantes	935	410	1345	70	33	103	283	69	352	389	107	496	158	502	660	2138	1224	3362	3362
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	75.1	69.9	73.3	87.5	50.0	77.3	83.3	90.9	84.6	86.8	82.2	85.9	51.5	41.9	44.2	78.8	66.7	74.3	1756
1 enfant	10.2	16.9	12.5	6.3	50.0	18.2	8.3	9.1	8.5	2.6	4.7	3.0	14.7	16.7	16.3	7.3	13.5	9.6	228
2 enfants	11.1	9.3	10.5	6.3	0.0	4.5	5.6	0.0	4.6	6.1	11.2	7.2	27.9	32.1	31.1	10.2	15.2	12.1	285
3 enfants ou plus	3.6	3.9	3.7	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	4.5	1.9	4.0	5.9	9.3	8.5	3.6	4.5	4.0	94
N**	619	332	951	16	6	22	108	22	130	424	107	531	68	215	283	1483	880	2363	2363
données manquantes	1072	480	1552	93	36	129	310	72	382	445	122	567	170	551	721	2443	1380	3823	3823

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	2.7	3.5	2.9	3.9	17.9	7.6	2.1	8.4	3.4	14.9	21.2	16.2	11.0	4.5	6.1	7.4	7.5	7.4	350
école obligatoire	11.6	10.9	11.4	23.4	25.0	23.8	12.7	26.5	15.4	50.8	47.8	50.2	6.8	6.9	6.9	22.4	17.3	20.6	974
formation de transition	1.2	2.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	1.9	1.6	1.9	2.1	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	86
formation générale sans maturité	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.1	0.5	0.2	0.0	1.9	1.5	0.5	1.2	0.7	35
formation prof. de base et apprentissage	56.6	55.5	56.2	63.6	50.0	60.0	63.9	54.2	61.9	23.5	20.7	22.9	40.4	48.7	46.7	47.3	46.5	47.0	2221
maturité ou école normale	3.4	4.6	3.8	1.3	3.6	1.9	2.1	3.6	2.4	3.9	3.3	3.7	4.8	6.7	6.2	3.6	5.8	4.4	206
formation prof. supérieure	10.3	9.7	10.1	3.9	3.6	3.8	10.2	3.6	8.9	2.1	1.1	1.9	13.0	11.0	11.5	7.6	8.0	7.7	366
haute école spécialisée et université	13.3	11.9	12.8	3.9	0.0	2.9	5.1	3.6	4.8	2.8	3.8	3.0	20.5	18.1	18.7	9.1	11.4	9.9	469
doctorat ou habilitation	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	19
N**	1340	631	1971	77	28	105	332	83	415	723	184	907	146	464	610	3086	1640	4726	4726
<i>données manquantes</i>	351	181	532	32	14	46	86	11	97	146	45	191	92	302	394	840	620	1460	1460
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	13.0	22.2	15.8	31.4	42.9	34.7	22.2	29.8	23.8	16.5	20.6	17.3	-	0.0	0.0	15.5	24.8	18.0	363
apprenti-e, stagiaire	1.8	1.8	1.8	2.9	0.0	2.0	3.3	14.0	5.6	22.0	14.3	20.4	-	0.0	0.0	6.3	5.4	6.1	123
mancœuvre, aide	5.1	1.8	4.2	2.9	0.0	2.0	4.7	5.3	4.8	5.1	0.0	4.1	-	0.0	0.0	4.6	2.2	4.0	80
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.8	5.7	5.8	2.9	7.1	4.1	4.7	3.5	4.5	4.7	3.2	4.4	-	0.0	0.0	5.5	5.6	5.5	111
ouvrier/ère formé-e (CFC)	12.8	12.6	12.7	25.7	14.3	22.4	20.3	10.5	18.2	12.2	11.1	11.9	-	33.3	33.3	14.6	12.0	13.9	281
contremaître-sse	2.6	0.6	2.0	5.7	0.0	4.1	1.9	0.0	1.5	2.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	2.6	0.4	2.0	40
employé-e non qualifié-e	25.2	29.7	26.5	14.3	14.3	14.3	22.6	17.5	21.6	12.2	11.1	11.9	-	33.3	33.3	21.7	23.5	22.2	449
empl. qualifié-e, cadre moyen	16.2	11.4	14.8	2.9	21.4	8.2	8.5	8.8	8.6	4.7	1.6	4.1	-	0.0	0.0	11.8	9.6	11.2	227
employé-e, cadre supérieur	4.8	4.5	4.7	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.3	1.6	1.6	1.6	-	0.0	0.0	4.0	3.3	3.8	77
indépendant-e	11.0	8.1	10.2	8.6	0.0	6.1	7.1	1.8	5.9	3.1	4.8	3.5	-	33.3	33.3	8.2	6.3	7.7	156
écolier/ère, étudiant-e	1.3	1.5	1.3	2.9	0.0	2.0	0.5	8.8	2.2	15.3	30.2	18.2	-	0.0	0.0	4.7	6.1	5.0	102
autre statut	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.9	-	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	12
N**	797	333	1130	35	14	49	212	57	269	255	63	318	0	3	3	1481	540	2021	2021
<i>données manquantes</i>	894	479	1373	74	28	102	206	37	243	614	166	780	238	763	1001	2445	1720	4165	4165

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	59.5	49.0	56.2	25.5	17.1	23.3	57.8	39.1	54.3	27.8	21.4	26.5	61.0	66.3	65.0	49.6	45.3	48.2	2467
économies, épargne	1.6	1.5	1.6	1.1	0.0	0.8	1.3	2.3	1.5	0.7	0.5	0.7	1.2	0.4	0.6	1.3	1.0	1.2	61
rente (AVS, AI ou autre)	14.7	22.0	17.1	16.0	34.3	20.9	6.9	9.2	7.3	4.2	5.3	4.4	9.8	11.1	10.8	10.5	16.8	12.5	640
aide sociale	11.3	9.7	10.8	34.0	22.9	31.0	14.5	21.8	15.9	12.5	13.1	12.6	4.9	2.8	3.3	11.9	9.4	11.1	568
assurance-chômage	5.4	4.7	5.2	12.8	8.6	11.6	9.0	6.9	8.6	3.1	2.4	3.0	2.4	0.8	1.2	5.3	3.5	4.7	241
soutien du/de la partenaire	0.8	6.9	2.8	1.1	11.4	3.9	1.3	3.4	1.7	0.7	1.0	0.8	0.0	11.9	9.0	0.8	6.0	2.5	127
soutien parents/proches/amis	2.9	3.1	3.0	4.3	2.9	3.9	4.2	11.5	5.6	49.4	52.9	50.1	20.7	6.3	9.9	17.6	15.3	16.9	864
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
autres revenus illégaux	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assurance d'indemnités journalières	2.4	1.3	2.0	2.1	0.0	1.6	2.1	2.3	2.1	0.1	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	1.4	72
autre	1.3	1.6	1.4	3.2	2.9	3.1	1.8	1.1	1.7	1.2	1.0	1.2	0.0	0.4	0.3	1.3	1.3	1.3	66
N**	1574	741	2315	94	35	129	379	87	466	808	206	1014	82	252	334	3492	1622	5114	5114
<i>données manquantes</i>	<i>117</i>	<i>71</i>	<i>188</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>22</i>	<i>39</i>	<i>7</i>	<i>46</i>	<i>61</i>	<i>23</i>	<i>84</i>	<i>156</i>	<i>514</i>	<i>670</i>	<i>434</i>	<i>638</i>	<i>1072</i>	<i>1072</i>
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	56.3	30.3	48.1	25.0	14.7	22.2	56.4	20.7	49.8	21.7	13.0	20.0	66.1	42.7	47.6	46.1	28.6	40.6	1977
activité à temps partiel	5.0	21.3	10.1	3.3	2.9	3.2	3.9	12.6	5.6	3.1	6.0	3.7	0.0	30.0	23.8	3.8	17.8	8.2	397
jobs occasionnels	0.9	0.9	0.9	2.2	0.0	1.6	0.8	1.1	0.9	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.9	44
en formation	3.4	3.2	3.3	3.3	2.9	3.2	3.9	16.1	6.2	51.8	58.5	53.2	17.9	7.0	9.3	18.5	17.2	18.1	880
sans travail, en quête d'emploi	8.7	8.0	8.5	16.3	11.8	15.1	13.1	18.4	14.1	7.5	6.5	7.3	1.8	1.4	1.5	8.9	7.0	8.3	404
sans travail, sans recherche d'emploi	5.5	7.8	6.2	22.8	14.7	20.6	10.2	9.2	10.0	4.6	5.5	4.8	0.0	3.8	3.0	6.1	6.0	6.1	295
rentier/rentière	8.3	12.6	9.7	4.3	17.6	7.9	1.8	5.7	2.6	0.8	2.0	1.0	7.1	8.5	8.2	4.7	9.2	6.1	298
incapacité de travail	7.6	9.2	8.1	16.3	14.7	15.9	6.6	12.6	7.7	3.6	4.5	3.8	1.8	1.9	1.9	6.3	7.5	6.6	323
femme/homme au foyer	0.2	3.6	1.3	1.1	11.8	4.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0	3.3	2.6	0.1	2.8	1.0	47
autre	4.2	3.2	3.9	5.4	8.8	6.3	3.1	2.3	3.0	5.9	2.5	5.2	5.4	1.4	2.2	4.6	3.1	4.1	200
N**	1509	696	2205	92	34	126	381	87	468	782	200	982	56	213	269	3357	1508	4865	4865
<i>données manquantes</i>	<i>182</i>	<i>116</i>	<i>298</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>25</i>	<i>37</i>	<i>7</i>	<i>44</i>	<i>87</i>	<i>29</i>	<i>116</i>	<i>182</i>	<i>553</i>	<i>735</i>	<i>569</i>	<i>752</i>	<i>1321</i>	<i>1321</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	27.8	21.6	26.1	35.7	14.3	28.6	33.3	11.1	28.4	40.9	58.3	42.9	44.4	43.2	43.5	32.6	26.5	30.9	253
moins de 1000 fr.	2.1	6.4	3.2	7.1	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	4.2	4.5	4.3	35
de 1001 à 2000 fr.	10.1	20.8	13.0	14.3	14.3	14.3	6.3	27.8	11.1	14.0	8.3	13.3	33.3	16.2	19.6	11.1	21.1	13.8	113
de 2001 à 3000 fr.	10.1	12.8	10.8	14.3	28.6	19.0	14.3	22.2	16.0	8.6	8.3	8.6	0.0	0.0	0.0	9.7	10.3	9.9	81
de 3001 à 4000 fr.	12.4	11.2	12.1	14.3	0.0	9.5	6.3	11.1	7.4	6.5	8.3	6.7	0.0	0.0	0.0	9.7	8.5	9.4	77
de 4001 à 5000 fr.	10.1	12.8	10.8	14.3	28.6	19.0	15.9	11.1	14.8	8.6	0.0	7.6	0.0	29.7	23.9	9.9	14.8	11.2	92
de 5001 à 6000 fr.	12.1	8.0	11.0	0.0	14.3	4.8	7.9	11.1	8.6	7.5	16.7	8.6	22.2	10.8	13.0	11.1	9.9	10.7	88
de 6001 à 8000 fr.	7.4	1.6	5.8	0.0	0.0	0.0	9.5	5.6	8.6	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.8	4.8	39
de 8001 à 10 000 fr.	3.6	2.4	3.2	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	2.4	20
de 10 001 à 15 000 fr.	3.3	0.8	2.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	1.6	13
plus de 15 000 fr.	1.2	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0	8
N**	338	125	463	14	7	21	63	18	81	93	12	105	9	37	46	596	223	819	819
<i>données manquantes</i>	<i>1353</i>	<i>687</i>	<i>2040</i>	<i>95</i>	<i>35</i>	<i>130</i>	<i>355</i>	<i>76</i>	<i>431</i>	<i>776</i>	<i>217</i>	<i>993</i>	<i>229</i>	<i>729</i>	<i>958</i>	<i>3330</i>	<i>2037</i>	<i>5367</i>	<i>5367</i>
Dettes*																			
aucune dette	60.2	68.2	62.8	21.2	27.3	22.7	51.3	61.3	53.4	81.7	80.3	81.4	88.5	93.7	92.6	63.8	75.1	67.4	1386
jusqu'à 5000 fr.	4.1	3.5	3.9	3.0	9.1	4.5	8.7	19.4	11.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	4.1	2.9	3.7	76
de 5001 à 10 000 fr.	3.5	2.1	3.0	0.0	0.0	0.0	7.8	3.2	6.8	2.6	1.3	2.4	0.0	1.1	0.8	3.6	2.4	3.2	66
de 10 001 à 25 000 fr.	4.6	1.0	3.5	3.0	9.1	4.5	3.5	3.2	3.4	2.9	1.3	2.6	3.8	1.1	1.7	4.2	1.7	3.4	69
de 25 001 à 50 000 fr.	2.6	1.0	2.1	15.2	0.0	11.4	5.2	0.0	4.1	0.6	0.0	0.5	3.8	1.1	1.7	2.6	1.1	2.1	43
de 50 001 à 100 000 fr.	19.4	20.4	19.7	51.5	54.5	52.3	15.7	12.9	15.1	8.9	15.8	10.1	0.0	3.2	2.5	17.0	14.6	16.3	334
plus de 100 000 fr.	2.5	1.0	2.0	3.0	0.0	2.3	1.7	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	3.8	0.0	0.8	1.8	0.8	1.5	30
montant inconnu	3.1	2.8	3.0	3.0	0.0	2.3	6.1	0.0	4.8	1.4	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	2.5	51
N**	608	289	897	33	11	44	115	31	146	349	76	425	26	95	121	1392	663	2055	2055
<i>données manquantes</i>	<i>1083</i>	<i>523</i>	<i>1606</i>	<i>76</i>	<i>31</i>	<i>107</i>	<i>303</i>	<i>63</i>	<i>366</i>	<i>520</i>	<i>153</i>	<i>673</i>	<i>212</i>	<i>671</i>	<i>883</i>	<i>2534</i>	<i>1597</i>	<i>4131</i>	<i>4131</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	87.1	99.0	90.7	28.6	100.0	44.4	65.5	70.0	66.7	83.3	100.0	85.5	84.0	96.9	87.5	407
emprisonnement	4.0	0.0	2.8	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.5	3.8	0.0	2.8	13
détention préventive	6.7	0.0	4.7	14.3	0.0	11.1	20.7	20.0	20.5	10.4	0.0	9.1	8.6	1.6	6.7	31
emprisonnement et détention préventive	2.2	1.0	1.9	42.9	0.0	33.3	13.8	10.0	12.8	0.0	0.0	0.0	3.6	1.6	3.0	14
N**	224	97	321	7	2	9	29	10	39	48	7	55	338	127	465	465
<i>données manquantes</i>	1467	715	2182	102	40	142	389	84	473	821	222	1043	3350	1367	4717	4717
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	42.1	100.0	45.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	100.0	36.7	50.0	37.5	12
> 1 à 2 mois	5.3	0.0	5.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	3.3	0.0	3.1	1
> 2 à 6 mois	21.1	0.0	20.0	25.0	-	25.0	75.0	0.0	60.0	0.0	-	0.0	26.7	0.0	25.0	8
> 6 à 12 mois	10.5	0.0	10.0	50.0	-	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.3	0.0	12.5	4
plus de 1 an	21.1	0.0	20.0	25.0	-	25.0	25.0	100.0	40.0	0.0	-	0.0	20.0	50.0	21.9	7
N**	19	1	20	4	0	4	4	1	5	2	0	2	30	2	32	32
<i>données manquantes</i>	10	0	10	1	0	1	6	2	8	6	0	6	24	2	26	26

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N	
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																				
condamnation/mesure/justice/police	14.1	5.4	11.3	9.6	5.7	8.5	13.6	6.9	12.3	43.9	40.9	43.3	1.5	0.3	0.6	18.7	7.3	14.6	830	
cabinet médical	10.0	11.8	10.6	11.7	17.1	13.2	2.9	12.6	4.8	3.5	4.8	3.8	2.5	4.5	4.0	7.0	8.6	7.5	427	
institution spécialisée dans les addictions	5.2	5.4	5.3	10.6	5.7	9.3	5.6	3.4	5.2	1.0	1.4	1.1	3.4	2.6	2.8	4.0	3.7	3.9	219	
autre service médical/social/de santé	16.4	17.8	16.8	20.2	20.0	20.2	11.2	12.6	11.4	8.6	13.9	9.7	7.4	4.0	4.8	12.9	12.9	12.9	729	
institution formatrice/éducative	0.6	0.5	0.6	1.1	0.0	0.8	0.0	2.3	0.4	3.0	3.8	3.2	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.7	96	
employeur/employeuse	2.8	1.5	2.4	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.3	1.5	0.0	1.2	0.5	0.8	0.7	2.0	1.1	1.6	93	
initiative personnelle/famille/amis	49.2	55.6	51.3	44.7	48.6	45.7	64.6	57.5	63.3	36.0	34.6	35.7	81.8	85.4	84.6	51.3	62.8	55.4	3143	
autre	1.8	1.9	1.8	2.1	2.9	2.3	1.1	2.3	1.3	2.5	0.5	2.1	1.0	0.3	0.5	2.7	1.6	2.3	132	
N**	1577	753	2330	94	35	129	376	87	463	826	208	1034	203	646	849	3640	2029	5669	5669	
données manquantes	114	59	173	15	7	22	42	7	49	43	21	64	35	120	155	286	231	517	517	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	92.7	95.8	93.7	98.5	95.8	97.8	95.9	98.3	96.4	84.4	84.6	84.4	92.5	94.7	93.1	2511
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	3
oui, consécutive à une mesure	7.3	4.2	6.3	1.5	4.2	2.2	4.1	1.7	3.6	14.8	15.4	14.9	7.4	5.3	6.8	184
N**	1001	452	1453	65	24	89	246	60	306	372	91	463	1978	720	2698	2698
données manquantes	690	360	1050	44	18	62	172	34	206	497	138	635	1710	774	2484	2484
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	5.0	0.0	4.2	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1
traitement résidentiel (art 60 CP)	5.0	0.0	4.2	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1
prise en charge ambulatoire	70.0	75.0	70.8	-	-	-	0.0	-	0.0	92.0	100.0	93.1	80.9	77.8	80.4	45
placement dans institution pour jeunes adultes	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
en attente d'un jugement	10.0	0.0	8.3	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.6	2
autre	10.0	25.0	12.5	-	-	-	100.0	-	100.0	8.0	0.0	6.9	10.6	22.2	12.5	7
N**	20	4	24	0	0	0	1	0	1	25	4	29	47	9	56	56
données manquantes	53	15	68	1	1	2	9	1	10	33	10	43	102	29	131	131

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prises en charge antérieures*																				
non	41.7	38.6	40.7	20.7	13.8	18.9	49.2	44.4	48.3	69.7	71.3	70.0	70.8	68.6	69.0	52.8	51.0	52.3	2319	
oui	58.3	61.4	59.3	79.3	86.2	81.1	50.8	55.6	51.7	30.3	28.7	30.0	29.2	31.4	31.0	47.2	49.0	47.7	2118	
N**	1402	660	2062	82	29	111	333	81	414	702	181	883	48	191	239	3022	1415	4437	4437	
données manquantes	289	152	441	27	13	40	85	13	98	167	48	215	190	575	765	904	845	1749	1749	
Type de prise en charge***																				
traitement avec prescription d'héroïne	0.0	0.0	0.0	9.7	28.6	13.2	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	6	
substitution (méthadone, subutex)	4.5	2.6	3.9	71.0	85.7	73.7	7.9	36.4	12.2	0.8	0.0	0.7	7.1	1.8	2.9	7.5	4.3	6.4	73	
autre traitement médicamenteux	7.3	5.7	6.7	12.9	28.6	15.8	6.3	0.0	5.4	3.3	0.0	2.8	0.0	1.8	1.4	6.4	4.0	5.6	64	
prise en charge ambulatoire	72.5	77.7	74.3	71.0	85.7	73.7	76.2	72.7	75.7	85.0	86.4	85.2	71.4	85.5	82.6	76.2	80.6	77.7	891	
structure/clinique de jour	2.5	5.7	3.6	0.0	14.3	2.6	6.3	0.0	5.4	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.3	3.5	2.7	31	
traitement résidentiel	59.3	58.1	58.9	48.4	71.4	52.6	57.1	63.6	58.1	25.0	13.6	23.2	21.4	16.4	17.4	49.1	45.5	47.9	549	
sevrage	42.5	41.9	42.3	64.5	57.1	63.2	17.5	45.5	21.6	11.7	9.1	11.3	14.3	10.9	11.6	32.6	29.5	31.6	362	
groupe d'entraide ou d'auto-support	6.8	7.9	7.2	0.0	14.3	2.6	3.2	0.0	2.7	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	4.9	4.8	4.9	56	
autre(s)	1.1	0.4	0.9	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	2.8	7.1	0.0	1.4	1.6	0.8	1.3	15	
N**	440	229	669	31	7	38	63	11	74	120	22	142	14	55	69	751	396	1147	1147	
données manquantes	383	176	559	34	18	52	106	34	140	96	31	127	1	5	6	685	299	984	984	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	98.2	98.5	98.3	30.6	46.7	34.4	96.8	91.7	96.0	100.0	100.0	100.0	96.7	97.7	97.0	2535
oui	1.8	1.5	1.7	69.4	53.3	65.6	3.2	8.3	4.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.3	3.0	78
N**	783	406	1189	49	15	64	125	24	149	535	126	661	1830	783	2613	2613
<i>données manquantes</i>	908	406	1314	60	27	87	293	70	363	334	103	437	1858	711	2569	2569
Type de substitution/prescription***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.0	0.0	1.5	1
méthadone	41.7	40.0	41.2	86.7	75.0	84.2	33.3	100.0	50.0	-	-	-	74.0	60.0	70.8	46
autres opiacés	50.0	40.0	47.1	10.0	12.5	10.5	66.7	0.0	50.0	-	-	-	22.0	26.7	23.1	15
autres substances	8.3	20.0	11.8	0.0	12.5	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.0	13.3	4.6	3
N**	12	5	17	30	8	38	3	1	4	0	0	0	50	15	65	65
<i>données manquantes</i>	2	1	3	4	0	4	1	1	2	0	0	0	10	3	13	13
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	96.4	97.3	96.7	25.6	22.2	24.8	93.4	85.9	91.9	99.3	99.1	99.3	94.1	94.3	94.1	3003
oui	3.6	2.7	3.3	74.4	77.8	75.2	6.6	14.1	8.1	0.7	0.9	0.7	5.9	5.7	5.9	187
N**	1172	552	1724	78	27	105	256	64	320	445	108	553	2284	906	3190	3190
<i>données manquantes</i>	519	260	779	31	15	46	162	30	192	424	121	545	1404	588	1992	1992
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	28.3	24.7	27.1	30.3	31.3	30.6	27.3	25.5	26.7	23.0	-	23.0	29.2	28.5	29.0	
Ecart-type	3.9	7.6	5.3	7.6	14.1	9.8	6.1	10.6	6.7	-	-	-	6.5	11.3	8.2	
25 centile	27.0	18.0	23.0	25.0	20.0	25.0	22.5	18.0	20.0	-	-	-	25.0	20.0	23.0	
Médiane	28.0	23.0	28.0	32.0	26.0	29.5	27.5	25.5	27.5	23.0	-	23.0	29.0	26.0	28.0	
75 centile	32.0	33.0	32.0	35.0	40.0	35.0	32.0	33.0	33.0	-	-	-	33.0	33.0	33.0	
N**	6	3	9	15	7	22	4	2	6	1	0	1	27	13	40	
<i>données manquantes</i>	36	12	48	43	14	57	13	7	20	2	1	3	108	39	147	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2021)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcool	45.9	54.4	48.3	2503	alcool	45.9	54.4	48.3	2503
héroïne	2.3	2.0	2.2	115					
méthadone	0.0	0.1	0.1	3					
buprénorphine	0.1	0.0	0.0	2	opioïdes	3.0	2.8	2.9	151
fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
autres opioïdes	0.5	0.7	0.6	30					
cocaïne en poudre	11.0	6.1	9.6	495	cocaïne ou dérivés	11.3	6.3	9.9	512
crack	0.4	0.1	0.3	16					
autre forme de cocaïne	0.0	0.1	0.0	1					
amphétamines	1.0	0.5	0.9	46	autres stimulants	1.8	1.5	1.7	88
méthamphétamines	0.2	0.1	0.2	10					
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.9	0.4	23					
cathinones synthétiques	0.1	0.0	0.0	2					
autres stimulants	0.2	0.1	0.1	7	hypnotiques/sédatifs	1.3	1.9	1.5	78
barbituriques	0.2	0.2	0.2	12					
benzodiazépines	0.9	1.6	1.1	58					
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0					
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.1	0.2	8					
LSD	0.1	0.1	0.1	6	hallucinogènes	0.2	0.1	0.2	10
kétamine	0.0	0.0	0.0	1					
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.1	3					
cannabis	23.6	15.3	21.2	1098	cannabis	23.6	15.3	21.2	1 098
tabac	1.3	2.5	1.6	85	tabac	1.3	2.5	1.6	85
substances volatiles	0.1	0.0	0.1	5	autres substances	1.1	0.3	0.9	47
autre substance	1.0	0.3	0.8	42					
jeu pathologique	4.6	2.1	3.9	203	comportement de type addictif	10.5	14.8	11.7	608
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.2	1.1	1.9	97					
troubles alimentaires	0.4	8.4	2.7	138					
autre comportement de type addictif	3.3	3.1	3.3	170					
N**	3687	1493	5180	5180	3687	1493	5180	5 180	
données manquantes	1	1	2	2	1	1	2	2	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2021)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*				
oui	15.6	13.3	15.0	278
non	84.4	86.7	85.0	1574
N**	1349	503	1852	1852
<i>données manquantes</i>	2339	991	3330	3330
Combinaisons de substances les plus fréquentes***				
tab/alc	14.1	24.5	16.6	37
coc/alc	15.3	13.2	14.8	33
can/alc	8.8	7.5	8.5	19
can/coc/alc	4.7	3.8	4.5	9
tab/coc/alc	4.7	1.9	4.0	9
tab/can	4.1	3.8	4.0	9
tab/can/alc	3.5	3.8	3.6	8
coc/op	3.5	0.0	2.7	6
can/coc	3.5	0.0	2.7	6
méd/alc	1.8	3.8	2.2	5
can/stim/coc/alc	1.8	3.8	2.2	5
op/alc	1.8	1.9	1.8	4
coc/op/alc	1.8	1.9	1.8	4
stim/alc	1.8	1.9	1.8	4
tab/can/coc/alc	1.8	1.9	1.8	4
stim/coc	1.8	0.0	1.3	3
stim/coc/alc	1.2	1.9	1.3	3
can/stim	0.6	3.8	1.3	3
méd/op/alc	0.6	1.9	0.9	2
méd/coc/alc	1.2	0.0	0.9	2
can/op/alc	0.0	3.8	0.9	2
can/stim/alc	1.2	0.0	0.9	2
can/stim/coc	1.2	0.0	0.9	2
can/méd/alc	1.2	0.0	0.9	2
tab/coc	1.2	0.0	0.9	2
tab/stim/coc/alc	1.2	0.0	0.9	2
tab/méd/alc	0.6	1.9	0.9	2
tab/can/coc	0.6	1.9	0.9	2
tab/can/stim/coc	1.2	0.0	0.9	2
autres combinaisons****	13.5	11.3	13.0	29
N**	168	53	221	221
<i>données manquantes</i>	43	14	57	57

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les autres combinaisons ne sont apparues qu'une seule fois chacune

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	39.0	42.3	12.6	26.4	55.6	14.3	42.5	78.0	50.0
4 à 6 jours par semaine	13.3	2.6	15.8	13.2	2.8	14.3	8.3	9.8	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.8	5.1	20.5	7.5	0.0	0.0	14.8	2.4	16.7
1 jour par semaine ou moins	8.3	9.0	24.9	22.6	11.1	42.9	14.3	7.3	16.7
aucune consommation	24.7	41.0	26.3	30.2	30.6	28.6	20.1	2.4	16.7
N**	1463	78	342	53	36	7	757	41	6
<i>données manquantes</i>	228	31	76	12	13	2	112	7	36

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
chaque jour	39.5	50.0	19.7	17.6	54.2	0.0	38.3	94.4	0.0
4 à 6 jours par semaine	15.2	8.3	14.1	23.5	12.5	0.0	8.7	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	15.2	4.2	18.3	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	100.0
1 jour par semaine ou moins	8.5	0.0	26.8	41.2	12.5	0.0	15.8	5.6	0.0
aucune consommation	21.6	37.5	21.1	17.6	20.8	100.0	25.0	0.0	0.0
N**	684	24	71	17	24	1	196	36	1
<i>données manquantes</i>	128	18	23	6	5	0	33	1	4

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
chaque jour	39.2	44.1	13.8	24.3	55.0	12.5	41.7	85.7	42.9
4 à 6 jours par semaine	13.9	3.9	15.5	15.7	6.7	12.5	8.4	5.2	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.9	4.9	20.1	5.7	0.0	0.0	14.3	1.3	28.6
1 jour par semaine ou moins	8.3	6.9	25.2	27.1	11.7	37.5	14.6	6.5	14.3
aucune consommation	23.7	40.2	25.4	27.1	26.7	37.5	21.1	1.3	14.3
N**	2147	102	413	70	60	8	953	77	7
<i>données manquantes</i>	356	49	99	18	18	2	145	8	40

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	22.2	75.6	77.8	60.7
4 à 6 jours par semaine	14.1	19.5	11.1	11.2
2 à 3 jours par semaine	11.1	2.4	11.1	12.1
1 jour par semaine ou moins	15.2	2.4	0.0	5.6
aucune manifestation	37.4	0.0	0.0	10.3
N**	99	41	9	107
<i>données manquantes</i>	72	39	4	16

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	4.3	88.9	56.9	58.3
4 à 6 jours par semaine	21.7	0.0	15.7	11.1
2 à 3 jours par semaine	8.7	0.0	12.7	11.1
1 jour par semaine ou moins	21.7	11.1	10.8	13.9
aucune manifestation	43.5	0.0	3.9	5.6
N**	23	9	102	36
<i>données manquantes</i>	9	8	23	11

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2021), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	18.9	78.0	58.6	60.1
4 à 6 jours par semaine	15.6	16.0	15.3	11.2
2 à 3 jours par semaine	10.7	2.0	12.6	11.9
1 jour par semaine ou moins	16.4	4.0	9.9	7.7
aucune manifestation	38.5	0.0	3.6	9.1
N**	122	50	111	143
<i>données manquantes</i>	81	47	27	27

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2021), hommes

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.2	23.0	21.2	22.1	25.4	22.1	15.1	16.1	19.7
écart-type	4.2	9.4	6.4	9.7	10.0	7.4	3.0	3.8	8.1
1er quartile	14.0	17.0	17.0	16.0	18.0	18.0	14.0	14.0	14.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	22.0	20.0	15.0	15.0	15.5
3e quartile	17.0	25.0	23.0	25.0	31.0	24.0	16.0	18.0	29.0
N*	875	50	240	37	28	7	548	33	6
données manquantes	816	59	178	28	21	2	321	15	36
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	23.3	25.1	25.1	24.4	29.9	21.3	15.8	17.3	18.0
écart-type	10.1	11.7	7.2	11.3	12.1	2.5	2.5	3.5	7.3
1er quartile	18.0	18.0	20.0	17.0	22.0	19.0	15.0	14.0	15.0
valeur médiane	20.0	20.0	25.0	20.0	27.0	21.0	15.0	17.5	15.0
3e quartile	25.0	30.0	29.0	28.0	35.0	24.0	16.0	20.0	16.0
N*	416	25	87	21	15	3	336	20	5
données manquantes	1275	84	331	44	34	6	533	28	37
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32.2	26.6	27.4	25.1	29.7	26.5	17.4	20.1	19.0
écart-type	12.9	10.4	8.9	10.3	12.6	8.7	4.5	7.4	6.8
1er quartile	21.0	19.0	20.0	17.0	20.0	20.5	15.0	15.0	15.0
valeur médiane	30.0	23.5	25.0	23.0	26.0	23.5	16.0	18.0	16.0
3e quartile	40.0	30.0	32.0	29.0	35.0	32.5	18.0	25.0	23.0
N*	728	38	199	32	23	4	441	26	6
données manquantes	963	71	219	33	26	5	428	22	36
Période de latence (en années)**									
moyenne	25.9	4.1	10.4	7.4	6.1	1.3	6.3	15.2	2.3
écart-type	13.2	5.3	7.9	7.1	3.8	1.7	7.2	13.9	1.4
1er quartile	15.9	1.4	4.6	1.1	1.9	0.1	1.8	3.2	0.8
valeur médiane	23.9	2.5	8.9	5.9	7.4	1.3	3.2	13.0	2.8
3e quartile	36.0	4.8	12.6	10.5	9.3	2.5	8.5	21.3	3.2
N*	331	15	111	13	8	2	377	25	5
données manquantes	253	2	53	15	4	1	112	10	1

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2021), femmes

Patientes: principale substance posant problème									
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	18.4	25.6	20.5	17.6	27.0	-	15.2	15.1	10.0
écart-type	7.1	13.8	5.1	5.4	15.8	-	2.6	2.0	-
1er quartile	15.0	16.0	17.0	15.0	16.0	-	14.0	14.0	-
valeur médiane	16.0	20.0	19.0	16.0	20.0	-	15.0	15.0	10.0
3e quartile	20.0	35.0	24.0	18.0	35.0	-	16.0	16.0	-
N*	379	19	57	14	15	0	144	27	1
données manquantes	433	23	37	9	14	1	85	10	4
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	26.8	24.5	22.2	19.1	33.7	-	15.5	18.5	11.0
écart-type	10.9	10.8	5.6	6.6	18.4	-	2.0	6.7	-
1er quartile	18.0	16.0	18.0	15.0	17.0	-	14.0	14.5	-
valeur médiane	23.0	19.5	21.0	16.0	28.5	-	15.0	16.0	11.0
3e quartile	35.0	35.0	26.0	20.0	48.0	-	16.0	19.5	-
N*	231	6	20	9	10	0	78	20	1
données manquantes	581	36	74	14	19	1	151	17	4
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	34.1	25.9	24.4	17.9	38.8	-	17.4	20.9	12.0
écart-type	13.5	11.8	8.0	5.6	20.4	-	5.6	8.3	-
1er quartile	24.0	18.0	18.0	15.0	17.0	-	15.0	15.0	-
valeur médiane	32.0	22.0	23.5	15.5	40.0	-	16.0	18.0	12.0
3e quartile	43.0	30.0	28.0	20.0	50.0	-	17.0	29.0	-
N*	392	15	52	10	13	0	112	19	1
données manquantes	420	27	42	13	16	1	117	18	4
Période de latence (en années)**									
moyenne	22.9	2.2	7.1	2.2	10.6	-	5.3	19.4	-
écart-type	14.3	2.2	6.3	2.6	12.6	-	7.3	18.6	-
1er quartile	11.1	0.5	1.8	0.4	0.7	-	1.1	0.7	-
valeur médiane	21.2	1.5	5.1	1.0	7.5	-	2.4	14.6	-
3e quartile	32.7	3.8	10.2	2.3	20.5	-	7.2	35.5	-
N*	126	4	30	9	4	0	100	18	0
données manquantes	129	0	6	2	1	0	29	6	0

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2021), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.9	23.7	21.0	20.9	25.9	22.1	15.1	15.7	18.3
écart-type	5.4	10.8	6.2	8.9	12.2	7.4	2.9	3.1	8.2
1er quartile	14.0	17.0	17.0	15.0	18.0	18.0	14.0	14.0	13.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	22.0	20.0	15.0	15.0	15.0
3e quartile	18.0	26.0	23.0	22.0	31.0	24.0	16.0	17.0	29.0
N*	1254	69	297	51	43	7	692	60	7
<i>données manquantes</i>	1249	82	215	37	35	3	406	25	40
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	24.6	25.0	24.6	22.8	31.4	21.3	15.7	17.9	16.8
écart-type	10.5	11.3	7.0	10.3	14.7	2.5	2.4	5.3	7.2
1er quartile	18.0	18.0	19.0	15.0	22.0	19.0	15.0	14.0	13.0
valeur médiane	20.0	20.0	24.0	19.0	27.0	21.0	15.0	16.5	15.0
3e quartile	30.0	32.0	28.0	26.0	35.0	24.0	16.0	20.0	16.0
N*	647	31	107	30	25	3	414	40	6
<i>données manquantes</i>	1856	120	405	58	53	7	684	45	41
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32.9	26.4	26.8	23.4	33.0	26.5	17.4	20.4	18.0
écart-type	13.1	10.7	8.8	9.9	16.2	8.7	4.8	7.7	6.7
1er quartile	22.0	18.0	20.0	16.0	20.0	20.5	15.0	15.0	13.0
valeur médiane	30.0	23.0	25.0	20.5	28.0	23.5	16.0	18.0	16.0
3e quartile	40.0	30.0	32.0	27.0	40.5	32.5	18.0	25.0	23.0
N*	1120	53	251	42	36	4	553	45	7
<i>données manquantes</i>	1383	98	261	46	42	6	545	40	40
Période de latence (en années)**									
moyenne	25.1	3.7	9.7	5.3	7.6	1.3	6.1	17.0	2.3
écart-type	13.6	4.8	7.7	6.2	7.6	1.7	7.2	16.0	1.4
1er quartile	15.2	1.2	4.1	0.6	1.3	0.1	1.7	1.7	0.8
valeur médiane	23.1	2.5	8.3	2.3	7.4	1.3	2.9	13.0	2.8
3e quartile	34.8	4.8	12.3	7.7	10.1	2.5	8.4	28.6	3.2
N*	457	19	141	22	12	2	477	43	5
<i>données manquantes</i>	382	2	59	17	5	1	141	16	1

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2021), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Âge lors de la première apparition				
moyenne	22.9	14.3	11.0	15.7
écart-type	8.9	4.8	7.1	8.8
1er quartile	18.0	11.0	6.0	12.0
valeur médiane	19.0	14.0	11.0	14.0
3e quartile	25.0	16.0	16.0	16.0
N*	71	26	2	64
données manquantes	100	54	11	59
Âge lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	26.1	13.7	11.0	17.0
écart-type	8.2	0.6	7.1	9.1
1er quartile	19.0	13.0	6.0	13.0
valeur médiane	24.0	14.0	11.0	15.0
3e quartile	33.0	14.0	16.0	17.0
N*	30	3	2	57
données manquantes	141	77	11	66
Âge lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	28.8	18.8	18.3	20.4
écart-type	8.9	7.6	8.0	11.3
1er quartile	22.0	13.5	12.0	14.0
valeur médiane	28.0	16.5	19.5	16.0
3e quartile	35.0	22.0	24.5	23.0
N*	71	24	4	72
données manquantes	100	56	9	51
Période de latence (en années)**				
moyenne	12.4	6.7	9.7	9.4
écart-type	9.2	4.4	11.2	10.4
1er quartile	5.7	3.7	1.7	2.5
valeur médiane	10.3	6.4	9.7	5.2
3e quartile	18.6	9.5	17.6	11.8
N*	50	18	2	47
données manquantes	45	16	7	39

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2021), femmes

Patientes: problème principal				
Femmes	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	38.2	22.6	17.2	21.8
écart-type	15.2	23.0	6.5	13.8
1er quartile	25.0	9.0	14.0	12.5
valeur médiane	40.0	14.0	15.0	15.5
3e quartile	48.0	25.5	18.0	28.0
N*	14	8	64	24
données manquantes	18	9	61	23
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	31.0	16.0	17.8	23.2
écart-type	10.0	-	6.6	14.3
1er quartile	24.0	-	14.0	14.0
valeur médiane	30.0	16.0	16.5	16.0
3e quartile	38.0	-	19.0	32.0
N*	4	1	64	21
données manquantes	28	16	61	26
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	39.9	27.0	20.6	22.9
écart-type	14.0	20.8	9.7	12.7
1er quartile	29.0	15.0	15.0	14.0
valeur médiane	38.0	19.5	18.0	16.0
3e quartile	50.0	29.0	23.0	31.0
N*	18	8	74	27
données manquantes	14	9	51	20
Période de latence (en années)**				
moyenne	9.0	13.4	7.9	6.5
écart-type	7.1	13.4	10.7	7.0
1er quartile	2.1	4.1	1.9	2.8
valeur médiane	8.3	9.3	3.5	4.1
3e quartile	16.1	21.3	7.4	7.8
N*	10	7	34	21
données manquantes	9	2	30	13

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2021), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal				
<i>Hommes et femmes</i>	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	25.4	16.2	17.0	17.3
écart-type	11.6	11.9	6.5	10.6
1er quartile	18.0	10.0	14.0	12.0
valeur médiane	20.0	14.0	15.0	14.0
3e quartile	30.0	16.0	18.0	17.5
N*	85	34	66	88
<i>données manquantes</i>	118	63	72	82
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	26.7	14.3	17.5	18.7
écart-type	8.4	1.3	6.6	11.0
1er quartile	20.0	13.5	14.0	13.0
valeur médiane	25.0	14.0	16.0	15.0
3e quartile	33.0	15.0	19.0	20.0
N*	34	4	66	78
<i>données manquantes</i>	169	93	72	92
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	31.1	20.8	20.4	21.1
écart-type	11.0	12.4	9.6	11.7
1er quartile	23.0	14.0	15.0	14.0
valeur médiane	30.0	17.0	18.0	16.0
3e quartile	37.0	25.0	23.0	25.0
N*	89	32	78	99
<i>données manquantes</i>	114	65	60	71
Période de latence (en années)**				
moyenne	11.8	8.6	8.0	8.5
écart-type	8.9	8.2	10.5	9.5
1er quartile	4.9	4.0	1.8	2.7
valeur médiane	10.3	6.5	3.5	4.9
3e quartile	17.8	10.6	7.6	9.2
N*	60	25	36	68
<i>données manquantes</i>	54	18	37	52

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2021)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode d'administration*															
injection	21.3	26.7	22.6	0.7	1.4	0.8	4.2	0.0	3.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	31.9	26.7	30.6	9.5	11.6	9.9	20.8	0.0	17.2	98.7	97.7	98.5	0.0	5.0	2.1
ingestion (manger/boire)	4.3	20.0	8.1	13.2	7.2	12.1	45.8	0.0	37.9	0.7	0.6	0.7	92.6	90.0	91.5
sniff	42.6	26.7	38.7	76.6	79.7	77.2	29.2	100.0	41.4	0.3	1.7	0.6	7.4	0.0	4.3
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	5.0	2.1
N**	47	15	62	304	69	373	24	5	29	715	175	890	27	20	47
<i>données manquantes</i>	38	15	53	100	22	122	14	3	17	154	54	208	7	4	11

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injections au cours de la vie*																
oui	4.1	3.2	3.8	35.4	48.6	39.3	6.7	12.1	7.8	1.2	1.5	1.3	4.3	4.3	4.3	173
non	93.9	93.7	93.8	61.0	45.7	56.4	91.8	84.8	90.5	94.7	95.4	94.9	92.9	92.8	92.9	3743
ne veut pas répondre	2.0	3.1	2.3	3.7	5.7	4.3	1.4	3.0	1.7	4.0	3.1	3.8	2.8	2.9	2.8	114
N**	1281	617	1898	82	35	117	282	66	348	742	194	936	2863	1167	4030	4030
données manquantes	410	195	605	27	7	34	136	28	164	127	35	162	825	327	1152	1152
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	0.7	0.5	0.7	8.7	8.7	8.7	2.9	1.7	2.7	0.4	0.0	0.3	1.2	0.5	1.0	38
non	99.3	99.5	99.3	91.3	91.3	91.3	97.1	98.3	97.3	99.6	100.0	99.7	98.8	99.5	99.0	3817
N**	1234	594	1828	69	23	92	275	59	334	711	187	898	2741	1114	3855	3855
données manquantes	457	218	675	40	19	59	143	35	178	158	42	200	947	380	1327	1327
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.6	0.5	0.5	7.0	4.0	6.3	2.2	0.0	1.8	0.4	0.0	0.3	0.9	0.4	0.7	28
non	99.4	99.5	99.5	93.0	96.0	93.8	97.8	100.0	98.2	99.6	100.0	99.7	99.1	99.6	99.3	3851
N**	1246	599	1845	71	25	96	275	61	336	711	187	898	2755	1124	3879	3879
données manquantes	445	213	658	38	17	55	143	33	176	158	42	200	933	370	1303	1303
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	21.4	50.0	25.0	33.3	33.3	33.3	60.0	50.0	57.1	50.0	-	50.0	29.4	42.9	31.7	13
non	78.6	0.0	68.8	66.7	66.7	66.7	40.0	50.0	42.9	50.0	-	50.0	70.6	42.9	65.9	27
ne veut pas répondre	0.0	50.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	14.3	2.4	1
N**	14	2	16	9	3	12	5	2	7	2	0	2	34	7	41	41
données manquantes	39	18	57	20	14	34	14	6	20	7	3	10	89	43	132	132
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
non	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	4
N**	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	4	4
données manquantes	7	3	10	6	2	8	6	1	7	3	0	3	28	6	34	34
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
données manquantes	7	3	10	5	1	6	6	0	6	3	0	3	24	4	28	28

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			N	
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
Age lors de la première injection*																	
jusqu'à 14 ans	0.0	25.0	5.9	0.0	14.3	4.8	9.1	20.0	12.5	0.0	50.0	14.3	1.6	21.7	7.0	6	
de 15 à 16 ans	11.5	25.0	14.7	0.0	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	14.3	4.8	17.4	8.1	7	
de 17 à 18 ans	23.1	12.5	20.6	35.7	0.0	23.8	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	25.4	13.0	22.1	19	
de 19 à 20 ans	26.9	0.0	20.6	14.3	28.6	19.0	36.4	20.0	31.3	40.0	0.0	28.6	25.4	13.0	22.1	19	
de 21 à 25 ans	23.1	25.0	23.5	21.4	42.9	28.6	18.2	0.0	12.5	60.0	0.0	42.9	23.8	21.7	23.3	20	
de 26 à 30 ans	3.8	12.5	5.9	7.1	0.0	4.8	9.1	40.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3	13.0	8.1	7	
de 31 à 39 ans	11.5	0.0	8.8	21.4	0.0	14.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	9.3	8	
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
N**	26	8	34	14	7	21	11	5	16	5	2	7	63	23	86	86	
<i>données manquantes</i>	27	12	39	15	10	25	8	3	11	4	1	5	60	27	87	87	

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2021), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	27.6	38.4	39.7	33.3	88.9	26.5	15.9	73.8
héroïne	2.2	6.7	6.6	4.8	8.9	11.1	4.1	0.0	33.3
méthadone	0.9	8.6	1.7	1.6	2.2	11.1	0.5	0.0	28.6
buprénorphine	0.4	1.0	0.2	1.6	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
fentanyl	0.4	1.9	0.2	1.6	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
autres opioïdes	1.3	4.8	2.2	3.2	15.6	22.2	1.5	0.0	28.6
cocaïne en poudre	12.4	37.1	1.5	19.0	8.9	44.4	13.4	2.3	61.9
crack	0.8	1.9	1.0	3.2	2.2	11.1	0.5	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.5	0.0	0.0	3.2	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
amphétamines	4.6	11.4	11.2	14.3	15.6	33.3	7.8	0.0	57.1
méthamphétamines	0.7	1.9	1.5	4.8	2.2	11.1	0.8	0.0	7.1
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2.8	8.6	7.6	9.5	8.9	22.2	6.9	0.0	23.8
cathinones synthétiques	0.5	1.0	0.5	3.2	2.2	11.1	0.2	0.0	0.0
autres stimulants	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	11.1	0.4	2.3	0.0
barbituriques	2.5	3.8	3.2	3.2	2.2	11.1	3.5	0.0	21.4
benzodiazépines	5.4	23.8	6.4	7.9	15.6	22.2	6.1	2.3	35.7
GHB/GBL	0.5	0.0	0.2	3.2	4.4	11.1	0.2	0.0	2.4
autres somnifères et tranquillisants	0.6	1.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	3.3	8.6	6.4	12.7	6.7	44.4	6.0	0.0	47.6
kétamine	0.8	1.0	0.5	4.8	4.4	22.2	1.1	0.0	2.4
autres hallucinogènes	2.4	4.8	4.6	4.8	4.4	22.2	4.3	0.0	45.2
substances volatiles	0.9	3.8	2.0	1.6	0.0	33.3	3.0	0.0	19.0
cannabis	16.6	28.6	34.2	47.6	37.8	100.0	-	18.2	69.0
tabac	19.4	15.2	20.0	22.2	15.6	22.2	20.3	-	0.0
autre substance	1.1	2.9	1.5	1.6	6.7	11.1	2.3	0.0	0.0
jeu pathologique	0.8	0.0	2.0	1.6	0.0	22.2	0.8	2.3	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.0	0.0	1.0	4.8	0.0	11.1	1.6	4.5	0.0
troubles alimentaires	0.9	0.0	0.5	1.6	0.0	11.1	0.4	2.3	0.0
autre comportement de type addictif	0.9	0.0	1.0	3.2	2.2	22.2	1.2	2.3	2.4
aucun autre problème addictif	61.2	28.6	40.8	25.4	31.1	0.0	52.7	61.4	16.7
N**	1659	105	409	63	45	9	857	44	42
<i>données manquantes</i>	32	4	9	2	4	0	12	4	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2021), femmes

Femmes

	Patientes: principale substance posant problème								
	Alcool %	Opioides %	Cocaïne et dérivés %	Stimulants %	Hypnotiques/sé datifs %	Hallucinogènes %	Cannabis %	Tabac %	Autres substances %
Autres problèmes*									
alcool	-	24.3	28.2	21.7	48.3	0.0	24.9	13.5	75.0
héroïne	2.6	13.5	5.9	4.3	6.9	0.0	3.6	0.0	0.0
méthadone	1.3	16.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
buprénorphine	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
autres opioïdes	1.9	5.4	0.0	4.3	3.4	0.0	0.5	0.0	0.0
cocaïne en poudre	8.1	27.0	0.0	13.0	10.3	100.0	10.0	0.0	25.0
crack	1.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	3.8	8.1	10.6	8.7	6.9	100.0	10.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2.5	0.0	11.8	4.3	6.9	100.0	12.2	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
barbituriques	3.9	5.4	0.0	0.0	3.4	0.0	2.7	0.0	25.0
benzodiazépines	7.0	16.2	7.1	4.3	6.9	0.0	3.2	2.7	50.0
GHB/GBL	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	1.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
LSD	2.8	2.7	2.4	13.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
kétamine	0.9	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.5	0.0	0.0
autres hallucinogènes	2.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
substances volatiles	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	25.0
cannabis	10.4	21.6	29.4	47.8	13.8	100.0	-	8.1	50.0
tabac	15.2	18.9	15.3	13.0	10.3	0.0	20.4	-	0.0
autre substance	1.3	2.7	1.2	4.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
jeu pathologique	0.8	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	2.8	2.7	2.4	0.0	3.4	0.0	1.8	0.0	25.0
autre comportement de type addictif	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	67.8	37.8	42.4	17.4	27.6	0.0	53.8	78.4	0.0
N**	795	37	85	23	29	1	221	37	4
<i>données manquantes</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2021), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	26.8	36.6	34.9	39.2	80.0	26.2	14.8	73.9
héroïne	2.4	8.5	6.5	4.7	8.1	10.0	4.0	0.0	30.4
méthadone	1.0	10.6	1.6	1.2	1.4	10.0	0.5	0.0	26.1
buprénorphine	0.5	2.1	0.2	1.2	0.0	10.0	0.2	0.0	0.0
fentanyl	0.5	2.8	0.2	1.2	0.0	10.0	0.3	0.0	0.0
autres opioïdes	1.5	4.9	1.8	3.5	10.8	20.0	1.3	0.0	26.1
cocaïne en poudre	11.0	34.5	1.2	17.4	9.5	50.0	12.7	1.2	58.7
crack	0.9	1.4	1.0	2.3	1.4	10.0	0.5	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.6	0.7	0.0	2.3	0.0	10.0	0.2	0.0	0.0
amphétamines	4.3	10.6	11.1	12.8	12.2	40.0	8.3	0.0	52.2
méthamphétamines	0.8	2.8	1.2	3.5	1.4	10.0	0.7	0.0	6.5
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2.7	6.3	8.3	8.1	8.1	30.0	8.0	0.0	21.7
cathinones synthétiques	0.6	0.7	0.6	2.3	1.4	10.0	0.2	0.0	0.0
autres stimulants	0.7	0.7	0.4	0.0	0.0	10.0	0.4	1.2	0.0
barbituriques	3.0	4.2	2.6	2.3	2.7	10.0	3.3	0.0	21.7
benzodiazépines	5.9	21.8	6.5	7.0	12.2	20.0	5.5	2.5	37.0
GHB/GBL	0.6	0.0	0.2	2.3	2.7	10.0	0.2	0.0	2.2
autres somnifères et tranquillisants	0.7	1.4	0.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	3.1	7.0	5.7	12.8	4.1	40.0	5.7	0.0	43.5
kétamine	0.8	0.7	0.4	3.5	4.1	20.0	0.9	0.0	2.2
autres hallucinogènes	2.4	4.2	3.8	3.5	2.7	20.0	4.2	0.0	41.3
substances volatiles	1.0	2.8	1.6	1.2	0.0	30.0	3.0	0.0	19.6
cannabis	14.6	26.8	33.4	47.7	28.4	100.0	-	13.6	67.4
tabac	18.1	16.2	19.2	19.8	13.5	20.0	20.3	-	0.0
autre substance	1.1	2.8	1.4	2.3	4.1	10.0	2.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.8	0.0	1.6	2.3	0.0	20.0	0.7	1.2	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.9	0.0	0.8	3.5	0.0	10.0	1.3	2.5	0.0
troubles alimentaires	1.5	0.7	0.8	1.2	1.4	10.0	0.6	1.2	2.2
autre comportement de type addictif	1.0	0.0	0.8	2.3	1.4	20.0	1.0	1.2	2.2
aucun autre problème addictif	63.3	31.0	41.1	23.3	29.7	0.0	53.0	69.1	15.2
N**	2454	142	494	86	74	10	1078	81	46
<i>données manquantes</i>	49	9	18	2	4	0	20	4	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2021), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	15.2	27.4	0.0	2.6
héroïne	0.6	11.0	0.0	0.0
méthadone	0.6	1.4	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	1.4	0.0	0.0
autres opioïdes	0.6	1.4	0.0	0.0
cocaïne en poudre	4.8	15.1	0.0	0.0
crack	0.0	1.4	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	1.4	0.0	0.0
amphétamines	2.4	15.1	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	2.7	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.6	11.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	1.4	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	1.4	0.0	0.0
barbituriques	1.2	12.3	0.0	0.0
benzodiazépines	1.2	11.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	1.4	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	1.4	0.0	0.0
LSD	0.6	12.3	0.0	0.0
kétamine	0.0	1.4	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.6	11.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.6	11.0	0.0	0.0
cannabis	10.3	20.5	0.0	2.6
tabac	4.2	9.6	0.0	3.4
autre substance	6.1	2.7	0.0	0.0
jeu pathologique	-	1.4	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.2	-	0.0	2.6
troubles alimentaires	0.0	1.4	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.6	4.1	18.2	-
aucun autre problème addictif	72.1	63.0	81.8	90.5
N**	165	73	11	116
<i>données manquantes</i>	6	7	2	7

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2021), femmes

Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	9.7	18.8	2.5	4.7
héroïne	0.0	6.3	0.8	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	6.3	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	6.3	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	6.3	0.8	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.8	0.0
barbituriques	0.0	6.3	0.0	0.0
benzodiazépines	3.2	6.3	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	6.3	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	6.3	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	6.3	0.0	0.0
cannabis	0.0	6.3	1.7	9.3
tabac	3.2	6.3	1.7	4.7
autre substance	9.7	6.3	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	6.3	-	14.0
autre comportement de type addictif	0.0	6.3	2.5	-
aucun autre problème addictif	83.9	68.8	89.8	74.4
N**	31	16	118	43
<i>données manquantes</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>4</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2021), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	14.3	25.8	2.3	3.1
héroïne	0.5	10.1	0.8	0.0
méthadone	0.5	1.1	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	1.1	0.0	0.0
autres opioïdes	0.5	1.1	0.0	0.0
cocaïne en poudre	4.1	13.5	0.0	0.0
crack	0.0	1.1	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	1.1	0.0	0.0
amphétamines	2.0	13.5	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	2.2	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.5	10.1	0.8	0.0
cathinones synthétiques	0.0	1.1	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	1.1	0.8	0.0
barbituriques	1.0	11.2	0.0	0.0
benzodiazépines	1.5	10.1	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	1.1	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	1.1	0.0	0.0
LSD	0.5	11.2	0.0	0.0
kétamine	0.0	1.1	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.5	10.1	0.0	0.0
substances volatiles	0.5	10.1	0.0	0.0
cannabis	8.7	18.0	1.6	4.4
tabac	4.1	9.0	1.6	3.8
autre substance	6.6	3.4	0.0	0.0
jeu pathologique	-	1.1	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	3.6	-	0.0	1.9
troubles alimentaires	0.0	2.2	-	3.8
autre comportement de type addictif	0.5	4.5	3.9	-
aucun autre problème addictif	74.0	64.0	89.1	86.2
N**	196	89	129	159
<i>données manquantes</i>	7	8	9	11

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux			N			
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes				Total		
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%	
Alcool*	Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	22.7	0.0	17.9	11.8	13.3	11.9	4.5	6.1	4.7	0.0	11.1	4.5	2.6	12.5	4.3	8.5	10.0	8.7	42
4 à 6 jours par semaine	13.6	0.0	10.7	20.2	20.0	20.1	4.5	3.0	4.2	15.4	0.0	9.1	2.6	0.0	2.2	11.0	6.3	10.2	49
2 à 3 jours par semaine	4.5	0.0	3.6	25.2	33.3	26.1	22.3	24.2	22.6	7.7	33.3	18.2	15.8	12.5	15.2	20.9	22.5	21.2	102
1 jour par semaine ou moins	22.7	16.7	21.4	12.6	20.0	13.4	43.3	39.4	42.6	15.4	11.1	13.6	31.6	25.0	30.4	28.7	28.8	28.7	138
aucune consomm.	36.4	83.3	46.4	30.3	13.3	28.4	25.5	27.3	25.8	61.5	44.4	54.5	47.4	50.0	47.8	30.9	32.5	31.2	150
N**	22	6	28	119	15	134	157	33	190	13	9	22	38	8	46	401	80	481	481
données manquantes	87	36	123	299	79	378	712	196	908	36	20	56	349	213	562	3525	2180	5705	5705
Opiïdes*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	0.0	5.6	2.1	15.8	33.3	18.2	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	0.0	50.0	9.1	8.9	13.3	9.9	14
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	5.6	2.1	5.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	1.4	2
1 jour par semaine ou moins	3.3	5.6	4.2	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.3	3.5	5
aucune consomm.	96.7	83.3	91.7	68.4	66.7	68.2	100.0	100.0	100.0	75.0	100.0	80.0	100.0	50.0	90.9	86.6	80.0	85.2	121
N**	30	18	48	19	3	22	33	5	38	4	1	5	9	2	11	112	30	142	142
données manquantes	1661	794	2455	399	91	490	836	224	1060	45	28	73	378	219	597	3814	2230	6044	6044
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opiïdes			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	2.4	6.0	3.3	16.0	0.0	13.3	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.9	4.0	3.8	3.9	16
4 à 6 jours par semaine	5.5	2.0	4.7	4.0	0.0	3.3	2.4	6.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.6	3.4	14
2 à 3 jours par semaine	5.5	8.0	6.0	4.0	0.0	3.3	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.1	4.7	19
1 jour par semaine ou moins	32.7	14.0	28.4	32.0	20.0	30.0	14.5	25.0	16.2	33.3	50.0	40.0	6.3	0.0	5.9	26.4	19.2	25.1	102
aucune consomm.	53.9	70.0	57.7	44.0	80.0	50.0	78.3	68.8	76.8	66.7	50.0	60.0	87.5	100.0	88.2	61.4	69.2	62.9	256
N**	165	50	215	25	5	30	83	16	99	3	2	5	16	1	17	329	78	407	407
données manquantes	1526	762	2288	84	37	121	786	213	999	46	27	73	371	220	591	3597	2182	5779	5779
Cannabis*	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	20.9	10.6	18.5	40.9	0.0	34.6	31.7	47.4	34.1	40.0	0.0	35.3	7.1	0.0	6.9	24.9	19.2	23.8	128
4 à 6 jours par semaine	8.6	4.5	7.7	9.1	0.0	7.7	11.5	15.8	12.2	13.3	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	8.9	6.1	8.4	45
2 à 3 jours par semaine	7.7	10.6	8.4	4.5	0.0	3.8	9.6	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.3	7.3	10.1	7.8	42
1 jour par semaine ou moins	9.5	12.1	10.1	13.6	0.0	11.5	11.5	10.5	11.4	6.7	100.0	17.6	10.7	0.0	10.3	10.5	13.1	11.0	59
aucune consomm.	53.2	62.1	55.2	31.8	100.0	42.3	35.6	15.8	32.5	40.0	0.0	35.3	71.4	100.0	72.4	48.4	51.5	49.0	263
N**	220	66	286	22	4	26	104	19	123	15	2	17	28	1	29	438	99	537	537
données manquantes	1471	746	2217	87	38	125	314	75	389	34	27	61	359	220	579	3488	2161	5649	5649

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	3.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	2
4 à 6 jours par semaine	3.0	3.7	3.2	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.0	3.8	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.9	2.0	3.5	9
2 à 3 jours par semaine	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	3
1 jour par semaine ou moins	10.6	11.1	10.8	20.0	0.0	16.7	14.3	40.0	17.5	13.2	8.3	12.3	7.1	0.0	6.7	12.6	12.2	12.5	32
aucune consomm.	81.8	85.2	82.8	80.0	100.0	83.3	77.1	60.0	75.0	83.0	91.7	84.6	92.9	100.0	93.3	81.2	85.7	82.0	210
N**	66	27	93	10	2	12	35	5	40	53	12	65	14	1	15	207	49	256	256
données manquantes	1625	785	2410	99	40	139	383	89	472	816	217	1033	373	220	593	3719	2211	5930	5930
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	30.0	51.6	39.4	33.3	0.0	20.0	15.4	-	15.4	6.9	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	17.0	41.5	23.8	35
4 à 6 jours par semaine	0.0	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.7	1
2 à 3 jours par semaine	10.0	3.2	7.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.4	4.1	6
1 jour par semaine ou moins	12.5	0.0	7.0	33.3	0.0	20.0	0.0	-	0.0	0.0	33.3	5.7	0.0	0.0	0.0	8.5	4.9	7.5	11
aucune consomm.	47.5	41.9	45.1	33.3	100.0	60.0	76.9	-	76.9	93.1	66.7	88.6	100.0	100.0	100.0	69.8	48.8	63.9	94
N**	40	31	71	3	2	5	13	0	13	29	6	35	10	1	11	106	41	147	147
données manquantes	1651	781	2432	106	40	146	405	94	499	840	223	1063	377	220	597	3820	2219	6039	6039
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	11.5	9.5	11.0	0.0	0.0	0.0	8.7	50.0	12.0	9.5	14.3	10.2	0.0	0.0	0.0	10.7	12.5	11.0	21
aucune consomm.	88.5	90.5	89.0	100.0	100.0	100.0	91.3	50.0	88.0	90.5	85.7	89.8	100.0	100.0	100.0	88.7	87.5	88.5	169
N**	52	21	73	7	1	8	23	2	25	42	7	49	10	1	11	159	32	191	191
données manquantes	1639	791	2430	102	41	143	395	92	487	827	222	1049	377	220	597	3767	2228	5995	5995
Autres substances*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	20.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	2.2	2
aucune consomm.	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	80.0	96.8	100.0	100.0	100.0	96.1	94.1	95.7	89
N**	15	10	25	3	0	3	8	0	8	26	5	31	9	1	10	76	17	93	93
données manquantes	1676	802	2478	106	42	148	410	94	504	843	224	1067	378	220	598	3850	2243	6093	6093

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	14.5	11.7	13.6	25.0	20.0	23.8	6.0	19.2	8.7	20.2	25.3	21.1	17.6	21.1	18.7	387
1 fois par mois ou moins	4.0	3.6	3.9	31.3	20.0	28.6	12.0	3.8	10.3	23.9	29.9	25.0	11.7	11.1	11.5	238
2 à 4 fois par mois	6.0	4.9	5.6	25.0	60.0	33.3	29.0	26.9	28.6	39.8	31.0	38.1	18.8	13.4	17.2	355
2 à 3 fois par semaine	17.5	19.0	18.0	0.0	0.0	0.0	34.0	26.9	32.5	13.3	12.6	13.1	17.1	16.1	16.8	347
4 fois ou plus par semaine	57.9	60.7	58.8	18.8	0.0	14.3	19.0	23.1	19.8	2.9	1.1	2.6	34.7	38.4	35.9	742
N**	770	384	1154	16	5	21	100	26	126	377	87	464	1428	641	2069	2069
<i>données manquantes</i>	921	428	1349	93	37	130	318	68	386	492	142	634	2260	853	3113	3113
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	6.7	5.9	6.5	63.6	75.0	66.7	44.7	40.0	43.8	51.2	56.9	52.2	25.3	24.2	25.0	398
3 ou 4	20.1	21.1	20.4	27.3	25.0	26.7	29.4	20.0	27.6	31.3	31.0	31.3	25.2	21.5	24.1	383
5 ou 6	21.0	28.5	23.5	9.1	0.0	6.7	15.3	20.0	16.2	10.3	8.6	10.0	16.8	22.5	18.5	295
7 à 9	21.0	23.5	21.9	0.0	0.0	0.0	5.9	15.0	7.6	3.9	0.0	3.2	13.5	16.8	14.5	231
10 ou plus	31.2	21.1	27.8	0.0	0.0	0.0	4.7	5.0	4.8	3.2	3.4	3.2	19.2	14.9	17.9	285
N**	638	323	961	11	4	15	85	20	105	281	58	339	1117	475	1592	1592
<i>données manquantes</i>	1053	489	1542	98	38	136	333	74	407	588	171	759	2571	1019	3590	3590
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	14.2	15.0	14.5	75.0	80.0	76.5	25.0	30.4	26.2	55.5	69.2	58.1	32.0	39.0	34.2	624
moins d'une fois par mois	8.3	11.2	9.3	16.7	20.0	17.6	29.8	30.4	29.9	26.3	21.8	25.4	16.5	13.8	15.6	285
1 fois par mois	12.0	8.5	10.8	8.3	0.0	5.9	19.0	17.4	18.7	10.4	2.6	9.0	11.4	6.3	9.8	179
1 fois par semaine	27.3	30.9	28.5	0.0	0.0	0.0	19.0	13.0	17.8	6.6	5.1	6.3	18.6	19.9	19.0	347
presque chaque jour	38.2	34.4	36.9	0.0	0.0	0.0	7.1	8.7	7.5	1.2	1.3	1.2	21.5	21.0	21.3	389
N**	675	340	1015	12	5	17	84	23	107	335	78	413	1252	572	1824	1824
<i>données manquantes</i>	1016	472	1488	97	37	134	334	71	405	534	151	685	2436	922	3358	3358

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	40.7	46.4	42.6	22.7	40.0	25.9	24.5	30.8	25.8	26.8	31.3	27.7	36.3	49.2	40.3	749
1 jour par semaine ou moins	1.3	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	3.4	5.2	3.8	2.2	2.1	2.2	40
2 à 3 jours par semaine	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	2.5	8.6	5.2	7.9	3.3	1.7	2.8	52
4 à 6 jours par semaine	1.7	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	2.1	1.0	1.9	1.9	0.5	1.5	27
1 fois par jour	1.3	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.5	1.6	1.0	1.5	1.6	0.3	1.2	23
plusieurs fois par jour	54.3	50.2	52.9	77.3	60.0	74.1	67.0	65.4	66.7	57.6	56.3	57.3	54.8	46.1	52.1	968
N**	597	291	888	22	5	27	94	26	120	384	96	480	1282	577	1859	1859
<i>données manquantes</i>	1094	521	1615	87	37	124	324	68	392	485	133	618	2406	917	3323	3323
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	27.3	32.1	28.8	40.0	66.7	44.4	35.0	55.6	39.7	64.9	72.9	66.4	42.1	45.6	43.0	428
11 à 20	49.8	43.8	48.0	60.0	33.3	55.6	50.0	33.3	46.2	30.2	23.7	29.0	42.8	37.3	41.3	411
21 à 30	17.0	20.4	18.1	0.0	0.0	0.0	10.0	11.1	10.3	3.1	3.4	3.1	10.7	14.1	11.6	115
31 ou plus	5.8	3.6	5.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	1.9	0.0	1.6	4.5	3.0	4.1	41
N**	311	137	448	15	3	18	60	18	78	262	59	321	732	263	995	995
<i>données manquantes</i>	43	19	62	2	0	2	11	0	11	19	7	26	85	30	115	115

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2021), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	33.2	100.0	67.6	77.8	85.7	100.0	38.0	20.0	100.0
abstinence limitée dans le temps	21.6	0.0	8.5	11.1	0.0	0.0	7.6	20.0	0.0
consommation contrôlée	31.9	0.0	8.5	11.1	14.3	0.0	30.4	20.0	0.0
aucune limitation envisagée	0.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.3	20.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.9	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	20.7	20.0	0.0
autre	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	385	7	71	9	7	1	92	5	1
<i>données manquantes</i>	1306	102	347	56	42	8	777	43	41

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2021), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	32.9	75.0	78.6	0.0	60.0	-	21.4	100.0	0.0
abstinence limitée dans le temps	15.1	0.0	7.1	0.0	0.0	-	7.1	0.0	0.0
consommation contrôlée	37.5	25.0	7.1	0.0	0.0	-	42.9	0.0	0.0
aucune limitation envisagée	1.3	0.0	0.0	0.0	20.0	-	14.3	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	13.2	0.0	7.1	100.0	20.0	-	14.3	0.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
N**	152	4	14	1	5	0	14	2	0
<i>données manquantes</i>	660	38	80	22	24	1	215	35	5

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2021), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	33.1	90.9	69.4	70.0	75.0	100.0	35.8	42.9	100.0
abstinence limitée dans le temps	19.7	0.0	8.2	10.0	0.0	0.0	7.5	14.3	0.0
consommation contrôlée	33.5	9.1	8.2	10.0	8.3	0.0	32.1	14.3	0.0
aucune limitation envisagée	0.9	0.0	2.4	0.0	8.3	0.0	4.7	14.3	0.0
pas déterminé pour l'instant	12.3	0.0	11.8	10.0	8.3	0.0	19.8	14.3	0.0
autres	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	537	11	85	10	12	1	106	7	1
<i>données manquantes</i>	1966	140	427	78	66	9	992	78	46

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours des 12 derniers mois (2021), hommes

Hommes

	Patients: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	37.1	32.0	28.9	81.8	53.3	80.0	35.0	50.0	45.2
états anxieux/tension nerv. importants	28.7	20.0	16.9	54.5	73.3	60.0	29.3	25.0	35.5
diffic. compréhension/mémoire	10.8	4.0	18.1	36.4	26.7	20.0	13.8	25.0	29.0
altération de l'attention ou hyperactivité	13.6	0.0	20.5	54.5	20.0	20.0	23.6	50.0	29.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.8	4.0	3.6	9.1	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	7.3	4.0	7.2	36.4	6.7	0.0	8.9	50.0	0.0
hallucinations	2.2	0.0	4.8	9.1	6.7	20.0	3.3	0.0	9.7
diffic. à contrôler comportement violent	13.8	8.0	18.1	36.4	13.3	40.0	17.1	25.0	29.0
problèmes psychiques traités avec médic.	21.0	24.0	14.5	45.5	66.7	40.0	14.6	0.0	35.5
pensées suicidaires sérieuses	10.2	8.0	9.6	36.4	40.0	0.0	13.0	0.0	29.0
tentatives de suicide	5.5	8.0	6.0	0.0	0.0	20.0	8.9	0.0	12.9
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.7	0.0	1.2	9.1	6.7	0.0	5.7	0.0	0.0
aucun	41.5	60.0	45.8	18.2	6.7	20.0	42.3	25.0	38.7
N**	491	25	83	11	15	5	123	4	31
<i>données manquantes</i>	<i>1200</i>	<i>84</i>	<i>335</i>	<i>54</i>	<i>34</i>	<i>4</i>	<i>746</i>	<i>44</i>	<i>11</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours des 12 derniers mois (2021), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	42.9	45.5	33.3	25.0	55.6	-	41.4	100.0	100.0
états anxieux/tension nerv. importants	31.7	27.3	33.3	50.0	33.3	-	37.9	0.0	100.0
diffic. compréhension/mémoire	17.1	0.0	16.7	0.0	0.0	-	13.8	0.0	50.0
altération de l'attention ou hyperactivité	12.7	0.0	11.1	0.0	0.0	-	13.8	0.0	50.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	3.4	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	9.8	9.1	11.1	25.0	11.1	-	3.4	100.0	0.0
hallucinations	4.4	9.1	5.6	0.0	11.1	-	3.4	0.0	50.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.8	18.2	16.7	25.0	11.1	-	10.3	0.0	100.0
problèmes psychiques traités avec médic.	32.7	27.3	22.2	75.0	44.4	-	10.3	0.0	100.0
pensées suicidaires sérieuses	15.6	18.2	5.6	25.0	33.3	-	17.2	0.0	100.0
tentatives de suicide	10.2	9.1	0.0	25.0	22.2	-	10.3	0.0	50.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.4	9.1	0.0	0.0	11.1	-	3.4	0.0	0.0
aucun	37.6	27.3	55.6	25.0	22.2	-	48.3	0.0	0.0
N**	205	11	18	4	9	0	29	1	2
<i>données manquantes</i>	607	31	76	19	20	1	200	36	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours des 12 derniers mois (2021), hommes et femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	38.8	36.1	29.7	66.7	54.2	80.0	36.2	60.0	48.5
états anxieux/tension nerv. importants	29.6	22.2	19.8	53.3	58.3	60.0	30.9	20.0	39.4
diffic. compréhension/mémoire	12.6	2.8	17.8	26.7	16.7	20.0	13.8	20.0	30.3
altération de l'attention ou hyperactivité	13.4	0.0	18.8	40.0	12.5	20.0	21.7	40.0	30.3
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.2	2.8	5.0	6.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	8.0	5.6	7.9	33.3	8.3	0.0	7.9	60.0	0.0
hallucinations	2.9	2.8	5.0	6.7	8.3	20.0	3.3	0.0	12.1
diffic. à contrôler comportement violent	12.4	11.1	17.8	33.3	12.5	40.0	15.8	20.0	33.3
problèmes psychiques traités avec médic.	24.4	25.0	15.8	53.3	58.3	40.0	13.8	0.0	39.4
pensées suicidaires sérieuses	11.8	11.1	8.9	33.3	37.5	0.0	13.8	0.0	33.3
tentatives de suicide	6.9	8.3	5.0	6.7	8.3	20.0	9.2	0.0	15.2
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.9	2.8	1.0	6.7	8.3	0.0	5.3	0.0	0.0
aucun	40.4	50.0	47.5	20.0	12.5	20.0	43.4	20.0	36.4
N**	696	36	101	15	24	5	152	5	33
<i>données manquantes</i>	<i>1807</i>	<i>115</i>	<i>411</i>	<i>73</i>	<i>54</i>	<i>5</i>	<i>946</i>	<i>80</i>	<i>14</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2021)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	43.2	39.8	40.6	406
filles/fils	18.6	12.3	13.8	138
sœur/frère	5.1	5.4	5.3	53
conjoint-e/partenaire	24.2	36.3	33.4	334
autre proche/parent-e	1.3	1.2	1.2	12
collègue/ami-e	4.7	1.7	2.4	24
employeur/se, enseignant-e	0.4	0.8	0.7	7
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.1	0.1	1
autre	2.5	2.4	2.4	24
N**	236	763	999	999
<i>données manquantes</i>	2	3	5	5

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2021)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	52.4	525
héroïne	1.9	19
méthadone	0.5	5
buprénorphine	0.0	0
fentanyl	0.1	1
autres opioïdes	0.2	2
cocaïne en poudre	8.1	81
crack	0.5	5
autre forme de cocaïne	0.0	0
amphétamines	0.7	7
méthamphétamines	0.4	4
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.4	4
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.1	1
barbituriques	0.1	1
benzodiazépines	0.7	7
GHB/GBL	0.1	1
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1
LSD	0.2	2
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.0	0
cannabis	16.8	168
tabac	0.4	4
autre substance	0.3	3
jeu pathologique	3.1	31
dépendances aux ordinateurs/Internet	5.3	53
troubles alimentaires	1.9	19
autre comportement de type addictif	5.7	57
N**	1001	1001
<i>données manquantes</i>	3	3

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	66.0			72.1			84.5			78.6			21.2			62.3			3784
femmes	34.0			27.9			15.5			21.4			78.8			37.7			2288
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	1613	831	2444	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	220	817	1037	3784	2288	6072	6072
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.9	3.0	6.0	1.1	2.2	2.0	1.5	1.8	108
15-19	1.9	1.2	1.6	1.7	6.5	3.0	2.0	6.8	2.7	53.2	61.8	55.1	2.8	2.1	2.3	16.2	10.5	14.0	850
20-24	3.3	3.3	3.3	3.4	4.3	3.6	9.5	10.8	9.7	14.7	12.9	14.3	2.3	3.7	3.4	7.9	6.0	7.2	433
25-29	6.4	5.7	6.1	5.0	10.9	6.7	21.4	17.6	20.8	8.8	6.0	8.2	6.5	4.9	5.2	9.2	6.3	8.1	490
30-34	9.9	6.9	8.8	9.2	19.6	12.1	21.4	23.0	21.6	8.1	4.7	7.4	6.9	10.2	9.5	11.2	9.2	10.4	631
35-39	12.3	13.1	12.6	16.0	13.0	15.2	18.4	13.5	17.6	5.0	6.0	5.2	6.0	10.6	9.6	10.7	10.9	10.8	651
40-44	12.3	10.7	11.8	20.2	13.0	18.2	13.7	13.5	13.7	2.8	2.6	2.8	9.2	10.0	9.8	9.8	9.3	9.6	581
45-49	11.1	11.9	11.4	20.2	15.2	18.8	7.2	9.5	7.6	2.7	0.9	2.3	10.1	14.5	13.6	8.2	10.7	9.1	552
50-54	13.7	14.1	13.8	16.0	6.5	13.3	4.2	0.0	3.6	0.9	0.9	0.9	13.8	16.4	15.8	8.5	12.2	9.9	598
55-59	12.0	11.0	11.7	6.7	8.7	7.3	1.7	5.4	2.3	0.4	0.0	0.3	15.2	13.5	13.9	7.1	9.6	8.0	486
60-64	8.3	9.5	8.7	1.7	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	8.3	5.2	5.9	4.4	5.7	4.9	298
65-69	4.3	6.3	5.0	0.0	2.2	0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	6.0	3.2	3.8	2.5	3.7	3.0	181
70-74	2.7	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.7	2.4	1.5	2.4	1.9	112
75 et plus	1.7	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2.3	2.7	2.7	1.0	1.9	1.3	79
N**	1612	829	2441	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	217	801	1018	3780	2270	6050	6050
données manquantes	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19	4	18	22	22
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	46.5	48.4	47.2	42.7	38.7	41.6	34.9	34.4	34.8	23.3	21.7	23.0	47.1	46.3	46.5	37.8	42.5	39.6	
écart-type	13.6	13.9	13.7	9.7	11.6	10.4	8.9	10.1	9.1	9.3	8.7	9.2	16.8	13.9	14.5	15.8	16.1	16.1	
1er quartile	36.4	38.0	37.0	35.8	30.9	34.9	28.4	28.0	28.2	17.1	16.6	17.0	36.2	36.4	36.3	24.4	30.3	26.4	
valeur médiane	46.8	48.9	47.5	43.4	37.5	42.2	34.0	33.8	33.9	18.6	18.1	18.6	50.2	47.6	48.0	36.5	42.9	38.9	
3e quartile	56.3	58.5	57.0	50.0	46.1	49.6	40.5	42.1	40.7	27.2	22.9	26.4	58.5	55.4	56.1	50.0	54.3	51.8	
N**	1612	829	2441	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	217	801	1018	3780	2270	6050	
données manquantes	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19	4	18	22	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties				
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																				
célibataire	47.4	38.0	44.2	70.2	62.5	68.5	78.1	77.4	78.0	95.2	93.9	94.9	21.1	25.1	24.3	67.6	50.3	61.5	2056	
marié-e	31.6	27.3	30.1	10.5	12.5	11.0	9.7	3.2	8.8	2.5	2.5	2.5	56.3	49.1	50.6	19.3	26.2	21.7	726	
séparé-e	3.8	4.6	4.0	1.8	12.5	4.1	1.0	3.2	1.3	0.7	0.6	0.7	1.4	7.4	6.2	2.1	4.1	2.8	94	
divorcé-e	16.0	24.5	19.0	15.8	12.5	15.1	10.2	16.1	11.0	1.5	3.1	1.8	16.9	14.8	15.3	10.0	16.2	12.2	406	
veuf/veuve	0.9	5.2	2.4	1.8	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.1	4.2	3.2	3.4	0.8	3.1	1.6	53	
partenariat enregistré	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	6	
N**	879	461	1340	57	16	73	196	31	227	598	163	761	71	283	354	2171	1170	3341	3341	
données manquantes	734	370	1104	62	30	92	206	43	249	257	70	327	149	534	683	1613	1118	2731	2731	
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	13.2	13.4	13.3	1.6	4.8	2.4	13.4	17.9	14.0	5.7	2.8	5.1	25.0	15.8	17.7	10.2	11.0	10.5	422	
périphérie des grands centres	18.6	18.5	18.6	25.8	0.0	19.3	26.7	25.6	26.6	8.3	7.9	8.2	6.0	4.9	5.2	15.2	11.0	13.7	552	
villes de moyenne importance	12.5	15.1	13.4	3.2	0.0	2.4	13.8	7.7	12.9	26.2	28.8	26.8	19.0	19.0	19.0	17.1	19.2	17.9	719	
petites villes	29.0	26.9	28.3	41.9	61.9	47.0	29.1	33.3	29.7	30.9	35.6	31.9	27.0	30.1	29.5	30.6	31.2	30.8	1240	
campagne	26.6	26.1	26.4	27.4	33.3	28.9	17.0	15.4	16.8	28.9	24.9	28.1	23.0	30.1	28.7	26.9	27.6	27.1	1092	
N**	1096	583	1679	62	21	83	247	39	286	664	177	841	100	385	485	2584	1441	4025	4025	
données manquantes	517	248	765	57	25	82	155	35	190	191	56	247	120	432	552	1200	847	2047	2047	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.1	39.5	39.2	57.0	48.6	54.3	39.6	45.0	40.3	16.0	12.6	15.2	10.9	13.2	12.8	30.8	29.0	30.2	1241
avec famille d'origine	7.5	4.3	6.4	13.9	16.2	14.7	13.1	10.0	12.7	65.9	60.0	64.6	9.4	7.9	8.1	27.3	17.2	23.9	982
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.1	48.5	46.3	16.5	32.4	21.6	35.8	30.0	35.0	9.5	11.6	10.0	76.6	75.7	75.9	33.1	45.3	37.2	1531
avec des amis ou d'autres personnes	3.8	3.2	3.6	2.5	0.0	1.7	5.0	0.0	4.3	3.1	4.7	3.4	1.6	1.4	1.5	3.5	3.4	3.5	142
en prison	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.9	0.8	0.0	0.7	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	6
institution/foyer	2.6	2.7	2.6	6.3	2.7	5.2	2.7	7.5	3.3	2.5	3.7	2.7	1.6	0.0	0.3	2.8	2.4	2.7	109
hôpital/clinique	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
autre	1.8	1.6	1.7	2.5	0.0	1.7	2.7	5.0	3.0	2.9	6.8	3.8	0.0	1.8	1.5	2.3	2.4	2.3	96
N**	1188	625	1813	79	37	116	260	40	300	683	190	873	64	280	344	2720	1392	4112	4112
données manquantes	425	206	631	40	9	49	142	34	176	172	43	215	156	537	693	1064	896	1960	1960
Situation de domicile*																			
logement stable	95.0	96.6	95.5	88.9	94.6	90.7	94.2	84.2	92.9	94.1	89.9	93.2	96.8	97.2	97.1	94.4	95.3	94.7	3853
logement instable/SDF	3.2	1.8	2.7	7.4	2.7	5.9	2.3	13.2	3.7	3.3	4.3	3.5	1.6	2.8	2.6	3.1	2.8	3.0	122
en prison	0.2	0.0	0.1	1.2	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
institution/foyer/hôpital/autre	1.6	1.6	1.6	2.5	2.7	2.5	3.1	2.6	3.0	2.7	5.3	3.2	1.6	0.0	0.3	2.3	1.9	2.2	88
N**	1170	622	1792	81	37	118	258	38	296	675	188	863	63	283	346	2691	1377	4068	4068
données manquantes	443	209	652	38	9	47	144	36	180	180	45	225	157	534	691	1093	911	2004	2004
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	37.0	38.9	37.7	50.0	25.0	42.9	28.9	37.5	30.3	72.1	61.3	69.7	10.2	21.6	19.6	45.0	37.6	42.2	961
relations temporaires	2.0	2.9	2.4	5.0	0.0	3.6	1.7	16.7	4.1	3.4	9.7	4.8	2.0	1.3	1.4	2.3	3.6	2.8	64
partenaire fixe, vivant séparé	9.5	13.1	10.8	5.0	0.0	3.6	20.7	25.0	21.4	10.8	19.4	12.7	8.2	12.1	11.4	10.5	13.6	11.7	266
partenaire fixe, ménage commun	51.4	45.1	49.1	40.0	75.0	50.0	48.8	20.8	44.1	13.6	9.7	12.7	79.6	65.1	67.6	42.1	45.2	43.3	986
N**	683	375	1058	20	8	28	121	24	145	323	93	416	49	232	281	1412	865	2277	2277
données manquantes	930	456	1386	99	38	137	281	50	331	532	140	672	171	585	756	2372	1423	3795	3795

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

Source de revenu principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Source de revenu principale*																				
salaire	56.0	47.0	52.8	33.3	21.4	30.5	64.9	64.5	64.8	26.8	13.7	24.0	65.2	69.7	68.8	47.5	47.4	47.5	1620	
économies, épargne	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	1.2	0.9	1.2	1.0	1.1	38	
rente (AVS, AI ou autre)	18.8	27.8	22.0	17.8	28.6	20.3	8.5	9.7	8.7	3.3	3.3	3.3	16.9	11.0	12.2	12.6	18.1	14.6	497	
aide sociale	13.8	8.7	12.0	31.1	28.6	30.5	14.9	22.6	16.0	11.1	18.3	12.6	4.5	2.1	2.6	12.1	8.1	10.7	364	
assurance-chômage	3.5	2.2	3.1	6.7	0.0	5.1	4.8	0.0	4.1	1.4	2.0	1.5	1.1	0.9	0.9	2.9	1.7	2.4	83	
soutien du/de la partenaire	0.7	6.0	2.6	0.0	7.1	1.7	0.5	0.0	0.5	0.5	0.7	0.5	0.0	7.4	5.9	0.5	5.4	2.3	78	
soutien parents/proches/amis	2.6	3.4	2.9	6.7	14.3	8.5	3.7	0.0	3.2	54.4	59.5	55.5	12.4	6.8	8.0	21.1	16.1	19.3	657	
deal, petit trafic	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3	
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
assurance indemnités journalières	0.5	1.4	0.9	2.2	0.0	1.7	0.5	0.0	0.5	0.7	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.6	21	
autre	2.2	1.8	2.1	2.2	0.0	1.7	0.5	3.2	0.9	1.2	1.3	1.2	0.0	0.9	0.7	1.5	1.3	1.4	48	
N**	911	496	1407	45	14	59	188	31	219	579	153	732	89	337	426	2175	1235	3410	3410	
<i>données manquantes</i>	702	335	1037	74	32	106	214	43	257	276	80	356	131	480	611	1609	1053	2662	2662	
Taux d'activité principal*																				
activ. à plein temps (dès 70%)	50.6	23.3	41.3	28.6	6.7	23.4	57.2	40.9	55.3	15.8	4.7	13.5	61.5	45.2	48.4	39.9	27.0	35.4	1062	
activité à temps partiel	6.3	29.5	14.2	6.1	13.3	7.8	3.6	36.4	7.4	3.1	6.8	3.9	9.2	30.4	26.3	4.9	24.4	11.7	351	
jobs occasionnels	0.9	1.0	0.9	4.1	0.0	3.1	1.8	0.0	1.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.7	22	
en formation	3.7	2.5	3.3	6.1	13.3	7.8	5.4	0.0	4.8	61.9	69.6	63.6	7.7	8.9	8.7	24.7	19.4	22.8	686	
sans travail, en quête d'emploi	5.7	5.7	5.7	8.2	6.7	7.8	9.0	4.5	8.5	3.1	4.7	3.4	0.0	1.1	0.9	5.0	3.8	4.6	138	
sans travail, sans recherche d'emploi	7.8	3.4	6.3	16.3	26.7	18.8	6.6	4.5	6.4	5.5	4.7	5.3	0.0	1.1	0.9	6.4	3.0	5.2	157	
rentier/rentière	11.6	17.9	13.8	0.0	6.7	1.6	0.6	0.0	0.5	0.2	0.7	0.3	16.9	7.8	9.6	5.9	10.2	7.4	222	
incapacité de travail	7.3	9.6	8.1	16.3	20.0	17.2	7.8	4.5	7.4	3.1	1.4	2.7	1.5	3.7	3.3	6.0	6.6	6.2	187	
femme/homme au foyer	0.0	2.7	0.9	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	1.5	1.2	0.1	1.7	0.6	19	
autre	6.1	4.4	5.5	12.2	6.7	10.9	7.8	9.1	8.0	6.6	6.8	6.6	3.1	0.4	0.9	6.2	3.5	5.3	159	
N**	784	407	1191	49	15	64	166	22	188	549	148	697	65	270	335	1957	1046	3003	3003	
<i>données manquantes</i>	829	424	1253	70	31	101	236	52	288	306	85	391	155	547	702	1827	1242	3069	3069	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	31.4	34.5	32.4	42.9	50.0	45.5	22.9	10.0	20.0	15.6	10.0	14.9	-	-	-	25.4	30.2	26.8	149
apprenti-e, stagiaire	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.2	20.3	10.0	18.9	-	-	-	4.3	3.1	4.0	22
manœuvre, aide	3.3	5.0	3.9	14.3	25.0	18.2	11.4	0.0	8.9	4.7	10.0	5.4	-	-	-	4.5	5.0	4.7	26
ouvrier/ère formé-e sur le tas	3.7	5.0	4.2	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.0	4.4	3.4	19
ouvrier/ère formé-e (CFC)	10.3	8.4	9.7	14.3	0.0	9.1	14.3	10.0	13.3	20.3	0.0	17.6	-	-	-	12.8	8.2	11.5	64
contremaître-sse	2.5	0.0	1.7	14.3	0.0	9.1	5.7	0.0	4.4	3.1	0.0	2.7	-	-	-	3.0	0.0	2.2	12
employé-e non qualifié-e	23.1	31.1	25.8	0.0	25.0	9.1	14.3	40.0	20.0	12.5	20.0	13.5	-	-	-	20.2	29.6	22.8	127
empl. qualifié-e, cadre moyen	13.6	10.1	12.5	14.3	0.0	9.1	14.3	0.0	11.1	4.7	0.0	4.1	-	-	-	11.8	8.8	11.0	61
employé-e, cadre supérieur	5.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.5	0.6	3.4	19
indépendant-e	5.4	4.2	5.0	0.0	0.0	0.0	11.4	10.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.3	3.8	4.1	23
écolier/ère, étudiant-e	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	50.0	23.0	-	-	-	5.5	5.7	5.6	31
autre statut	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.5	0.6	0.5	3
N**	242	119	361	7	4	11	35	10	45	64	10	74	0	0	0	397	159	556	556
données manquantes	1371	712	2083	112	42	154	367	64	431	791	223	1014	220	817	1037	3387	2129	5516	5516

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	55.1	52.1	54.1	35.3	37.0	35.8	44.1	36.5	42.9	66.2	65.8	66.1	72.1	74.5	74.0	57.5	61.9	59.2	3583
fin régulière avec transfert	7.3	8.3	7.7	15.1	10.9	13.9	8.0	12.2	8.7	7.8	8.7	8.0	4.1	3.6	3.7	7.8	7.2	7.6	459
changement de domicile	1.9	1.9	1.9	8.4	4.3	7.3	4.0	1.4	3.6	1.2	3.0	1.6	0.9	0.6	0.7	2.1	1.7	1.9	118
hospitalisation	0.2	0.7	0.4	0.8	0.0	0.6	0.5	1.4	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	19
détention	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9
perte de contact	26.7	27.1	26.9	30.3	28.3	29.7	32.8	33.8	33.0	18.7	15.6	18.1	17.8	16.2	16.5	24.0	21.1	22.9	1388
rupture explicite	5.5	6.9	6.0	4.2	6.5	4.8	6.3	6.8	6.3	3.3	2.6	3.1	1.4	2.9	2.6	5.0	4.6	4.9	294
décès	1.6	1.2	1.4	3.4	8.7	4.8	1.8	4.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	1.1	0.8	1.0	61
autre raison	1.6	1.7	1.6	1.7	4.3	2.4	2.0	4.1	2.3	2.3	4.3	2.8	3.2	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1	126
N**	1609	829	2438	119	46	165	399	74	473	854	231	1085	219	815	1034	3775	2282	6057	6057
données manquantes	4	2	6	0	0	0	3	0	3	1	2	3	1	2	3	9	6	15	15

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

Destination des transferts***	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Cannabis	Proches	Toutes sorties	N												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
	%	%	%	%	%	%													
traitement résidentiel	28.4	18.8	24.8	14.3	0.0	12.5	15.0	33.3	19.2	22.0	0.0	17.0	0.0	15.4	13.3	22.3	16.5	20.4	58
structure/clinique de jour	3.7	2.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	1.8	5
prise en charge ambulatoire	40.7	43.8	41.9	57.1	50.0	56.3	35.0	33.3	34.6	36.6	50.0	39.6	100.0	46.2	53.3	42.6	45.4	43.5	124
appartement protégé	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.7	2
autre institution spécialisée	25.9	35.4	29.5	28.6	50.0	31.3	45.0	33.3	42.3	41.5	50.0	43.4	0.0	38.5	33.3	31.9	37.1	33.7	96
N**	81	48	129	14	2	16	20	6	26	41	12	53	2	13	15	188	97	285	285
données manquantes	37	21	58	4	3	7	12	3	15	26	8	34	7	16	23	106	68	174	174

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

Cause de décès****	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Cannabis	Proches	Toutes sorties	N												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
	%	%	%	%	%	%													
suicide	10.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10.7	10.0	10.5	4
accident	10.5	33.3	16.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	10.7	30.0	15.8	6
maladie	57.9	66.7	60.0	0.0	50.0	25.0	50.0	0.0	40.0	-	-	-	-	-	-	57.1	60.0	57.9	22
surdose ou intoxication aiguë	5.3	0.0	4.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	20.0	-	-	-	-	-	-	10.7	0.0	7.9	3
autre cause de décès	15.8	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	10.7	0.0	7.9	3
N**	19	6	25	2	2	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	28	10	38	38
données manquantes	6	4	10	2	2	4	3	2	5	0	0	0	1	0	1	15	8	23	23

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2021)

Durée de la prise en charge* (%)	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
1 semaine ou moins	4.5	3.7	4.2	0.8	4.3	1.8	2.2	2.7	2.3	5.3	6.9	5.6	14.5	9.1	10.2	4.9	5.8	5.3	320
> 1 semaine à 1 mois	3.2	3.4	3.3	2.5	2.2	2.4	3.7	1.4	3.4	9.2	12.9	10.0	0.0	3.4	2.7	4.5	4.2	4.4	267
> 1 à 2 mois	3.7	2.3	3.2	4.2	0.0	3.0	3.7	5.4	4.0	9.8	9.4	9.7	5.0	5.0	5.0	5.8	4.2	5.2	316
>2 à 3 mois	3.8	3.4	3.6	5.0	0.0	3.6	5.7	0.0	4.8	6.8	6.0	6.6	4.5	5.9	5.6	4.9	4.3	4.7	283
>3 à 6 mois	12.3	13.5	12.7	7.6	8.7	7.9	16.2	18.9	16.6	16.8	18.5	17.2	16.8	14.6	15.0	14.5	15.0	14.7	892
>6 mois à 1 an	32.6	29.1	31.4	24.4	23.9	24.2	31.3	35.1	31.9	30.9	27.9	30.2	38.2	34.3	35.1	33.0	31.9	32.6	1978
>1 à 2 ans	21.9	25.0	23.0	16.8	32.6	21.2	21.1	24.3	21.6	14.0	9.0	13.0	14.5	19.8	18.7	18.4	21.1	19.4	1178
>2 à 3 ans	8.9	8.2	8.7	10.9	10.9	10.9	9.7	2.7	8.6	4.0	5.6	4.3	2.7	4.4	4.1	6.9	6.3	6.7	406
>3 à 5 ans	4.2	5.7	4.7	8.4	6.5	7.9	3.7	8.1	4.4	2.1	1.7	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	4.0	3.8	228
>5 à 10 ans	4.0	4.6	4.2	15.1	6.5	12.7	2.0	1.4	1.9	1.1	2.1	1.3	0.5	0.7	0.7	2.9	2.6	2.8	168
plus de 10 ans	0.9	1.2	1.0	4.2	4.3	4.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	36
N**	1613	831	2444	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	220	817	1037	3784	2288	6072	6072
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durée (en semaines)																			
moyenne	71.3	78.9	73.9	134.7	124.5	131.9	59.3	56.6	58.9	38.5	38.3	38.4	41.3	43.9	43.4	58.8	59.8	59.2	
écart-type	98.0	108.0	101.5	165.7	181.7	169.8	72.3	58.4	70.2	48.4	56.1	50.1	72.1	50.4	55.7	84.7	84.9	84.8	
1er quartile	22.4	23.0	22.7	28.3	31.9	29.3	19.1	21.6	19.3	8.7	5.6	8.0	13.0	13.1	13.1	16.4	17.6	16.9	
valeur médiane	41.9	45.0	43.0	61.9	73.7	63.0	38.7	35.4	38.6	26.1	21.7	25.0	28.0	31.0	30.0	34.7	35.6	35.0	
3e quartile	79.6	89.9	82.5	198.0	105.4	147.9	72.8	63.1	71.4	48.7	43.0	47.6	45.6	56.9	54.0	64.0	67.1	65.1	
N**	1613	831	2444	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	220	817	1037	3784	2288	6072	
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	98.9	99.2	99.0	42.1	33.3	39.6	93.8	90.0	93.3	100.0	99.3	99.9	97.6	97.3	97.5	2401
oui	1.1	0.8	1.0	57.9	66.7	60.4	6.2	10.0	6.7	0.0	0.7	0.1	2.4	2.7	2.5	61
N**	710	378	1088	38	15	53	130	20	150	523	145	668	1715	747	2462	2462
<i>données manquantes</i>	903	453	1356	81	31	112	272	54	326	332	88	420	1849	724	2573	2573
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	5.0	1.6	1
méthadone	75.0	66.7	72.7	95.5	80.0	90.6	75.0	100.0	80.0	-	100.0	100.0	87.8	75.0	83.6	51
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	4.5	20.0	9.4	25.0	0.0	20.0	-	0.0	0.0	7.3	15.0	9.8	6
autres substances	25.0	33.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	4.9	5.0	4.9	3
N**	8	3	11	22	10	32	8	2	10	0	1	1	41	20	61	61
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substitution après la prise en charge*																
non	99.6	99.4	99.5	64.7	50.0	60.9	96.8	87.5	95.8	100.0	98.5	99.7	98.7	98.0	98.5	2294
oui	0.4	0.6	0.5	35.3	50.0	39.1	3.2	12.5	4.2	0.0	1.5	0.3	1.3	2.0	1.5	35
N**	668	360	1028	34	12	46	126	16	142	497	134	631	1621	708	2329	2329
<i>données manquantes</i>	945	471	1416	85	34	119	276	58	334	358	99	457	1943	763	2706	2706
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	33.3	50.0	40.0	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-	50.0	50.0	9.5	21.4	14.3	5
traitement de substitution	66.7	50.0	60.0	91.7	100.0	94.4	100.0	100.0	100.0	-	50.0	50.0	90.5	78.6	85.7	30
N**	3	2	5	12	6	18	4	2	6	0	2	2	21	14	35	35
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Postcure prévue et mise en place*																
non	91.6	87.6	90.4	92.3	84.6	89.7	91.0	88.9	90.8	93.3	93.8	93.4	92.9	88.6	91.8	944
oui	8.4	12.4	9.6	7.7	15.4	10.3	9.0	11.1	9.2	6.7	6.3	6.6	7.1	11.4	8.2	84
N**	404	178	582	26	13	39	67	9	76	149	32	181	764	264	1028	1028
<i>données manquantes</i>	1209	653	1862	93	33	126	335	65	400	706	201	907	2800	1207	4007	4007
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
service de postcure de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
appartement protégé extérieur	6.3	4.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.6	3.8	3
service de postcure extérieur	15.6	19.0	17.0	50.0	0.0	25.0	33.3	100.0	42.9	44.4	100.0	50.0	23.5	25.0	24.1	19
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	12.5	14.3	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	10.7	8.9	7
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	6.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	20.0	7.8	0.0	5.1	4
autre centre de consultation	18.8	23.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	15.7	21.4	17.7	14
groupe d'entraide	15.6	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	6.3	5
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	28.1	38.1	32.1	50.0	100.0	75.0	66.7	0.0	57.1	22.2	0.0	20.0	33.3	39.3	35.4	28
N**	32	21	53	2	2	4	6	1	7	9	1	10	51	28	79	79
<i>données manquantes</i>	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	5	5

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2021)

Problèmes addictifs à la sortie*	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcool	78.2	84.9	80.4	26.4	20.0	24.5	17.9	12.5	17.1	14.7	9.1	13.6	47.8	61.5	51.6	1281
héroïne	2.7	3.4	3.0	48.6	33.3	44.1	3.3	2.5	3.2	0.9	0.0	0.8	4.4	4.0	4.3	107
méthadone	1.8	3.0	2.2	11.1	0.0	7.8	1.4	0.0	1.2	0.6	0.0	0.5	1.9	2.0	1.9	48
buprénorphine	1.6	3.0	2.1	2.8	3.3	2.9	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.5	2.2	1.7	41
fentanyl	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.4	2.0	1.6	39
autres opioides	1.5	3.0	2.0	5.6	10.0	6.9	0.9	0.0	0.8	0.6	1.3	0.8	1.5	2.6	1.8	44
cocaïne en poudre	5.9	6.0	5.9	18.1	10.0	15.7	69.3	70.0	69.4	3.8	5.2	4.0	13.4	9.4	12.3	305
crack	1.8	3.2	2.2	4.2	3.3	3.9	5.7	5.0	5.6	0.6	0.0	0.5	2.1	2.6	2.2	55
autre forme de cocaïne	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.2	2.0	1.4	35
amphétamines	2.1	3.4	2.5	2.8	0.0	2.0	4.2	2.5	4.0	0.9	2.6	1.3	2.7	3.2	2.8	70
méthamphétamines	1.6	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.3	0.0	0.3	1.7	2.2	1.9	46
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.8	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	2.5	1.6	1.3	2.6	1.5	2.0	3.8	2.5	61
cathinones synthétiques	1.6	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.9	0.0	0.8	1.4	2.3	1.7	41
autres stimulants	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	1.4	0.0	1.2	0.3	0.0	0.3	1.3	2.0	1.5	37
barbituriques	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	38
benzodiazépines	2.5	3.8	3.0	12.5	16.7	13.7	2.8	7.5	3.6	0.9	0.0	0.8	3.6	4.5	3.9	96
GHB/GBL	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.2	1.6	39
autres somnifères et tranquillisants	1.6	3.0	2.1	0.0	3.3	1.0	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.5	1.2	2.2	1.5	37
LSD	2.0	3.0	2.3	1.4	0.0	1.0	1.4	0.0	1.2	0.6	1.3	0.8	2.0	2.3	2.1	51
kétamine	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.7	2.3	1.9	47
autres hallucinogènes	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	38
substances volatiles	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	37
cannabis	6.6	5.8	6.3	19.4	10.0	16.7	14.6	15.0	14.7	73.1	81.8	74.8	20.7	15.3	19.2	476
tabac	10.0	11.1	10.4	8.3	3.3	6.9	8.0	12.5	8.7	9.7	5.2	8.8	9.2	9.8	9.4	233
autre substance	1.6	3.0	2.1	1.4	6.7	2.9	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.8	2.6	2.1	51
jeu pathologique	2.1	3.4	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.9	0.0	0.8	5.4	4.3	5.1	127
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.1	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	1.3	0.0	1.0	5.0	3.2	4.5	112
troubles alimentaires	1.8	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.3	1.3	0.5	1.5	3.5	2.1	51
autre comportement de type addictif	1.8	2.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	2.0	2.9	2.2	55
aucun	19.2	13.9	17.4	11.1	23.3	14.7	19.3	20.0	19.4	21.9	14.3	20.4	19.4	15.3	18.3	454
N**	912	469	1381	72	30	102	212	40	252	320	77	397	1790	693	2483	2483
données manquantes	701	362	1063	47	16	63	190	34	224	535	156	691	1774	778	2552	2552

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	55.9	39.1	50.6	26.3	75.0	34.8	31.8	60.0	34.7	64.2	55.0	62.4	54.1	43.0	51.2	348
une fois	9.0	11.3	9.7	10.5	0.0	8.7	11.4	0.0	10.2	9.9	10.0	9.9	9.6	10.1	9.7	66
deux fois	5.5	6.8	5.9	15.8	0.0	13.0	11.4	0.0	10.2	3.7	10.0	5.0	6.6	7.3	6.8	46
trois ou quatre fois	9.3	9.0	9.2	10.5	0.0	8.7	11.4	40.0	14.3	4.9	10.0	5.9	8.2	10.1	8.7	59
cinq fois ou plus	20.3	33.8	24.6	36.8	25.0	34.8	34.1	0.0	30.6	17.3	15.0	16.8	21.6	29.6	23.7	161
N**	290	133	423	19	4	23	44	5	49	81	20	101	501	179	680	680
données manquantes	1323	698	2021	100	42	142	358	69	427	774	213	987	3063	1292	4355	4355
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.3	97.3	97.9	10.0	100.0	18.2	31.0	100.0	35.5	34.6	11.1	28.6	71.3	85.1	75.6	229
opioïdes	1.7	0.0	1.0	80.0	100.0	81.8	3.4	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	5.3	1.1	4.0	12
cocaïne et dérivés	8.4	4.1	6.7	20.0	100.0	27.3	86.2	50.0	83.9	7.7	0.0	5.7	20.1	5.3	15.5	47
autres stimulants	2.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	2.9	1.1	2.3	7
somnifères/tranquillisants	1.7	4.1	2.6	0.0	100.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.3	3.6	11
hallucinogènes	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	2
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	9.2	5.4	7.8	30.0	0.0	27.3	27.6	0.0	25.8	80.8	100.0	85.7	23.9	14.9	21.1	64
tabac	0.8	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	1.3	4
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.6	8
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	2.3	7
troubles alimentaires	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.7	2
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
N**	119	74	193	10	1	11	29	2	31	26	9	35	209	94	303	303
données manquantes	9	7	16	4	0	4	1	0	1	3	0	3	21	8	29	29

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s				
	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																	
jamais	42.3	54.9	46.6	20.0	0.0	16.7	23.3	14.3	21.6	17.1	0.0	14.6	37.5	49.6	41.0	171	
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1	
2 à 3 jours par semaine	2.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	1.7	0.0	1.2	5	
4 à 6 jours par semaine	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.7	0.0	0.5	2	
une fois par jour	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1	
plusieurs fois par jour	54.6	45.1	51.3	80.0	100.0	83.3	73.3	85.7	75.7	78.0	100.0	81.3	59.5	50.4	56.8	237	
N**	196	102	298	5	1	6	30	7	37	41	7	48	296	121	417	417	
<i>données manquantes</i>	1417	729	2146	114	45	159	372	67	439	814	226	1040	3268	1350	4618	4618	
Nombre de cigarettes par jour***																	
0 à 10 cigarettes par jour	23.5	16.0	21.8	33.3	0.0	25.0	23.5	50.0	28.6	34.5	40.0	35.3	26.6	22.2	25.7	46	
11 à 20 cigarettes par jour	55.3	56.0	55.5	0.0	100.0	25.0	52.9	50.0	52.4	48.3	40.0	47.1	52.4	55.6	53.1	95	
21 à 30 cigarettes par jour	18.8	20.0	19.1	33.3	0.0	25.0	11.8	0.0	9.5	13.8	20.0	14.7	16.8	16.7	16.8	30	
31 cigarettes par jour ou plus	2.4	8.0	3.6	33.3	0.0	25.0	11.8	0.0	9.5	3.4	0.0	2.9	4.2	5.6	4.5	8	
N**	85	25	110	3	1	4	17	4	21	29	5	34	143	36	179	179	
<i>données manquantes</i>	28	21	49	1	0	1	6	2	8	5	2	7	42	25	67	67	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2021)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	32.5	37.3	34.1	80.0	57.1	74.1	63.9	83.3	66.7	40.5	18.5	36.7	39.2	38.0	38.9	394
abstinence limitée dans le temps	12.6	11.8	12.3	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.8	3.8	0.0	3.2	8.8	9.1	8.9	90
consommation contrôlée	40.9	39.7	40.5	0.0	14.3	3.7	16.7	8.3	15.5	29.0	44.4	31.6	34.7	37.7	35.5	360
aucune limitation envisagée	2.0	2.0	2.0	10.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	10.7	18.5	12.0	3.7	3.6	3.7	37
pas déterminé pour l'instant	11.1	9.3	10.5	10.0	28.6	14.8	9.7	8.3	9.5	13.0	18.5	13.9	11.8	11.2	11.6	118
autre	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.6	3.1	0.0	2.5	1.8	0.4	1.4	14
N**	406	204	610	20	7	27	72	12	84	131	27	158	737	276	1013	1013
<i>données manquantes</i>	<i>1207</i>	<i>627</i>	<i>1834</i>	<i>99</i>	<i>39</i>	<i>138</i>	<i>330</i>	<i>62</i>	<i>392</i>	<i>724</i>	<i>206</i>	<i>930</i>	<i>2827</i>	<i>1195</i>	<i>4022</i>	<i>4022</i>
Pronostic*																
très bon pronostic	16.3	13.2	15.2	11.1	0.0	7.7	10.6	10.0	10.5	21.2	0.0	17.7	15.8	11.4	14.5	81
bon pronostic	47.4	44.1	46.3	22.2	25.0	23.1	40.4	40.0	40.4	50.0	40.0	48.4	46.4	44.6	45.9	256
plutôt mauvais pronostic	25.1	31.6	27.4	55.6	25.0	46.2	46.8	40.0	45.6	23.1	40.0	25.8	28.8	31.3	29.6	165
mauvais pronostic	11.2	11.0	11.1	11.1	50.0	23.1	2.1	10.0	3.5	5.8	20.0	8.1	8.9	12.7	10.0	56
N**	251	136	387	9	4	13	47	10	57	52	10	62	392	166	558	558
<i>données manquantes</i>	<i>1362</i>	<i>695</i>	<i>2057</i>	<i>110</i>	<i>42</i>	<i>152</i>	<i>355</i>	<i>64</i>	<i>419</i>	<i>803</i>	<i>223</i>	<i>1026</i>	<i>3172</i>	<i>1305</i>	<i>4477</i>	<i>4477</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu