



# Attuazione della strategia di test SARS-CoV-2 (versione dal 02.07.2021)

Occasione dei test		Motivo del test	Metodo di test raccomandato <sup>a</sup> (1. significa massima priorità)	Se test rapido o campioni aggregati positivi: conferma PCR?	Obbligo di segnalazione/ raccolta dati settimanale cantonale	Frequenza	Assunzione dei costi dalla Confederazione <sup>e</sup>	Attuazione secondo		
Persone con sintomi		↑	test PCR singolo o test rapido standard diagnostico	nessuna diagnostica di conferma	segnalabile	una volta	tariffa standard	raccomandazione (UFSP):		
Persone senza sintomi	Indagine e controllo dei focolai (richiesta medica)		↑	1. test rapido standard diagnostico 2. test PCR singolo 3. PCR di saliva a campioni aggregati	nessuna diagnostica di conferma, tranne campioni agr.	test singoli segnalabile	una volta/ripetibile	tariffa standard	} <a href="#">Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione</a>  <a href="#">Raccomandazioni per il rilevamento e la gestione di focolai e incidenti con un alto potenziale di trasmissione</a> (versione tedesca e francese)	
	Test individuali	Test di quarantena	↑	test PCR singolo o test rapido standard diagnostico	nessuna diagnostica di conferma <sup>f</sup>	segnalabile	una volta	tariffa standard		} <a href="#">Dove fare il test?</a>
		Dal 5° giorno dopo la notifica della SwissCovid App		↑	test PCR singolo o test rapido standard diagnostico	nessuna diagnostica di conferma	segnalabile	una volta	tariffa standard	
		Test singolo preventivo		↑	1. test rapido standard diagnostico 2. test rapido standard screening 3. autotest possibile 4. test PCR singolo <sup>b</sup>	se positivo conferma diagnostica	nessuna segnalazione (v. diagnosi di conferma)	possibile una volta al giorno	tariffa standard	
	Servizi sanitari (Spitex compreso)	Pazienti e visitatori	↑	test rapido standard diagnostico	se positivo conferma diagnostica	nessuna segnalazione (v. diagnosi di conferma)	una volta	tariffa di base	raccomandazione (UFSP)	
		Personale e residenti	↑	1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa di base	} requisiti cantionali: <a href="#">Punti di contatto per test ripetitivi nelle aziende</a>  <a href="#">Raccomandazioni per l'esecuzione mirata e ripetuta di test su persone senza sintomi</a>  <a href="#">Promemoria per l'aggregazione di campioni</a>  <a href="#">FAQ sui test mirati e ripetuti nelle aziende</a>	
	Sito di formazione e campi		↑↑	1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico 3. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa ridotta		
	Test ripetitivi per la prevenzione e l'individuazione precoce dei focolai	Aziende (compresi i test al posto della quarantena <sup>c</sup> )		↑	1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico 3. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti		tariffa di base
		Associazioni e eventi		↑	1. test rapido standard diagnostico 2. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti		tariffa di base
		situazioni con una maggiore probabilità di trasmissione		↑	1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico 3. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa ridotta	
Gestione degli hotspots (richiesta dell'autorità cantonale) <sup>d</sup>		↑	1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico	se positivo conferma diagnostica	nessuna segnalazione (v. diagnosi di conferma)	una volta/ripetibile	tariffa ridotta	raccomandazione (UFSP)		
Diagnosi di conferma in caso di test rapidi antigenici positivi		↑	test PCR singolo		unica	una volta	tariffa standard	raccomandazione (UFSP)		

**Gli autotest non sono destinati a test ripetitivi a causa della mancanza di sensibilità/dati e finora nessun risultato convincente nelle prove all'estero!**

**Legenda:**

- ↑ Alto rischio di infezione
- ↑↑ Alto rischio di trasmissione
- ↑ Contatto con persone particolarmente vulnerabili
- ↑↑ Test della popolazione mobile

a) **Test rapidi solo per uso professionale.** Elenco dei test rapidi convalidati da utilizzare: [Test rapidi validati per il SARS-CoV-2](#), [Promemoria per l'aggregazione di campioni](#)  
b) I test PCR non sono coperti in caso di viaggio. I residenti di confine possono anche essere testati più spesso di una volta alla settimana se non sono coperti altri costi. [Scheda informativa: Copertura dei costi di analisi e servizi correlati](#)  
c) Se in un'azienda vengono eseguiti test ripetitivi nell'ambito di un concetto di test cantonale, i dipendenti possono in certi casi continuare a lavorare in un contesto professionale nonostante la quarantena, nel rispetto di severe misure generali.  
d) Nel caso di focolai incontrollati e situazioni in cui la probabilità di trasmissione è significativamente aumentata. Sono dati quando il contatto ravvicinato e prolungato e il soggiorno in stanze poco ventilate con molte persone non possono essere evitati nonostante un buon concetto di protezione. [Rapporto esplicativo relativo alla modifica del 12 marzo 2021, allegato 6. 2.1.1 b, pagina 18](#)  
e) [Scheda informativa: Copertura dei costi di analisi e servizi correlati](#)  
f) Se il test rapido è positivo dopo che la quarantena d'ingresso è stata revocata (dal 7° giorno dopo l'ingresso), è possibile una diagnosi di conferma tramite PCR.