

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni

## Documento di riferimento «Protocollo di monitoraggio»

di cui all'articolo 12d capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) – Stato 01/2021

Motivo del monitoraggio	Età / modalità di diagnostica per immagini (RMN = risonanza magnetica nucleare, MG = mammografia)											
	20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 - 59		60 - 69		70 - 75	
	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG
Rischio nel corso della vita moderatamente elevato (17 – 29 %)	nessuno screening		nessuno screening		-	annuale	-	annuale	-	ogni 2 anni	-	ogni 2 anni
Rischio nel corso della vita fortemente elevato (≥30 %)	nessuno screening		annuale <sup>1)</sup>	annuale <sup>2), 3)</sup>	annuale <sup>1)</sup>	annuale	annuale <sup>1)</sup>	annuale	ogni 2 anni <sup>1), 4)</sup>	ogni 2 anni <sup>4)</sup>	-	ogni 2 anni
Mutazione BRCA1/2	annuale, a partire dai 25 anni <sup>5)</sup>	-	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	-	ogni 2 anni
Mutazione STK11	annuale, a partire dai 25 anni <sup>5)</sup>	-	annuale	annuale <sup>3)</sup>	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	-	ogni 2 anni
Mutazione TP53	annuale	-	annuale	-	annuale	-	annuale	-	annuale	-	nessuno screening	

Motivo del monitoraggio	Età / modalità di diagnostica per immagini (RMN = risonanza magnetica nucleare, MG = mammografia)											
	20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 - 59		60 - 69		70 - 75	
	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG	RMN	MG
Mutazione PTEN	nessuno screening		annuale	annuale <sup>3)</sup>	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	-	ogni 2 anni
Mutazione CDH1	nessuno screening		annuale	annuale <sup>3)</sup>	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	-	ogni 2 anni
Mutazione PALB2	nessuno screening		annuale	annuale <sup>3)</sup>	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	-	ogni 2 anni
Radioterapia al torace o all'intero corpo nella fascia d'età 10-30 anni	annuale, inizio 8-10 anni dopo l'irradiazione <sup>6)</sup>	-	annuale, inizio 8-10 anni dopo l'irradiazione	annuale <sup>3)</sup>	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale <sup>1)</sup>	annuale	-	ogni 2 anni

- 1) soltanto in caso di densità mammaria ACR C o D
- 2) inizio 5 anni prima della prima diagnosi in famiglia, ma al più presto a partire dai 30 anni
- 3) considerare un esame single-view
- 4) annuale, se il rischio nel corso della vita resta >30 % o se il rischio nel corso di 10 anni è >8 %
- 5) rispettivamente a partire da un'età di 5 anni inferiore all'età della prima diagnosi in famiglia se quest'ultima è stata posta prima dei 30 anni
- 6) al più presto a partire dai 25 anni