



LA VACCINAZIONE CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE È RACCOMANDATA:

A) Alle persone con maggiore rischio di complicazioni in caso d'infezione (i costi della vaccinazione di queste persone sono presi a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, a condizione che sia già stata raggiunta la franchigia). Fra queste figurano:

- le persone di 65 anni e più ^x;
- le donne incinte o che hanno partorito nel corso delle 4 settimane precedenti;
- i bambini nati prematuri (nati prima della 33^a settimana di gestazione (< 32 0/7 SG) o con un peso alla nascita inferiore ai 1500 g) a partire dai 6 mesi di età per i primi due inverni dopo la nascita^{**};
- le persone (a partire dai 6 mesi di età^{**}) affette da una delle seguenti malattie croniche ^x: una malattia cardiaca o polmonare (p. es. asma bronchiale), disturbi metabolici con ripercussioni sulla funzione cardiaca, polmonare o renale (p. es. diabete o obesità patologica con IMC ≥40), una malattia neurologica (p. es. morbo di Parkinson, malattia cerebrovascolare) o muscolo-scheletrica con ripercussioni sulla funzione cardiaca, polmonare o renale, un'epatopatia, un'insufficienza renale, un'asplenia o una disfunzione della milza (comprese le emoglobinopatie), un deficit immunitario (p. es. infezione da HIV, cancro, terapia immunosoppressiva);
- ospiti di case di cura e pazienti degenti in istituti per malati cronici ^x.

^x *Per le persone di 75 anni e più e per le persone di 65 anni e più con un fattore di rischio aggiuntivo come sopra elencato, è da preferire di utilizzare un vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio, per proteggere meglio queste persone. La vaccinazione con un vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio è rimborsata per queste persone.*

B) Alle persone regolarmente a contatto, in famiglia, in case per anziani e di cura e i pazienti degenti in strutture per persone affette da malattie croniche o nell'ambito della loro attività privata o lavorativa^{*}**, con:

- persone della categoria A);
- lattanti sotto i 6 mesi d'età (presentano un maggiore rischio di complicazioni e non possono essere vaccinati per via della loro tenera età).

La vaccinazione contro l'influenza è raccomandata in particolare a tutto il personale curante, medico e paramedico, al personale degli asili nido e dei centri diurni, nonché al personale delle case di riposo e di cura, ivi compresi studenti e tirocinanti.

C) Alle persone che hanno un contatto regolare o professionale con pollame domestico o uccelli selvatici per ridurre le ridurre l'incidenza dei casi di influenza stagionale che richiedono una diagnosi differenziale e il rischio di doppia infezione stagionale e aviaria con lo sviluppo di nuovi ricombinanti virali.

Inoltre la vaccinazione contro l'influenza stagionale può essere presa in considerazione **anche per tutte le persone che desiderano ridurre il loro rischio di malattia** per motivi privati e/o professionali.

^{**} *Per i bambini d'età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni che finora non sono mai stati vaccinati contro l'influenza si raccomanda di somministrare la prima volta 2 dosi (a distanza di 4 settimane).* (1)

^{***} *Le «persone regolarmente a contatto» della categoria B) comprendono bambini e adulti di età compresa tra i 6 mesi e i 64 anni. Quando la vaccinazione è indicata in ragione dell'attività professionale, i costi sono generalmente presi a carico dal datore di lavoro.*