



VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Lista di controllo per la vaccinazione**✓ Prima della prima vaccinazione****Accertamento amministrativo**

- Verificare l'assicurazione malattie della persona da vaccinare (AOMS/tessera d'assicurato).
- Verificare l'identità della persona da vaccinare.

Accertamento dell'indicazione

Accertamento in base alla strategia di vaccinazione/raccomandazione di vaccinazione/priorità attuali

1. Persone particolarmente a rischio: persone ≥ 65 anni e adulti < 65 anni con malattie croniche.
Dettagli cfr. raccomandazione di vaccinazione:
www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
2. Personale sanitario a contatto con pazienti e personale di assistenza a persone particolarmente a rischio
3. Contatti stretti delle persone particolarmente a rischio definite (membri adulti della stessa economia domestica o assistenza familiare)
4. Adulti < 65 anni residenti in strutture collettive con un elevato rischio di infezione e di focolaio
5. Tutte le altre persone adulte non appena sarà disponibile una quantità sufficiente di vaccino.

**Accertamento delle controindicazioni/
persone a cui attualmente
non è raccomandata la vaccinazione**

1. Grave ipersensibilità nota a componenti del vaccino (in particolare glicole polietilenico [PEG] o Macrogol)
2. Gravidanza
3. Bambini e adolescenti sotto i 18 anni (per Comirnaty® sotto i 16 anni)

**Accertamento delle misure
precauzionali**

1. Reazioni di ipersensibilità/allergie note in generale?
2. Immunosoppressione (congenita, acquisita, terapia immunosoppressiva compresi i tumori in trattamento) → indicazione a grandi linee da parte del medico specialista e dopo apposita valutazione.

✓ Prima della seconda vaccinazione**Effetti indesiderati della vaccinazione
(EIV) dopo la prima vaccinazione?**

- Registrare la documentazione nell'IT-Tool.
- Gli EIV devono essere notificati a Swissmedic dalla persona che effettua la vaccinazione.

Notifica degli EIV a Swissmedic

- Utilizzare il link verso il sistema di notifica «EIVIS» nell'IT-Tool.
www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/sorveglianza-del-mercato/farmacovigilanza/elvis.html



✓ Esecuzione della prima / seconda vaccinazione

Stato di salute attuale	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare lo stato di salute generale e decidere: è possibile la vaccinazione oggi? • Febbre > 38°C? • La persona da vaccinare ha attualmente sintomi compatibili con la COVID-19 in caso di malattia da COVID-19 confermata negli ultimi tre mesi? → Rimandare la vaccinazione a dopo la scomparsa dei sintomi.
Informazione del cliente	<ul style="list-style-type: none"> • La persona da vaccinare ha domande? • Ha letto il materiale informativo? • Segnalare possibili EIV, in particolare possibili reazioni allergiche.
Consenso del cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Chiedere alla persona da vaccinare il consenso orale alla vaccinazione e alla registrazione elettronica della vaccinazione nel Sistema di dichiarazione. • Necessità di un certificato di vaccinazione elettronico, chiarire in «myCovidVac» / «mie vaccinazioni», se disponibile inserire i dati lì. • Annotare per iscritto il consenso nella scheda di dati per la vaccinazione/IT-Tool. • In caso d'incapacità di discernimento occorre il consenso del rappresentante legale.
Compilazione della scheda di dati per la vaccinazione/registrazione nell'IT-Tool	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare i dati della persona da vaccinare nell'IT-Tool.
Preparazione del vaccino	<ul style="list-style-type: none"> • Cfr. foglietto illustrativo del fabbricante: www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.comirnatyeducation.ch • Non agitare, capovolgere semplicemente, non muovere inutilmente.
Somministrazione del vaccino	<ul style="list-style-type: none"> • Cfr. foglietto illustrativo del fabbricante: www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.comirnatyeducation.ch • i.m. m. deltoide • Entrambe le dosi di vaccino con la stessa sostanza, a distanza di 28 giorni (Comirnaty®: almeno 21 giorni). • Pazienti anticoagulati: effettuare sempre la vaccinazione i.m., è importante una buona compressione dopo l'iniezione. www.bag.admin.ch/calendariovaccinale

✓ Dopo la prima / seconda vaccinazione

Spiegazione del comportamento in caso di EIV	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalare che bisogna notificare gli EIV gravi e inattesi e che il cliente deve rivolgersi al medico/farmacista/centro di vaccinazione. • Se del caso, dare un numero di contatto.
Spiegazione del comportamento in generale dopo la prima/seconda vaccinazione	<ul style="list-style-type: none"> • Continuare a rispettare le regole di comportamento e di igiene. • In caso di necessità di una vaccinazione di richiamo dopo la seconda vaccinazione sarà fornita l'informazione. • Fino a nuovo avviso restano in vigore le regole sull'isolamento e la quarantena.
Consegna dell'attestato di vaccinazione	<ul style="list-style-type: none"> • Consegnare l'attestato di vaccinazione generato dall'IT-Tool o iscrivere la vaccinazione nel certificato di vaccinazione. • Apporre il timbro e la firma della persona che effettua la vaccinazione. • Incollare/annotare il numero di lotto nell'attestato di vaccinazione.
Convocazione al secondo appuntamento	<ul style="list-style-type: none"> • Fissare nell'IT-Tool l'appuntamento nello stesso luogo con lo stesso vaccino. • Consegnare il biglietto dell'appuntamento. • Consegnare il promemoria che spiega come comportarsi dopo la vaccinazione.
Periodo di osservazione dopo la prima/seconda vaccinazione	<ul style="list-style-type: none"> • Sorvegliare in particolare le persone che hanno problemi subito dopo la vaccinazione, p. es. problemi di circolazione. • Tutte le persone vaccinate devono fermarsi nel luogo della vaccinazione per 15-30 minuti dopo la vaccinazione. Le persone con allergie note devono fermarsi 30 minuti.