

# La hepatitis B y el embarazo

## Se recomienda la vacuna contra la hepatitis B a

- jóvenes entre 11 y 15 años
- recién nacidos de madres portadoras del virus de la hepatitis B
- personas que tengan un contacto estrecho con enfermos de hepatitis B o con sus fluidos y secreciones corporales
- consumidores de drogas
- personas que cambian con frecuencia de pareja sexual
- pacientes en diálisis
- hemofílicos
- personas con afecciones crónicas del hígado (por ejemplo hepatitis C)
- personas con inmunodeficiencias
- personas que viajen a regiones en las que la hepatitis B está muy extendida o personas que provengan de estas regiones (África, Asia, islas del Pacífico, Europa Oriental, Cuenca del Mediterráneo, Sudamérica)

El seguro obligatorio de enfermedad asume los costes de la vacunación sea cual sea la indicación (excepción: vacunación para viajeros).

## Infoline vacunaciones 0844 448 448

Para cualquier pregunta, consulte con su médico o llame a la línea de información de Medgate\*, teléfono 0844 448 448 (consulta gratuita, coste de la llamada según su compañía telefónica).

\*Centro de consulta médica Medgate, organizado por la FOPH.

## Internet

Para más información sobre la vacuna, consulte los siguientes sitios Internet:  
[www.sich-impfen.ch](http://www.sich-impfen.ch) y [www.infovac.ch](http://www.infovac.ch)

## Suministro y distribución de la publicación

Puede solicitar ejemplares adicionales a través de:  
BBL, Vertrieb Publikationen  
Postfach  
CH-3003 Bern  
Fax: +41 (0)31 325 50 58  
E-mail: [verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)  
[www.bundespublikationen.admin.ch](http://www.bundespublikationen.admin.ch) o  
[www.bag.admin.ch/shop](http://www.bag.admin.ch/shop)

## Pie de imprenta

Federal Office of Public Health FOPH  
Vaccinations Section  
PO. Box  
CH-3003 Bern

Publication No. 311.285.esp  
BAG OeG 5.09 20EXT0915  
50'000 d 25'000 f 10'000 i 10'000 e  
10'000 esp 10'000 sbk




Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Home Affairs DHA  
Federal Office of Public Health FOPH





## La Hepatitis B

**Hepatitis B: afección del hígado causada por el virus de la hepatitis B (VHB) que puede transmitirse a través de la sangre, de contactos sexuales, así como a los recién nacidos durante el parto, en caso de que la madre sea portadora.**

La infección del hígado mediante VHB puede causar una inflamación hepática crónica o incluso un cáncer de hígado.

El 80% de los contagios en Suiza se producen entre los 15 y los 40 años de edad.

La vacuna contra la hepatitis B protege a los vacunados en un 98% de los casos durante décadas, incluso durante toda la vida, de una posible infección con el VHB.

## Durante el embarazo

**En Suiza se recomienda realizar la prueba de la hepatitis B a todas las embarazadas. También a aquellas que han sido vacunadas.**

**Si el resultado es negativo:** si se dan las condiciones para una vacunación, puede procederse a la misma inmediatamente después del parto o incluso durante la gestación.

**Si el resultado es positivo:** se debe realizar la prueba a todas las personas que conviven con la embarazada en el mismo hogar, así como a las personas allegadas y, en caso de resultado negativo, proceder a vacunarlas.

Si bien es poco frecuente obtener resultados positivos durante el embarazo, estos tienen una gran repercusión sobre el recién nacido.

## El parto y el tiempo después

**Las infecciones contraídas durante el parto suelen ser en su mayoría asintomáticas, no obstante son crónicas en un 90% de los casos.**

La transmisión del virus de la madre al hijo se produce por el contacto con los fluidos corporales de la madre durante el parto.

Las personas que se infectan durante los primeros años de vida corren un mayor riesgo de padecer una cirrosis hepática o un cáncer de hígado y morir prematuramente.

Sobre todo los niños pequeños que conviven con una madre con una infección crónica corren el riesgo de contagiarse mediante el contacto con la sangre u otros fluidos corporales que contengan sangre de la portadora (utilizar un cepillo de dientes común, contacto con lesiones cutáneas con superficies contaminadas).

## Los recién nacidos de madres positivas de VBH

**La vacuna administrada en las primeras 12 horas de vida protege al recién nacido de una madre portadora del VHB del contagio.**

Durante las primeras 12 horas después del parto se administran al bebé la vacuna contra la hepatitis B, así como la inmoglobulina específica\* (IG).

La vacuna contra la hepatitis B se administra en tres dosis en los meses 0, 1 y 6.

La administración combinada de la inmoglobulina y la vacuna inmediatamente después del parto reduce en más de un 90% el riesgo de una transmisión vertical (madre a hijo durante el parto).

La vacunación del recién nacido después del parto permite la lactancia materna sin que ello conlleve un riesgo de transmisión elevado. La madre puede amamantar a su hijo después del parto.

\* Término genérico para anticuerpos. Sustancias susceptibles de neutralizar a los virus.