



Scheda informativa

Consumo di droghe illegali in Svizzera nel 2016

La canapa rimane la sostanza illegale consumata con maggior frequenza in Svizzera. Nel 2016, il 7,3 per cento della popolazione residente in Svizzera a partire dai 15 anni ha dichiarato di aver consumato canapa almeno una volta nei 12 mesi precedenti il sondaggio. Meno dell'1 per cento della popolazione ha dichiarato di aver consumato cocaina (0,7 %) o eroina (<0,1 %) nel corso degli ultimi 12 mesi. Con una quota inferiore all'1 per cento, è raro anche il consumo di altre sostanze illegali (p. es. ecstasy, speed). Le sostanze illegali sono consumate più spesso dagli uomini che dalle donne. Inoltre il consumo è più diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti che nella popolazione in generale. Rispetto al 2011 la prevalenza a 12 mesi è relativamente stabile.

I dati sulla prevalenza sono quelli indicati dagli intervistati nel sondaggio telefonico e di solito sono sottostimati rispetto alla «vera» prevalenza nella popolazione.

	CONSUMO DI CANAPA
Prevalenza nel corso della vita	Il 33,8 per cento della popolazione residente in Svizzera dai 15 anni in su ha consumato canapa almeno una volta nella vita (uomini: 38,9 %; donne: 29,0 %). La prevalenza nel corso della vita è aumentata dal 2011.
Prevalenza a 12 mesi	Il 7,3 per cento della popolazione residente in Svizzera di età superiore ai 15 anni ha consumato canapa almeno una volta negli ultimi 12 mesi (uomini: 9,6 %; donne: 5,1 %). Anche la prevalenza a 12 mesi è aumentata dal 2011.
Differenze di età nel consumo di canapa (negli ultimi 12 mesi)	Nella fascia di età dai 15 ai 24 anni, il 22 per cento circa ha consumato canapa almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Al di sopra di questa fascia di età, i tassi di prevalenza diminuiscono costantemente. La maggior frequenza di consumo tra i più giovani è un fenomeno noto e stabile dal 2011. Anche tra i giovanissimi il consumo non aumenta dal 2011 e presenta addirittura una diminuzione dai 15 ai 19 anni. Nella fascia d'età dai 25 ai 34 anni, invece il consumo sembra aver subito un aumento.
Differenze sociodemografiche nel	Con una prevalenza del 8,7 per cento, la canapa è consumata più frequentemente nelle aree urbane che nelle aree rurali (6,1 %). Il suo



consumo di canapa (negli ultimi 12 mesi)

consumo varia fortemente secondo il livello di formazione e la situazione occupazionale; gli effetti dell'età rivestono un ruolo importante. I più giovani sono più spesso ancora in formazione e hanno quindi un titolo di studio formale inferiore a quello di persone di età superiore. Di conseguenza, le persone in formazione consumano più spesso canapa rispetto a lavoratori e pensionati.

CONSUMO DI COCAINA

Prevalenza nel corso della vita

Il 4,2 per cento della popolazione residente in Svizzera di età superiore ai 15 anni ha consumato cocaina almeno una volta nella vita (uomini: 6,2 %; donne: 2,4 %). Complessivamente le cifre sono aumentate dal 2011, ma sono complessivamente stabili rispetto al 2014 e al 2015.

Prevalenza a 12 mesi

Come negli anni dal 2011 al 2015, circa lo 0,5 per cento della popolazione residente in Svizzera a partire dai 15 anni ha consumato cocaina almeno una volta negli ultimi 12 mesi (uomini: 1,1 %; donne: 0,3 %). Il consumo attuale di cocaina è stabile dal 2011.

CONSUMO DI EROINA

Prevalenza nel corso della vita del consumo di eroina

Lo 0,7 per cento della popolazione residente in Svizzera di età superiore ai 15 anni ha consumato eroina almeno una volta nella vita (uomini: 1,0 %; donne: 0,4 %). Questa prevalenza è rimasta relativamente stabile dal 2011 o è addirittura in leggera diminuzione.

CONSUMO DI ALTRE DROGHE

Prevalenza negli ultimi 12 mesi di altre droghe (diverse da canapa, eroina e cocaina)

Tra le altre droghe, la popolazione residente in Svizzera a partire dai 15 anni consuma con maggiore frequenza LSD, speed, ecstasy e popper (rispettivamente lo 0,2 % della popolazione negli ultimi 12 mesi).

CONSUMO MULTIPLO

Canapa e alcol (15-29 anni)

Il 30,1 per cento di coloro che non consumano canapa sono consumatori di alcol ad alto rischio. Il rischio di un consumo eccessivo di alcol raddoppia (71,1 %) tra coloro che consumano canapa almeno una volta alla settimana.

Canapa e tabacco (15-29 anni)

Il 18,1 per cento di chi non consuma canapa fuma giornalmente. Con un consumo di canapa basso la percentuale di fumatori giornalieri aumenta al 67,2 per cento, mentre con un consumo elevato (almeno una volta alla settimana) si ferma al 41,2 per cento.
