



Gonorrhée

Déclaration de résultats d'analyses cliniques

S.v.p. à renvoyer rempli d'ici une semaine au médecin cantonal (pas directement à l'OFSP).^a

Patient/e

Initiale nom: _____ initiale prénom: _____ date de naissance: __/__/____ genre: f m trans (MtF)^b trans (FtM)^b VDS^b

NPA/domicile: _____ canton: _____

Nationalité: CH autre: _____ pays de résidence, si pas CH: _____

Diagnostic et manifestation

Date du diagnostic: __/__/____

Manifestations: symptomatique^c: oral génital anal systémique
 asymptomatique

Laboratoire: nom/tél.: _____

date du prélèvement: __/__/____

motif: suspicion clinique exposition bilan de santé individuel^d dépistage^e
 autre: _____

Grossesse en cours? oui non

Exposition (merci d'indiquer la réponse la plus probable du point de vue du médecin)

Où: CH, lieu: _____ étranger, pays: _____ inconnu

Comment (mode de transmission): contact sexuel avec: f m trans (MtF)^b trans (FtM)^c VDS^d
 autre voie d'infection: _____
 pas identifiable

si transmission par contact sexuel, type de relation :

partenaire anonyme partenaire connu sexe tarifé pas identifiable

Antécédents d'IST^f (sauf VIH): oui non inconnu

Mesures (recommandées pour les IST^f)

Un test VIH a-t-il été effectué par le passé?^g oui non inconnu

Les partenaires sexuels ont-ils été informés du diagnostic de gonorrhée? oui non inconnu

Le traitement des partenaires sexuels contre gonorrhée sera-t-il / a-t-il été organisé? oui non inconnu

Médecin nom, adresse, tél. (ou timbre): _____

Remarques

Date: __/__/____

en tant que médecin pénitentiaire, nom officiel de l'établissement : _____

Médecin cantonal

Date: __/__/____

^a formulaires: versions actualisées disponibles à l'adresse <https://www.bag.admin.ch/infreporting>

^b MtF = sexe de naissance masculin (M), identité de genre féminin (F) ou non binaire. (FtM) = sexe de naissance féminin (F), identité de genre masculin (M) ou non binaire. VDS = Variation du développement sexuel (intersexe).

^c selon la définition de cas ECDC 2012: urétrite, salpingite aiguë, maladie inflammatoire pelvienne, cervicite, épithéliome, proctite, pharyngite, arthrite OU tout nouveau-né atteint de conjonctivite.

^d test individuel, p.ex. HSH, personnes > 45 ans lors d'un bilan de santé, etc.

^e prévention, resp. dépistage systématique chez des groupes cibles spécifiques, p. ex. femmes enceintes, recrues, donneurs de sang, participants à une étude

^f IST: infection sexuellement transmissible.

^g les personnes présentant une infection sexuellement transmissible devraient être testées pour le VIH.